




ערכת המיצ"ב הפנימי במתמטיקה לכיתה ה'

**חוברת הנחיות
להערכת פנים בית-ספרית**

מעודכן לתאריך 28/08/2011



מאי 2011, איר התשע"א

תוכן העניינים

הקדמה

על הערכה פנים בית-ספרית	5
מקורות.....	6
ערכת המיצ"ב הפנימי	7

פרק א'

תיאור המבחן	9
א. 1. מפרט המבחן	9
א. 2. מיפוי המבחן	12

פרק ב'

הנחיות להעברת המבחן	15
ב. 1. היררכות לקראת העברת המבחן	15
ב. 2. התיחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים	16
ב. 3. הנחיות כלליות להעברת המבחן בכתיבה	18
ב. 4. התאמות לצורכי בית-הספר בתוכן המבחן ובאופן העברתו	21

פרק ג'

הנחיות לבדיקה המבחן	23
ג. 1. המחוון והנחה לשימוש בו בעת בדיקת המבחנים	23
ג. 2. הנחיות לבדיקה המבחן ולהישוב הציונים	34
ג. 3. התאמת חישוב הציונים לצורכי בית-הספר	37
ג. 4. השוואת נתונים קבועות ההשוואה (נורמות ארציות)	37
דף ריכוז ציונים לתלמיד לחישוב ידני – דוגמה	38
דף ריכוז ציונים לתלמיד לחישוב ידני	39
דף מיפוי כתתי	40

פרק ד'

הפקת תועלת מהמבחן	43
-------------------------	----

הקדמה

על הערכה פנים בית-ספרית (school based evaluation)

מבחני המיצ"ב החיצוניים משמשים להערכת רוחביה היקף מסכמת המכונה גם "הערכת של למידה" (הש"ל). מטרתה לעודד אחריותו ו邏ת דין וחשוב לנמענים השונים בתוך הקהילה הבית-ספרית ומחוצה לה על רמת הישגים של התלמידים (בירנבוים, 2004; Furtak, 2006). הרצון לצמצם ככל האפשר את ההשלכות השליליות של המבחנים החיצוניים על בית-הספר הביא לידי עדכון מתוכנת הערכה הארץ-ישראלית לשנת תשס"ז¹. במסגרת עדכון זה, הודגשה חשיבותה של הערכה פנימית מעצבת, המטבחעת על-ידי צוותים בית-ספריים ותואמת את הרצפים הספרטיפיים שלהם.

מתכוונת זו משלבת הערכה בית-ספרית המטבחעת באמצעות כלים חיצוניים ("מיצ"ב חיצוני"), המועבר לרבע מאוכלוסיית בית-הספר) בצד מבחנים חיצוניים המועברים באופן פנימי ומשרתים את בית-הספר בלבד ("מיצ"ב פנימי"). המיצ"ב הפנימי מושתת על שילוב של שלושה מרכיבים: (א) העברת מבחן ארכי חיצוני-אובייקטיבי, שפוגת על-ידי ראמ"ה בשיטוף ועדות מקצועיות ומפMRIים, המשקף את תכנית הלימודים ואת הסטנדרטים של ידע ושל הבנה; (ב) בדיקה פנימית של המבחן על-ידי צוות בית-הספר (בסיוע מחוון המצווך לבחון), המאפשרת להפיק משוב אישי וקובוצתי מהיר על מידת השליטה של התלמידים בכל תחומי דעת, ומסייעת למורה לבבש תובנות פדגוגיות ברמת הכתיבה; (ג) השוואה בין הישגי התלמידים בבית-הספר לבין נתוני קבוצות ההשוואה (נורמות לאומיות), המתקבלים מעיבוד הממצאים של מבחני המיצ"ב החיצוני בתחילת שנת הלימודים הבאה (בלר, 2007).

מטרת המיצ"ב הפנימי היא לספק משוב מיידי שיסייע לקידום הלמידה של התלמידים, להתריע על תלמידים שאינם שולטים בתכנים ובמיומנויות הנדרשים, לזהות את הפער בין הביצועים המוצופים לבין הביצועים בפועל, ולהעריך את האפקטיביות של הפעולות שנעשות לצמצום הפער. מהותה של הערכה פנימית מעצבת היא השימושות שלה (Black & Wiliam, 1998) ויכולתה לסייע בשיפור תהליכי הלמידה בהתקווונו (Airasian, 1994; Dann, 2002).

שימוש במבחני המיצ"ב לצרכים פנימיים יכול להיות מנוגף לצמיחה ולSHIPOR: הממצאים יכולים לספק את המידע הדרוש לתהליכי קבלת החלטות כלל בית-ספריים, שככתיים, כיתתיים ופרטניים, לשיפור ההגדרת הישגים המוצופים והרמה הנדרשת מן התלמידים, ולשמש אבן בוחן לתוכניות הלימודים הבית-ספריות. מבחני המיצ"ב הפנימיים יכולים לשיער ביזוי נקודות של חזוק ושל חולשה, ברמת הפרט וברמת הכתיבה, לספק מידע על צרכים משתנים שיש לתת להם מענה, לפחות מוקדם חסיבה תכנונית בית-ספרית, להציג ידים מבוסטי נתונים, לתרום לראייה רחבה יותר של המערכת וללבש אמות מידה לאחריותיות.

שימוש במגוון רחב ככל האפשר של נתונים פנימיים וחיצוניים ישיע להבין טוב יותר את הממציאות הבית-ספרית (נבו, 2001).

¹ מידע על עדכון מתוכנת הערכה מופיע בחו"ר מנכ"ל סח/3(א) סעיף 4.1-2: "מתוכנת הערכה הארץ-ישראלית ומידע על המיצ"ב החיצוני והפנימי".

מקורות

- בירנבוים, מ' (2004). ייחידה 7: משוב והערכתה בכיתה. בתוקן: מ' בירנבוים, צ' יoud, ש' כ"ץ וה' קימרמן, בהבניה מתמדת – סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.
- בלר, מ' (2007). מדידה בשירות הלמידה – על מה ולמה? הד החינוך, פ"א, 7, עמ' 32-36.
- נבו, ד' (2001). *הערכתה בית-ספרית*. אבן-יודה: רכס.

Airasian, P. W. (1994). Classroom Assessment (2nd ed.). New York: McGraw Hill.

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Assessment and Classroom Learning. *Assessment in Education*, 5(1), 7-74.

Dann, R., (2002). *Promoting Assessment as Learning: Improving the Learning Process*. London & New York: Routledge Falmer.

Furtak, E. M. (2006). *Formative Assessment in K-8 Science Education: A Conceptual Review*. Commissioned paper by the National Research Council for Science Learning K-8 consensus study.

ערכת המיצ"ב הפנימי

מבחן המיצ"ב במתמטיקה לכיתה ה' הועבר השנה (התשע"א) בבתי-הספר במסגרת המיצ"ב החיצוני, והוא מוגש לכם לצורך שימוש פנים בבית-ספר (מיצ"ב פנימי).

המבחן פותח בידי רשות הארץ למדידה והערכתה בחינוך (ראמ"ה), בליווי ועדת היגי שכללה את המפמ"רית להוראת המתמטיקה ואת צוותה, מתמטיקאים, מומחי חינוך מתמטי ומורים המלמדים מתמטיקה בבתי-הספר היסודיים. בועדת ההיגי ובתהליך הכתיבה היו שותפים נציגים מכל המגזרים. נושאי המבחן משקפים את תוכנית הלימודים ומתאים לחומר הנלמד בכיתות א'-ה'.

יש לראות במבחן זה כל הערכה פנים בית-ספר המתווסף לכל הערכה האחרים שבשימוש בבית-הספר לאורץ השנה. אפשר לשמש בו כתחליף למבחן מסכם בית-ספר, כאשר בדיקת המחברות, نتيוח התוצאות וה伶ידה של התוצאות ייעשו על-ידי צוות בית-הספר. יש לזכור כי **תוצאות המיצ"ב הפנימי נועדו לשימוש פנימי, ובתי-הספר אינו נדרש לדוח עליהן לכל גורם שהוא**. המטרה היא לאפשר לצוות בית-הספר להפיק מתחילה בדיקת המבחנים ומהמצאים שלהם תובנות (ברמת התלמיד, ברמת הכתה וברמת תוכנית הלימודים הבית-ספרית) שיסייעו להתמקד ביעדים חינוכיים ולימודים, ולקדם את הישגי התלמידים.

ערקה זו נועדה לסייע לצוות בית-הספר בהערכת המבחן, בבדיקה ובफיקת התוצאה ממנו. חלק מההיערכות להערכת המבחן בבתי-הספר, מומלץ לקרוא בעיון את הערכה ולפעול בהתאם להנחות המופיעות בה. יש לציין, כי בית-הספר יכול לקבוע מתכונת הערכה ו/או הערכה שונה של המבחנים, אך חשוב לזכור כי **כל שיעשרו כלפי הערכה והערכת המומלצים, כך יהיו התוצאות של המבחן מהימנות יותר, תקפות יותר וبنות השוואת לנוטוני קבוצות השוואת (נורמות ארציות)**. נתוני קבוצות השוואת יחושו על-פי תוצאות המיצ"ב החיצוני, ופורסמו על-ידי ראמ"ה בעוד כמה חודשים.

בכל הנוגע לתוכני המבחן ופתרונות לתוכנית הלימודים אפשר לפנות לגב' תמי גירון, מדריכת ארצית במתמטיקה, טלפון 050-6288954 או בדו"ל tamiavi@netvision.net.il, או לאנשי הקשר (רשימת אנשי הקשר מופיעה בסוף החוברת).

פרטים נוספים על אודזות המיצ"ב הפנימי וחומר עזר ניתן למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, שכתובתו: <http://rama.education.gov.il>, בקטgorיה "מיצ"ב פנימי תשע"א".

שאלות על אודזות המיצ"ב הפנימי אפשר להפנות:

- לדו"ל meitzav@education.gov.il
- טלפון 03-7632888
- לפורים המיצ"ב הפנימי – באתר ראמ"ה בלשונית **קבוצות דיוון** » **"פורים מיצ"ב פנימי ומבחנים פנימיים אחרים"**. הכניסה לפורים מיועדת למורים בלבד והוא נעשית באמצעות שם המשתמש: **pnimi** והסימנה: **7pnimi**.

חוברת הנחיות שלפניכם כוללת ארבעה פרקיים:

פרק א' – תיאור המבחן: מפרט המבחן ומייפוי המבחן.

פרק ב' – הנחיות להעברת המבחן: היערכות להעברת המבחן בבית-הספר, פירוט ההתאמות לנבחנים בעלי צרכים מיוחדים, הנחיות כלליות להעברת המבחן והצעות להתאמת המבחן לצורכי בית-הספר.

פרק ג' – הנחיות לבדיקה המבחן: המחוון וההנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחן, הנחיות לחישוב הציונים (באופן ידני או ממוחשב), התאמת חישוב הציונים לצורכי בית-הספר והסבירים על ההשוואה בין תוצאות בית-הספר ובין התוצאות של קבוצות ההשוואה (כלל בבית-הספר, בתי-ספר דוברי עברית ובתי-ספר דוברי ערבית).

פרק ד' – הפקת תועלת מהמבחן: מידע ודוגמאות לניתוח חלק מהפריטים ב מבחן התשע"א, זיהוי קשיים של תלמידים ואסטרטגיות לפתרון קשיים אלה.

עבודה נעימה ופורייה!

פרק א': תיאור המבחן

א.1 מפרט המבחן

שאלות מבחן המיצ"ב (התשע"א) במתמטיקה לכיתה ה' משקפות את הנושאים, את המיומנויות ואת העקרונות המופיעים בתכנית הלימודים התשס"ו (2006) לכיתות א'-ה'.

במבחן נבדקות ההבנה והשליטה במילויים שונים במספרים ובפעולות שלמים ומספרים, ובמספרים, ובנוסאות גאומטרייה ומדידות. בין השאלות מופיעות גם שאלות שנדרשת בהן יכולת לשלב בין נושאים שנלמדו בתחום הספרים, הפעולות והגאומטריה.

השאלות הן ברמות קושי שונות ודרשות מיומנויות חשיבה שונות: ידע וזיהוי, חשיבה אלגוריתמית, יישום ותובנה חשבונית וחיפוש פתוח והنمקה.

מטרות המבחן מגוונות: שאלות מסוג רב-ברורה, שאלות פתוחות שיש להן פתרון אחד, שאלות פתוחות שיש להן יותר מפתרון אחד ושאלות הדורשות הנמקה או תיאור הדרך לפתרון במילים ובתרגולים. חלק מהשאלות הן שגרתיות ומוכרות וחלקן אין שגרתיות.

בטבלה שלහן מוצג מפרט המבחן אשר פורסם באתר האינטרנט של ראמ"ה כבר באוקטובר 2010. המפרט מתאר בפירוט את נושאי המבחן, את נושאי המשנה ואת המשקל היחסי של כל נושא בבחן.

נושא ראשי	נושא משנה – פירוט	משקל ייחסי
מספרים ופעולות – שברים פשוטים ועשרוניים	<ul style="list-style-type: none"> ▪ משמעויות שונות של השבר הפשוט (כולל ייצוג מספרים טבעיות ו-1'0' כשברים, מספרים מעורבים ושברים גדולים מ-1) ▪ משמעות השבר העשרוני (כשבר שמכנהו 10 או 100) והבנה המתבססת על המבנה העשרוני ▪ מעבר משבר עשרוני לשבר פשוט ▪ שברים פשוטים על ישר-המספרים ▪ השוואת שברים פשוטים ועשרוניים ▪ שמות שונים לשבר פשוט, מצום והרחבה ומעבר ממספר מעורב לשבר ▪ חיבור וחיסור שברים פשוטים, מספרים מעורבים ושברים עשרוניים ▪ כפל שלם בשבר פשוט (כחיבור חוזר) ▪ שאלות מילוליות הבוחנות את משמעות השבר, השוואת שברים ושאלות המשלבות פעולות חיבור וחיסור בשברים פשוטים ועשרוניים ▪ פריטים המשלבים ידע ומיומנויות בנושא שברים עם נושאים אחרים כגון מספרים שלמים, גאומטריה או מדידות 	כ- 40%
מספרים ופעולות – מספרים טבעיות (כולל 0) וחקר נתונים	<ul style="list-style-type: none"> ▪ הכרת מספרים "גדולים" והבנת המבנה העשרוני ▪ ישר-המספרים ▪ תרגילי חיבור ותרגילי חיסור בתחום האלפים (כולל משוואות) ▪ כפל כולל כפל בעשרות ובמאות שלמות וכפל מספר דו-ספרתי או תלת-ספרתי במספר חד-ספרתי, וכן כפל מספר דו-ספרתי במספר דו-ספרתי) ▪ חילוק בחלוקת חד-ספרתי כשהמחלק הוא מספר דו-ספרתי או מספר תלת-ספרתי (כולל חילוק עם שארית) ▪ חילוק בחלוקת דו-ספרתי שהוא עשרה שלמה ▪ תוכנות של מכפלות וסימני התחלקות ▪ סדר פעולות (כולל שימוש בסוגריים) ▪ שימוש בחוקי הפעולות: חילוף, קיבוץ ופילוג וחוקי ה- 0 וחוקי ה- 1 ▪ מספרים ראשוניים ומספרים פריקים ▪ משמעות שווין ואי-שוויון, משמעות פעולות חשבון, קשר בין הפעולות, השפעת שניוי באחד ממרכיבי תרגיל, משמעות השארית בחלוקת ▪ ייצוגים גרפיים של נתונים (דיאגרמות: עמודות ומקלות) ▪ חישוב ממוצע ותוכנות הממוצע ▪ שאלות מילוליות חד-שלביות, שאלות דו-שלביות ושאלות רב-שלביות מכל הסוגים ▪ ניתוח סיקוריים ▪ פריטים המשלבים ידע ומיומנויות בנושא מספרים שלמים עם נושאים אחרים כגון שברים, גאומטריה או מדידות 	כ- 35%

נושא ראשי	נושא משנה – פירוט	משקל יחסי
גאומטריה ומידות	<ul style="list-style-type: none"> ▪ זווית – זיהוי, שיום, מינן לזוויות חדות, ישרות וקහות והשוואה, אומדן מידות במלואן ▪ מקבילות ומאונכות ▪ מצולעים – חלקו המצולעים (כולל אלכסונים), מצולעים משוכលים ▪ משולשים – תכונות ומינן על-פי צלעות ועל-פי זווית (לא חישובי זווית במשולשים), גובה במשולש ▪ מרובעים – ניתוח תכונות, מינן מרובעים וקשרי הכליה ביניהם, גובה במקביליות ▪ תיבות – חלקו תיבות, פריסות ▪ אורך, ריקוף, שטח, שטח פנים ונפח תיבות – שימוש ביחידות מידתאות, חישובי היקפים ושטחים של מצולעים (מלבנים, מקביליות שאין מלבנים ומשולשים) ▪ שימוש ביחידות מידת למדידות משקל וזמן ▪ שאלות מילוליות הכוללות שימוש בידע בכל אחד מהנושאים הנ"ל ▪ פריטים המשלבים ידע ומיומנויות בנושא גאומטריה ומידות עם נושאים אחרים כגון שברים ומספרים שלמים 	כ- 25%

A.2 מיפוי המבחן

מיומניות וספנות	שאלות מילוליות			תרגילים	מושגים	מיומניות
	הצגת סרטיות	הצגת דודז'	עימוק או הסבר			
מיומניות וספנות	שאלה שאלת רבו-רבו- אריגנית/ אינטגרטיבית	שאלה שאלת רבו- רבו- שלביה	שאלה שאלת רבו- רבו- שלביה	תשויות תרגילים וחישוב שאינו שלביה	תגיל תשויות וחברת מושגים	זרוי זיהוי וחברת מושגים ושואים
מספרים שלמים וunker נרננים						
חיבור והיסוס						
18						
17-א						
17-ב						
16,2						
11						
18						
17-ד						
17-ג						
13						
15,14						
12						
19						
מספרים						
33						
34						
29						
30						
32-ב						
השותאות שברים						
מספרים עליים ישר-המשפרים						
27-ג						
27-ה						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

מימוניות נספנות	שאלות מילוליות		תרגילים		מושגים	
	הצגת זרץ פתרון	נימוק או הסבר	שאלת חקר	שאלה רָבוֹ-	שאלה חדּ-	גירוי תבונות והברת מושגים
39	39	3-ג-ב	38-ג	3	3-ג	כמויות וחלק
						חיבור ויחסיו שברים פשוטים
						מחות השבד העשרוני
						חיבור והיסוס שברים עשרוניים
20	20	2-ג	38-ג	3	3-ג	כמויות וחלק
7						חיבור ויחסיו שברים פשוטים
26						מחות השבד העשרוני
8						חיבור והיסוס שברים עשרוניים
22	22	ג-ב	38-ג	3	3-ג	כמויות וחלק

שאלות המבחן מייצגות רמות חשיבה שונות:

- א. ידע וזיהוי** – שאלות שנבדק בהן ידע וזיהוי של מושגים ושל עובדות.
- ב. חשיבה אלגוריתמית** – שאלות שנבדקה בהן היכולת לבצע חישובים המבוססים על אלגוריתמים שגרתיים פשוטים ומורכבים.
- ג. חשיבה תהליכיית (יישום ותובנה חשבונית)** – שאלות שנבדקה בהן היכולת לקשר בין מושגים ולהתאים מודל מתמטי לסתואציה מיולית, ושאלות שהן מתחבקות התלמיד למצוא את הפתרון בדרכים המבוססות על תובנה חשבונית.
- ד. חיפוש פתוח והنمקה** – שאלות ברמת חשיבה גבוהה הדורשות ניתוח (אנליזה וסינטזה), חיפוש פתוח למציאת דרך הפתרון, חקר והنمקה.

חשוב לזכור שרמות החשיבה הן **רמת מצופות** ואין לדעת במדוקק מהי רמת החשיבה של התלמיד בזמן פתרון השאלה. רמת החשיבה של התלמיד בזמן הפתרון תלולה במידה מסוימת שלו עם שאלות דומות ועם התכנים שהשאלה מייצגת, וב استراتيجיה שיבחר התלמיד לפתרון השאלה.

להלן טבלה ובה מיפוי שאלות המבחן לפי הנושאים הראשיים ולפי רמות החשיבה המצופות שלן.

חיפוש פתוח והنمקה	חשיבה תהליכיית (יישום ותובנה)	חשיבה אלגוריתמית	ידע וזיהוי	רמת החשיבה
				הושא הרומי
17, א, ב, ב, 17, ג, 17, ד, 17, 18	, א16, 15, 14, 12, 2, 19, 216	, א1, ב1, ב10, א10, ב1, 13, 11, ג10		מספרים שלמים
39, ג31	, א31, 30, 29, 5, 3, 33, ב32, א32, ב31, ב38, א38, 34	, ב28, א28, ג27, 4, 37, 35, ג28	36, ב27, א27	শברים
26, א, 24, ב, 24	23, 22, 21, 20, 8, 7	ג25, א25, ב25	9, 6	גאומטריה ומדידות

פרק ב': הנחיות להערכת המבחן

פרק זה מכיל מידע שטרתו לסייע לבית-הספר להערכה מראת העברת של המבחן המיצ"ב הפנימי. המידע מתיחס למועד העברת המבחן בכתיה, לשמירה על סודיות המבחנים, להערכת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, לאופן העברת המבחן בכתיה, להתאמות המבחן לצורכי בית-הספר ועוד. **חשיבותו של פרק זה לפני העברת המבחן בבית-הספר ולהעיר בהתאם.**

ב.1. היערכות לקראהת העברת המבחן

מועד העברת המבחן: מבחן זה מיועד להערכה לקראהת סוף שנת הלימודים של כיתה ה'. יש לקיים את המבחן בבית-הספר ביום שלישי, כ"ז באيار התשע"א, 31 במאי 2011 או בטוויח של עד חמישה ימי לימודים ממועד זה (באישור המנהל).

הודעה לתלמידים: מומלץ להודיעו מראש לתלמידים בכיתות הנבחנות על מועד המבחן, על היקף החומר הנככל בוועל השימושו בתוצאותיו, וזאת בהתאם להחלטת בית-הספר (אם הציון יימסר לתלמיד, האם הציון יתבטא בתעודה, האם תישלח הודעה להורים וכדומה).

שמירה על הסודיות של שאלות המבחן בתוך בית-הספר ומחוצה לו: מומלץ להזכיר את המבחן לכל כיתות ה' באותו יום ובאותה שעה. הערכה של המבחן בכיתות מקבילות בהפרש זמן עלולה לגרום לדיליפה" של השאלות. נוסף על כך, לאחר שמדובר בבחן שיועבר בבית-ספר רבים, יש לשמור בכל האפשר על חיסיונם של המבחנים ועל חשיבותו של חוברת הנחיות זו גם לאחר שהבחן כבר התקיים.

התאמת תוכן המבחן לצורכי בית-הספר: ראו סעיף ב.4.

נוסח המבחן: ערכה זו עוסקת בנוסח אחד בלבד של המבחן, שהוא הנוסח שיועבר לתלמידים. אם יש צורך להעתיקות בבחן, על בית-הספר להיערך בהתאם, למשל לתגבר את ההשגה בכיתות או לבחור בכל פתרון ארגוני אחר שייראה לנכון.

היערכות לבחינת תלמידים בעלי צרכים מיוחדים: ההיערכות ליום הבחינה כוללת התייחסות מתאימה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. כדי לחת מענה הולם לתלמידים אלו, יש להיערך מבעוד מועד. לקרהת המבחן המיצ"ב ייכין בית-הספר מראש אמצעי בחינה מיוחדים (למשל, חוברות מוגדרות לתלמידים שיש להם קשיי ראייה), יקצת כיתה נפרדת וכוכח אדם בהתאם לצורך (ראו סעיף ב.2 שלහל) ויידע את התלמידים הזכאים על אוזות התאמאות שיקבלו (למשל, שכטוב תשובה המבחן, הפסוקות, יציאת לשירותים, חלוקת המבחן למתקעים והקראת טקסטים מילוליים). בסעיף ב.2 מפורטים קבוצות תלמידים בעלי הצרכים המיוחדים ואופן ההתייחסות אליהן במיצ"ב הפנימי.

ה חוזרת המבחנים לתלמידים: אפשר להזכיר לתלמידים את מחברות המבחן כשבועיים לאחר מועד העברת המבחן (מטרumi שמירת סודיות).

ב.2 התיחסות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים

הסעיף זהה עוסק בהתאמות האפשרות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרת המיצ"ב הפנימי². יש לאפשר לתלמידים אלו להיבחן בתנאים נאותים ווהוגנים, כדי שיוכלו לבטא את יכולותיהם הלימודיות במלואן, וזאת בלי לפגוע באיכות הנתונים שיתקבלו. מבחני המיצ"ב הפנימי רצוי לספק לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים את התנאים הנחוצים להם בלמידה השוטפת וב מבחנים בבית-הספר לאחר מכן. לאחר מיפוי התלמידים בעלי הצללים המיעודיים, יקצתה בית-הספר לפיה הצורך כיתות בבחינה נפרדות שבהן יספק את התנאים הנדרשים לתלמידים אלה (קריאה, כתיבת תשובות מילוליות של התלמידים על-ידי המורה, תוספת זמן קצרה, חיבורת מבחן מוגדלת וכדומה).

להלן פירוט אופן ההתיחסות לקבוצות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים:

תלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד: המבחן נדרש לבדוק את רמת השיליטה של התלמידים בחומר הלימודים על-פי תכנית הלימודים הכלכלית. לכן בית-הספר יכול לאפשר, על-פי שיקול דעתו, התאמות בהתאם לתח"י (תכנית חינוכית ייחדנית) של כל תלמיד. עם זאת, בדומה למיצ"ב החיצוני, אין חובה לבחון את התלמידים האלה.

תלמידים עולים חדשים הנמצאים פחות משנה אחת בארץ ותלמידים בכיתות אולפן או בכיתות קלט: המבחן נדרש לבדוק את רמת השיליטה בחומר הלימודים של תלמידים השולטים בשפת המבחן. על כן, מבחן זה אינו מתאים לאוכלוסיית התלמידים הזאת. עם זאת, בית-הספר רשאי לשקל את האפשרות לבחון את התלמידים האלה בתנאים מותאמים, על-פי מידת שליטתם בשפה ועל-פי יכולתם להבין החלטה טקסטית כתוב.

תלמידים עולים חדשים הנמצאים בארץ בין שנה אחת לשושสามים: מומלץ לסייע בהקראת המבחן (הקראת טקסטים מילוליים בלבד) לתלמידים המתקשים בקריאה המשתייכים לקבוצה זו. כדי לעשות זאת בלי להפריע לתלמידים האחרים, רצוי להציג כיתה נפרדת שבה יוכל המורה להקריא להם את המבחן.

תלמידים בכיתות רגילים הזכאים לתמיכה מתכנית השילוב: ההחלטה כיצד ייבחנו תלמידי השילוב במיצ"ב הפנימי נתונה לשיקול דעתו של צוות בית-הספר. לאחר שהבחן מבוסס על תוכנית הלימודים הכלכלית, ניתן שאנו מתאים להיקף הלמידה של התלמידים האלה. עם זאת, יש להכיר בחשיבות הרגשית והחברתית של עצם השתתפותם בבחן עם עמיתיהם לכיתה. לכן,جوز בית-הספר>Create>lezekol כדי לבחון אותם, וזאת בהתאם ליכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות והחברתיות, בהתאם לתח"י של כל תלמיד. כמו כן, בית-הספר יכול לפחותם מחלקים מסוימים של המבחן או משאלות קשות, או לפחותם את המבחן לכמה מקטעים.

² ב מבחני המיצ"ב החיצוני ניתנו תנאים אחידים, על-פי המוגדר בחוזר מנכ"ל "הוראות קבוע" סח/3(א) סעיף 3.1-4 (בושא התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ב מבחנים ארציים (המיצ"ב/ "מהא מושגים"/ מבחני החמ"ד) ב בת-הספר היסודיים ובחטיבות הביניים).

תלמידים בעלי יכולות למידה שאין להם זכאים לתמיכת מתכנית השילוב: בקבוצת זו נכללים תלמידים שאינם זכאים לתמיכת מתכנית השילוב (בין שעברו אבחון בידי גורם חיצוני ובין שלא), אך מתמודדים עם קשיי למידה, בעיקר בקריאה ובכתיבה. הכוונה היא לתלמידים שבית-הספר הכיר לצורך לספק להם תנאים מותאמים בתהליכי הלמידה השוטף וUMBHT מתקיימים בבית-הספר במהלך השנה. מומלץ כי תלמידים אלה ייבחנו ב מבחון הנوفي באותו אופן שבו נהגים לבחון אותם **בודר' כל בבית-הספר**. תלמידים בעלי קשיים בקשוב ובריכוז ייבחו בתנאים מותאמים על-פי הצורך (חדר נפרד, כיתה שקטה, חלוקת המבחן לכמה מקטעים וcdc).

תלמידים בעלי קשיי ראייה: תלמידים אלה ייבחו בכיתה הרגילה ויקבלו חוברת מבחון מוגדלת. על בית-הספר להיערך מראש לצילום החוברת בהגדלה.

1. אין להקריא טקסט מתמטי כתוב בשפה פורמלית (מספרים, תרגילים, סימני אישווון, משוואות וcdc). !
2. השימוש במחשבון או בכל חומר עזר אחר אסור בכל חלקים המבחן לכל הנבחנים. האיסור חל גם על תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

ב.3 הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה

בסעיף זהה מוצגות הנחיות כלליות להעברת המבחן בכיתה. העברת המבחן על-פי הנחיות אחידות תתרום להבטחת מהימנות המבחן, ותיתן לכל תלמיד ההזדמנות שווה לבטא את ידיעותיו ואת מידת שליטתו בחומר הלימודים.

שעת העברת המבחן ומஸכו

- מומלץ לקיים את המבחן בשעות שבין התלמידים ערנויים, ושאין בסביבה גורמים העולמים להפריע להם. המיצ"ב החיצוני מתקיים בשעות השלישייה והרביעית של יום הלימודים, ומומלץ להעביר גם את המבחן הפנימי בשעות האלה.
- הזמן המוקצב למבצע המבחן בשלמותו הוא **90 דקות ללא הפסקות**. משך זמן זה תוכנן כך שהתלמידים יוכל להשיב בನינותיהם על כל שאלות המבחן. אם תלמידים יזדקקו לכך דקוט ווספות כדי להשלים את המבחן, אפשר לתת להם תוספת זמן קצרה, בכפוף להחלטת בית-הספר. במקרה, מומלץ שלא לתת תוספת זמן העולה על 15 דקות. לפני התחלה המבחן יש להודיע לתלמידים על משך הזמן העומד לרשותם, אולם אין לו רוץ את התלמידים במהלך המבחן ואין לכתוב על הלוח את משך הזמן הנותר לסיום המבחן.

סיום המבחן לפני תום הזמן המוקצב: בית-הספר יקבע אם התלמידים שישימו את המבחן לפני תום הזמן המוקצב יישארו בכיתה או יצאו החוצה. רצוי לעודד את התלמידים האלה לבדוק שוב את תשוביთיהם, ורק לאחר מכן למסור את מחברותיהם.

השגחה בכיתה האם: מומלץ כי המורה למתמטיקה יעבור בין הבעיות הנבחנות בעת המבחן ולא ישמש משגיח באף אחת מהן. לצורך השגחה בכיתה מומלץ למנות מורה **שאינו** מלמד את המקצוע.

תפקידו של המורה למתמטיקה:

1. **מתן הבהרות לפני התחלת המבחן:** לפני התחלת המבחן ימסור המורה למתמטיקה לפי שיקול דעתו הבהרות כלליות לתלמידים בכיוות הנבחנות בנוגע לתוכנית המבחן.
2. **תיעוד שאלות התלמידים בזמן המבחן:** אחת המטרות של המבחן הפנימי היא לסייע למורה למתמטיקה למפות את הידעוות של התלמידים ואת הקשיים שלהם. לפיכך, יש חשיבות לטייעוד השאלות שהתלמידים שואלים בזמן המבחן. מומלץ כי המורה למתמטיקה יעברו בזמן המבחן בכיוות הנבחנות וירשום את השאלות שהילדים שואלים. על-פי השאלות האלה ועל-פי תוצאות המבחן יוכל המורה לפתח תובנות פדגוגיות ולהסיק מסקנות שישפיעו על אופן ההוראה בכתה.

תפקידו של המורה המשגיח בשעת המבחן:

1. לפתח על המהלך התקין של המבחן ולשמור על הסדר ועל טוהר הבדיקה.
2. לוודא שכל תלמיד עובד באופן עצמאי. שימוש לב Ci אין להשיב לתלמידים על שאלות העוסקות בתחום התוכן, להקריא את שאלות המבחן, או לכוון את התלמידים לשובה הנכונה.
3. לייצור אווירת עבודה שקטה ונינוחה, ללא לחץ של זמן, שתאפשר לתלמידים לבטא את הידע שלהם בצורה הטובה ביותר.
4. לסייע לתלמידים בפתרון בעיות טכניות (דפוס לא ברור, חוברת פגומה וכדומה), או בפתרון בעיות אישיות **שאין קשרות לתוכן המבחן** (מתן אישור לאכול ולשתות במהלך המבחן על-פי מדיניות בית-הספר, טיפול בעיות חריגות וכו').
5. לעודד את התלמידים להשיב על כל שאלות המבחן, ולבקש מהם לבדוק את תשוביותיהם לפני הגשת המבחן למורה.
6. לתעד את השאלות שהتلמידים שואלים במהלך המבחן (אם המורה למתמטיקה אינו נמצא בכתה). רואו סעיף "תפקידו של המורה למתמטיקה" שלעיל.
7. אפשר לכתוב על הלוח את מספר הנקודות המוקצת לכל תשובה על כל אחת משאלות המבחן.

תלמידים הזוכים לתנאי מבחן מותאם: תלמידים אלו יקבלו את התנאים המפורטים בסעיף ב.2 שלעיל בכיוות האם (למשל, חוברות מבחן מוגדלות), או יופנו לכיתה אחרת (לצורך הקראה, כתיבת תשובה מילולית של התלמידים על-ידי המורה וכדומה).

כל עזר: השימוש במחשבון או בכל חומר עזר אחר אסור בכל חלקים המבחן.

הנחיות לתלמידים לפני חלוקת המבחן:

1. יש להסביר לתלמידים את מטרת המבחן.
2. יש לציין כמה זמן עומד לרשותם.
3. יש לציין שהמבחן מורכב משאלות מסווג רב-ברורה ומשאלות פתוחות. בשאלות מסווג רב-ברורה יש תשובה נכונה אחת ועל התלמידים לסמן אותה. בשאלות הפתוחות יש לכתוב את התשובה במקומות המיועד לכך.
4. יש להסביר לתלמידים מה יהיה עליהם לעשות אם יסיימו את המבחן לפני הזמן.
5. יש לבקש מהתלמידים להתייחס למבחן ברצינות המרבית ולהשיב על כל השאלות. יש להצעיר להם לנסות ולהשיב על כל שאלה, גם אם נדמה להם שאין יודעים את התשובה או שאיןם בטוחים שתשובתם נכונה.
6. יש להסביר לתלמידים את נוהלי ההתנהגות בשעת המבחן (יציאה לשירותים, אכילה, שאלת שאלות וכו').

הנחיות לתלמידים לאחר חלוקת המבחנים: אם הוחלט לשנות את תוכן המבחן ולא לכלול בו את כל השאלות (ראו סעיף ב.4 שלහלן), יש להבהיר לתלמידים על אילו שאלות עליהם להשיב ועל אילו לא. יש להבהיר כי השאלות המבוטלות לא ייכללו בחישוב הציון. מומלץ לכתוב פרטיהם אלה על הלוח.

ב.4 התאמות לצורכי בית-הספר במהלך המבחן ובאופן העברתו

המיצ"ב הפנימי הוא מבחן פנים בבית-ספר, ואחד היתרונות הנובעים מכך הוא שnitן להתאים לצורכי בית-הספר (את בוגוד למייצ"ב החיצוני שבו העברה ובדיקה סטנדרטיות הן הכרחיות).

עקרונית, מבחני המיצ"ב נבנים בהלימה לתכניות הלימודים בכל תחום דעת ולכן רצוי להעבירם לתלמידים במתוכנותם המלאה. עם זאת, קיימת שונות בין בית-הספר בתהליכי ההוראה-למידה, ובבחן המיצ"ב, בשל היותו סטנדרטי ו אחיד, לעיתים אין נמצא בהלימה מלאה עם ההוראה והלמידה בכיתה מסוימת.

לפיכך, בית-הספר רשאי, לפי שיקול דעתו, להעביר את מבחן המיצ"ב הפנימי או להעניק אותו בדרכים שונות מלאה המופיעות בהנחיות. כמובן, קיימת אפשרות לעורך התאמות בבחן כך שתוצאותיו יוכלו לסייע לבית-הספר בתהליכי קבלת החלטות בנוגע לתוכנית ההוראה והלמידה בנושאי הלימוד הנבדקים, ובונגעו להתפתחותם של לומדים בעלי יכולות שונות.

עם זאת, חשוב לציין כי העברה לא סטנדרטית של המיצ"ב הפנימי לא מאפשר לעורך השוואת תקפה להישגי קבוצות ההשווואה הארציות.

להלן כמה אפשרויות להגמת השימוש במיצ"ב הפנימי:

1. **התאמת תוכן המבחן לנלמד בכיתה:** מומלץ לעיין מראש בשאלות המבחן ובנושאים הנכללים בו ולבדק באיזו מידת נלמדו כל אלה בכיתה. לאור הממצאים אפשר לבטל שאלות מסוימות, או שלא לכלול אותן בחישוב הציון הכלול. באופן זה אפשר גם להתאים את המבחן לתלמידים מתוקשים.

2. התאמות בהעברת המבחן בכיתה:

- **משך הבחינה –** בית-הספר יכול להחיליט אם להאריך את משך הבחינה או לקצרו בהתאם לשינויים שערך בבחן או על יסוד שיקולים אחרים.

- **העברת המבחן בכמה מקטעים –** אפשר לחלק את המבחן לכמה מקטעים ולהעבירם במועדים שונים, לפי סדר הנושאים שיקבע בית-הספר.

3. שינוי בהליך הבדיקה – ראו סעיף ג.3.

פרק ג': הנחיות לבדיקת המבחן

פרק זה כולל מידע שישיע למצוות בית-הספר בבדיקה המבחן ובצינונו. הפרק מציג את המחוון ואת הנחיות לשימוש בו ווגם הנחיות הנוגעות לחישוב הציונים על-ידי שימוש בכלים עזר שונים. כמו כן, מוצגות בפרק הצעות לחישוב הציונים בהתאם לצורכי בית-הספר ומוצגים הסברים על ההשוואה בין הנתונים של בית-הספר ובין נתוני קבוצות ההשוואה.

ג.1 המחוון והנחיות לשימוש בו בעת בדיקת המבחנים

לנוחיות המורים, נעשה מאמצן לפתח מהוון מפורט ככל האפשר. המחוון מצין את סוג הפריט (רב-ברורה/פתוח), את התשובה הנכונה לכל פריט, את הנחיות לניקוד ואת טווח הערכיים לתשובה.

שימוש לב,

- בעמודה שכותרתה "אפשרויות הציון", הערכיים או טווח הערכיים מתייחסים לאפשרויות הניקוד (אותן אפשרויות מופיעות גם בדף ריכוז הציונים). אם, למשל, כתוב כי הניקוד הוא 0-2, התלמיד יכול לקבל אפס נקודות או 2 נקודות, נקודה אחת או 2 נקודות. אם כתוב 0,2, התלמיד יכול לקבל אפס נקודות או 2 נקודות, ללא ניקוד ביניים.
- יש לתת ניקוד לכל שאלה בנפרד.
- **בכל שאלות המבחן** אם התלמיד לא כתב תשובה או לא סימן תשובה, יש לתת לו ציון 0.
- **בפריטים הפתוחים** (בנייה תשובה) יש להעריך את התשובה לפי הנחיות המפורשות במחוון, ולרשום את הציון המתאים.
- **בפריטים מסווג רב-ברורה** (ר"ב) אם התלמיד סימן יותר מתשובה אחת, יש לתת לו ציון 0.
- יש לבדוק תרגילים שבהם בוצע החישוב בצד, ולקבל תשובה נכונה גם אם אין לא הוועתקו למקום המועד לכך.

מחוון לבחון במתמטיקה לכיתה ה', מיצ"ב פנימי, התשע"א

מספר הפריט	סוג הפריט	התשובה הנכונה	הנתניות לקידוד	הערכים לקידוד
1	פתוח	א. 1,949	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	2,0
	פתוח	ב. 15	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	2,0
2	פתוח	25,000 דפים	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	2,0
3	פתוח	20 ספרים	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	2,0
4	פתוח	$\frac{1}{6}$	1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	1,0
5	פתוח	340.50 שקלים או $\frac{1}{2} 340$ שקלים או 340 שקלים ו- 50 אג'	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	2,0
6	ר"ב	(4)		2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية

המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	התשובה הנכונה	התנחות לקידוד	הערלים לקידוד
7	פתוח	כל קטע המאונך לקטע הנתון (הקטע או המשכו יוצרים עם הקטע הנתון זווית בת 90°). למשל:	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה * קטע מאונך לשורטט מחווץ לגריד המשבצות, ייחשב תשובה נכונה.	2,0
8	ר"ב	(4)		2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה
9	ר"ב	(3) 1,000 מטרים	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0
10	א.	3,090	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0
	ב.	4,792	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0
11	ג.	518	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0
12	פתוח	30	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0


המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	התשובה הנכונה	ההנחיות לקידוד	הערכתם לקידוד
13	פתוח	7,3,2	2 נק' – תשובה נכונה: רק שלושה גורמים ראשוניים, ושלושתם נכונים 1 נק' – תשובה חיליקית: רק שני גורמים ראשוניים, ושתיים נכונים 0 נק' – רק גורם ראשוני אחד נכון או תשובה שגوية * תשובה הכוללת גורמים ראשוניים נכונים וגם גורמים שגויים, תיחסב תשובה שגوية.	2-0
14	פתוח	17 קופסאות	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	2,0
15	פתוח	6 כלניות אדומות	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	2,0
16	פתוח	א. 200 צעדים	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	2,0
	פתוח	ב. 60 צעדים	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	2,0

◀ המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	התשובה הנכונה	ההנחיות לקידוד	הערכתים לקידוד
17	פתוח	<p>א. תשובה: לא נימוק או התרגיל הכלולים התייחסות לכך שאין מספר דו-ספרתי שאם כפולו אותו ב- 12 נקבל 1,200, או לכך שצריך לכפול במספר תלת-ספרתי כדי לקבל 1,200, או לכך שצריך לכפול ב- 100 כדי לקבל 1,200 (בלי לציין שר 100 הוא מספר תלת-ספרתי).</p>	<p>1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגiosa * התשובה "לא" ללא נימוק תיחשב תשובה שגiosa.</p>	1,0
	פתוח	<p>ב. תשובה: לא נימוק הכלול התייחסות לכך שר 130 אינו כפולה של 12, או לכך שר 12 : 130 אינו מספר שלם.</p>	<p>1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגiosa * התשובה "לא" ללא נימוק תיחשב תשובה שגiosa.</p>	1,0
	פתוח	<p>ג. תשובה: כן נימוק הכלול הצגת דרך חישוב שלפיה 720 הוא כפולה של 12 ושל מספר דו-ספרתי, או הצגת התרגיל 60×12.</p>	<p>1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגiosa * התשובה "כן" ללא נימוק תיחשב תשובה שגiosa.</p>	1,0
	פתוח	<p>ד. תשובה: לא נימוק הכלול התייחסות לכך שכפלות של 12 הן זוגיות או לכך שר 12 הוא מספר זוגי, וכל כפולה של מספר זוגי היא זוגית.</p>	<p>1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגiosa * התשובה "לא" ללא נימוק תיחשב תשובה שגiosa.</p>	1,0
18	פתוח	<p>הסבירים אפשריים:</p> <p>I. הצגת מחיר עיפרון אחד בשתי החניות והשוואת מחירים</p> <p>II. הצגת מחיר כמות שווה של עפרונות (הגדולה מ- 1) בשתי החניות, גם ללא השוואת מחירים</p> <p>III. הצגת כמות העפרונות שאפשר לקנות בכל אחת מהחניות באותו הסכום</p>	<p>2 נק' – הסבר נכון (גם אם לא סומנה תשובה או אם סומנה תשובה שגiosa)</p> <p>0 נק' – תשובה ללא הסבר או תשובה הכלולת הסבר שגוי (גם אם סומנה תשובה נכונה)</p>	2,0

המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	התשובה הנכונה	ההנחיות לקידוד	הערכתים לקידוד
19	פתוח	בבנייה זהה 3 ילדים ב ממוצע למשפחה.	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0
20	פתוח	100	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0
21	ר"ב	(4)		2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה
22	פתוח	סרטוט מלבן ששטחו 8 משבצות כאליה:	1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	1,0
23	פתוח	6 ס"מ	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0




המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	התשובה הנכונה	התנחות לקידוד	הערלים לקידוד
24	פתוח	א. $31\frac{1}{2}$ סמ"ר	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0
25	פתוח	ב. הסבר הכלול התייחסות לרכיבים הבאים: רכיב 1: חישוב נכון של שטח ריבוע (למשל, שטח הפטקית) ו/או של שטח המלבנים המרכיבים את צורת ה"ריש", גם ללא כתיבת תרגילים	3 נק' – הסבר הכלול את שלושת הרכיבים 2 נק' – הסבר הכלול שני רכיבים בלבד 1 נק' – הסבר הכלול רכיב אחד בלבד 0 נק' – הסבר שגוי במקרה של חלוקת המתחום לריבועים של 1 סמ"ר ולמשולשים ישראיזוויט, יש לתת את מלאה הנקודות רק אם הוצג הסבר המתיחס ליחס שבין שטח המשולשים לשטח הריבועים. ** יש לבדוק את סעיף ב' גם אם התשובה בסעיף א' שגויה.	3-0
25	פתוח	א. 27 סמ"ק	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0
25	פתוח	ב. 9 סמ"ר	1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	1,0
25	פתוח	ג. 54 סמ"ר	1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	1,0

המשך בעמוד הבא

מספר הפרויקט	סוג הפרויקט	התשובה הנכונה	הנתניות לקידוד	הערכתים לקידוד
26	פתוח	<p>אחת מאפשרויות הפתרון האלה:</p> <p>I.</p> <p>II.</p> <p>III.</p> <p>IV.</p> <p>V.</p> <p>VI.</p> <p>VII.</p> <p>VIII.</p>	<p>2 נק' – תשובה נכונה</p> <p>0 נק' – תשובה שגויה</p> <p>* כל סרטווט שהוא תמונה ראי של אחד הסרטווטים המוצגים, ייחשב תשובה נכונה.</p>	2,0

← המשך בעמוד הבא

מספר הפריט	סוג הפריט	התשובה הנכונה	התנחות לקידוד	הערבים לקידוד
27	פתוח	a.		1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה
	פתוח	b.		1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה
	פתוח	c.		1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה
28	פתוח	a. 2 או כל ייצוג מספרי אחר של מספר זה.		2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה
	פתוח	b. $11\frac{1}{9}$ או כל ייצוג מספרי אחר של מספר זה. התשובה $10\frac{10}{9}$ תיתחשב תשובה נכונה.		2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה
	פתוח	c. $1\frac{5}{6}$ או כל ייצוג מספרי אחר של מספר זה.		2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה
	פתוח	4		2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה

המשך בעמוד הבא

מספר הפרויקט	סוג הפרויקט	התשובה הנכונה	ההנחיות לקידוד	הערכתים לקידוד
30	פתוח	9	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	2,0
31	פתוח	. א. $\frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \frac{9}{12} + \frac{8}{12}$ או כל שני שברים אחרים שהמכנה שלהם * כתיבת המוניה של אחד השברים בלבד תיחסב תשובה שגوية.	1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	1,0
32	ר"ב	. ב. $\frac{5}{6} + \frac{2}{9} = \frac{15}{18} + \frac{4}{18}$ או כל שני שברים אחרים שהמכנה שלהם * כתיבת המוניה של אחד השברים בלבד תיחסב תשובה שגوية.	1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	1,0
33	פתוח	. ג. $\frac{2}{5} + \frac{2}{3} = \frac{6}{15} + \frac{10}{15}$ או: $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{1}{15} + \frac{10}{15}$ או כל שני שברים אחרים המתאימים לשווין.	1 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	1,0
34	פתוח	3 צעדים	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	2,0
35	פתוח	המשך בעמוד הבא	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגوية	2,0

מספר הפריט	סוג הפריט	התשובה הנכונה	הנתניות לקידוד	הערלים לקידוד
35	ר"ב	2.9 (2)	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0
36	ר"ב	$3 + \frac{5}{100}$ (3)	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0
37	פתוח	0.54	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0
38	פתוח	א. 30 ליטרים	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0
	פתוח	ב. $\frac{1}{6}$ או $\frac{10}{60}$ או כל ייצוג מספרי אחר של מספר זה.	2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה	2,0
39	פתוח	תשובה: לא ニימוקים אפשריים: I. נימוק המבוסס על חישוב מספר העמודים בכל אחד מהספרים. II. נימוק המבוסס על כך שר 20 עמודים הם חלק שונה בכל אחד מהספרים, או שר $\frac{1}{4}$ גדול מ- $\frac{1}{3}$, ולכן השלים שונים. נימוק זה חייב לכלול התייחסות לשני גודל החלק לשלים (מספר העמודים בספר).	2 נק' – נימוק נכון 0 נק' – נימוק שגוי או תשובה ללא נימוק * התשובה "לא" ללא נימוק תיחס בתשובה שגויה.	2,0

ג.2 הנחיות לבדיקת המבחן ולחישוב הציונים

כללי

מושע כי המבחנים של כל כיתה יבדקו בידי צוות המורים למתמטיקה בבית-הספר. כמו כן, מוצע שרכז המקצוע או רצוי השכבה, או מי שימונה לצורך כך בידי מנהל בית-הספר, ילו את התהליך זהה. יש לבדוק את המבחנים בהתאם למבחן המצורף לעיל (ג.1) ובמצידות אלו. זכרו כי תוצאות המבחנים נועדו לשימוש פנימי, ובית-הספר אינו נדרש לדוח עליהן לכל גורם שהוא.

כלי עזר לחישוב הציונים של המיצ"ב הפנימי ולמיפויים

ראם"ה מעמידה לרשות בית-הספר שני כלים ממוחשבים לחישוב ציונים ולמיפוי הישגים: **מערכת המנב"ס/המנבsson והמייצבת**, שפותחה בידי ראמ"ה. כלים אלה מחשבים את הציונים ברמת התלמיד באופן אוטומטי, מספקים נתונים ניתנים להשוואה בין קבוצות תלמידים ומאפשרים קבלת תרשימים ברמת הכתיבה או ברמת השכבה. שני הכלים האלה מתאימים לשימוש רק בבית-הספר שהעבירו את המבחן בשלמותו.

נוסף על הכלים הstattistischen האלה, מצורפים למחברות המבחן כלים ידניים לחישוב הנתונים – **דף ריכוז ציוניים לתלמיד ודף מיפוי כתתי** היכולים להיות שלב מקדים (כלי תומך) לפני הקלחת הנתונים למנבsson או למייצבת.

כדי שהייה אפשר לקבל תמונה בית-ספרית, יש לקבל החלטה אחידה בנוגע לכלי שימוש את בית-הספר לעיבוד הנתונים. יש להנחות את כלל המורים בבית-הספר **להשתמש בכלים בית-ספרית אחיד לניתוח כל תוצאות המיצ"ב הפנימי**: מנב"ס/מנבsson או מייצבת (כלי המבוסס על אקסל). כדי להגיע לידי ההחלטה בית-ספרית יש להביא בחשבון את רמת המיומנות של כלל מורי בית-הספר בכל היבוד השונים: השימוש במיצבת מתאים למורים שיש להם שליטה בסיסית בתוכנת אקסל, והשימוש במנבsson מתאים למורים בעלי מיומנות בסיסית בעבודה עם מרכיבים במנבsson.

א. חישוב הציונים באמצעות המnb"ס ומנבsson

מערכות המnb"ס ומנבsson הותאמו להזנת הנתונים של מבחני המיצ"ב הפנימיים, והן כוללות משק המאפשר לבית-הספר לקלוט את מבחני המיצ"ב הפנימיים ישירות למנבsson או למnb"ס, לשם הקלחת ציוני המיצ"ב הפנימי. תיעוד הציונים במנב"ס/במנבsson מאפשר לשמר אותם ולשלבם בתכנית ההערכתה של בית-הספר. נוסף על כך, תיעוד הציונים במנב"ס/במנבsson מאפשר להפיק דוחות ייחודיים למיצ"ב הפנימי הכוללים השוואת נתונים הארץים המבוססים על נתונים המיצ"ב החיצוני.

להדרכה ולתמייה אפשר לפנות למועד השירות והתמייה של מינהלת יישומי המnb"ס ביום א'-ה', בשעות 07:30-22:30 (מומלץ לפנות אחרי השעה 15:30), וביום ו' ובערבי חג בשעות 14:00-07:30, **טלפון: 9298111-03.**

דו"ל לתמייה: moked-manbas@kishurim.k12.il

אתר האינטרנט של מינהלת יישומי המnb"ס: www.education.gov.il/manbas

ב. חישוב הציונים באמצעות המיצביות

ראם"ה מעמידה לרשות בתיה הספר "מיצביות-כיתתיות" ו"מיצביות-שבכתיות" לחישוב ההישגים במיצ"ב הפנימי ולמיפויים. **המיצביות שפותחו בעבר כל אחד מ מבחני המיצ"ב הפנימי** הן **קובצי אקסל שהותאמו למבנה הייחודי של כל מבחן**. המיצביות הכתתיות מאפשרת לחשב את הציונים של תלמידי הכתה בבחן המיצ"ב הפנימי, ומספקת תומנות מצב של הישגי הכתה בבחן. המיצביות השכבותית מספקת נתוניים שונים: (1) על הישגי כלל התלמידים בשכבה; (2) על השוואת הישגי הכתות המקבילות בבחן המיצ"ב הפנימי; (3) על השוואת בין נתוני הشنכבה לנתוני קבוצות ההשוואה הארציות (הנורמות הארציות) המבוססים על נתוני המיצ"ב החיצוני. המיצביות יפורסמו באתר ראמ"ה כתובת: <http://rama.education.gov.il> בקטgorיה "מיצ"ב פנימי תשע"א" סמוך למועד המיצ"ב הפנימי.

ג. חישוב הציונים באמצעות ידני

כדי לחשב את הציונים באמצעות ידני אפשר להיעזר בדף ריכוז הציונים הידני של כל תלמיד ו/או בדף המיפוי הכתתיי. דפי ריכוז הציונים הידניים של כל התלמידים (40 עותקים) וכן דף מיפוי כתתיי מצורפים במעטפה. ראו בעמודים 38-39 דוגמה לדף ריכוז ציוניים מלא, שהושבו בו כל הציונים של תלמיד אחד, ודוגמה לדף ריכוז ציוניים ריק. כדי זה הותאם להעברת המיצ"ב הפנימי, ונועד לאפשר למורי בית-הספר לבדוק את המבחנים בדרך יעה ונוחה.

להלן הנחיות לביקורת המבחן ולהישוב הציונים באמצעות ידני:

1. הנחיות כלליות

- בדיקת השאלה בבחן לפי המבחן המצורף: אפשרויות הניקוד בכל סעיף ובכל שאלה מוגדרות מראש במחוון ומצוינות בהתאם לכך בדף ריכוז הציונים. יש לסמן בדף ריכוז הציונים את הניקוד לכל שאלה או סעיף.
- דין שאלה שלא ענו עליה דין תשובה שגויה. שני המקרים יקבל התלמיד אפס נקודות. עם זאת, מומלץ שהמורה ירשום לעצמו את השאלה שהתלמידים לא השיבו עליהם, כדי שיוכל ללמוד מהן על נושאים שהכתה מתקשה בהם או שלא למדה אותם.

2. הנחיות לחישוב ידני של ציון התלמיד בכל נושא בבחן

בעבור כל תלמיד יש לחשב את הציון בכל אחד משלוש הנושאים הבאים בנפרד: ציון במספרים שלמים, ציון בגאומטריה ומדידות וציון בשברים. מחשבים את הציון בכל נושא על-פי סכום הנקודות הכלול שצבר התלמיד באותו הנושא מתוך כלל הנקודות בנושא (כל נושא מופיע בטור נפרד בדף ריכוז הציונים לתלמיד).

3. הנחיות לחישוב ידני של הציון הכלול בבחן

הציון הכלול בבחן מחושב על-פי סכום הנקודות שצבר התלמיד בכל הנושאים. טווח הציונים נע בין 0 ל-100.

4. הנחיות לשימוש בדף המיפוי הכיתתי ולחישוב מדדים כיתתיים

- דף המיפוי הכיתתי המופיע בהמשך נועד לאפשר את חישובם של המדדים הניתנים ברמת הפריט, ברמת הנושא וברמת הציון הכלול של המבחן. בתום בדיקת המבחנים מומלץ להעתיק את הציונים של כל תלמיד בפרטים המשתיכים לוותו נושא, ולאחר כך לחשב את הציון המוצע של כל התלמידים בכיתה ברמת הפריטים, ברמת הנושאים וברמת המבחן כולו.
- שימושו לבב כי בדף המיפוי הכיתתי הפריטים מסוודרים לפי נושאים. דף המיפוי הכיתתי מוצג בחוברת זו לשם דוגמה והוא גם מצורף במעטפה לשימושכם.
- נתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות) **איןם** כוללים עולים חדשים ותלמידים המקבלים תמיינה מתכנית השילוב. לכן, כדי להשוות את המוצע הניתני לנוטונים אלה (כאשר הם יתפרסמו), יש לחשב את המוצע הניתני בלי קבוצות התלמידים אלה.
- כמו כן, מומלץ לחשב ממוצע כיתתי הכלול תלמידים בעלי לקויות למידה ומוצע כיתתי שאין כולל את התלמידים אלה, בעיקר אם תנאי הבדיקה שלהם שונים בתכלית.

ג.3 התאמת חישוב הציונים לצורכי בית-הספר

המייצ"ב הפנימי נועד לשימוש פנים בבית-ספר ולכן הוא יכול להיות מרכיב בחישוב הציון הסופי בתעודה, וזאת לפי החלטת בית-הספר. להלן כמה אפשרויות לחישוב ציוני התלמידים:

א. מתן ציון לפי כלל השאלות ב מבחון המקורי. ציון זה מאפשר השוואת ציוני קבוצות ההשוואה שיפורסמו על-ידי ראמ"ה.

ב. מתן ציון רק על בסיס השאלות והנושאים שנלמדו בכיתה.

ג. מתן שני ציונים, האחד על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בכיתה, והאחר על בסיס המבחן בכללותנו. הציון המבוסס על כלל המבחן מאפשר השוואת ציון בית-הספר לציון של קבוצות ההשוואה.

ד. מתן שני ציונים, ציון אחד על בסיס השאלות בנושאים שנלמדו בשנת הלימודים הנוכחית, וציון אחר (בעבור המורה) המתבסס על השאלות בנושאים שנלמדו בעבר או בנושאים שעדיין לא נלמדו.

הערות:

* אפשרויות א, ג, ד מחייבות להעביר את המבחן במתכונתו המלאה, גם אם רק חלק מן הנושאים נלמדו בכיתה.

** אם המבחן לא הועבר לתלמידים במתכונת מלאה, יש לעורך שינויים במספר הנקודות המוקצחות לכל שאלה ו שאלה, וזאת על-פי שיקול דעתו של המורה.

ג.4 השוואת נתוני קבוצות ההשוואה (נורמות ארציות)

ראמ"ה תפרסם את נתוני קבוצות ההשוואה (כלל בת-הספר, בת-ספר דובי עברי ובת-ספר דובי ערבית) על סמך התוצאות של בת-הספר שנבחנו ב מבחון המייצ"ב החיצוני. בית-הספר יוכל להשוות את הישגים של בת-ספר דומים. הסברים בנוגע להשוואה זו יפורסםו באתר האינטרנט של ראמ"ה בעוד כמה חודשים. זכרו, אם תחליטו לעורך שינויים כלשהם ב מבחון (במבנהו, באופן העברתו או באופן הערכתו), לא תוכלו להשוות את הישגים שלכם לנתוני קבוצות ההשוואה.

דף ריכוז ציוניים לתלמיד

דוגמה למילוי דף ריכוז ציוניים לתלמיד (לחישוב ידני) – **מתמטיקה לכיתה ה' – מיצ"ב פנימי התשע"א**
יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון.

כיתה: 4^ה

שם התלמיד/ה: רותי

শברים	השאלה
0	3 שאלה
0	4 שאלה
0	5 שאלה
0	6 שאלה A27
0	7 שאלה B27
0	8 שאלה ג'27
0	9 שאלה א'28
0	10 שאלה ב'28
0	11 שאלה ג'28
0	12 שאלה א'29
0	13 שאלה ב'29
0	14 שאלה ג'29
0	15 שאלה A30
0	16 שאלה B30
0	17 שאלה ג'30
0	18 שאלה A31
0	19 שאלה B31
0	20 שאלה ג'31
0	21 שאלה A32
0	22 שאלה B32
0	23 שאלה ג'32
0	24 שאלה A33
0	25 שאלה B33
0	26 שאלה ג'33
0	27 שאלה A34
0	28 שאלה B34
0	29 שאלה ג'34
0	30 שאלה A35
0	31 שאלה B35
0	32 שאלה ג'35
0	33 שאלה A36
0	34 שאלה B36
0	35 שאלה ג'36
0	36 שאלה A37
0	37 שאלה B37
0	38 שאלה ג'37
0	39 שאלה A38
0	40 שאלה B38
0	41 שאלה ג'38

גאומטריה ומדיימות	השאלה
0	6 שאלה
0	7 שאלה
0	8 שאלה
0	9 שאלה
0	20 שאלה
0	21 שאלה
0	22 שאלה
0	23 שאלה
0	24 שאלה A24
0	25 שאלה B24
0	26 שאלה ג'24
0	27 שאלה A25
0	28 שאלה B25
0	29 שאלה ג'25
0	30 שאלה A26
0	31 שאלה B26
0	32 שאלה ג'26

מספרים שלמים	השאלה
0	שאלה A
0	שאלה B
0	שאלה 2
0	שאלה 10 A
0	שאלה 10 B
0	שאלה 10 ג'
0	שאלה 11
0	שאלה 12
0	שאלה 13
0	שאלה 14
0	שאלה 15
0	שאלה 16
0	שאלה 16 B
0	שאלה 17 A
0	שאלה 17 B
0	שאלה 17 ג'
0	שאלה 17 ד'
0	שאלה 18
0	שאלה 19

$\frac{35}{40} \times 100 = 87.5\%$	$\frac{19}{26} \times 100 = 73.1\%$	$\frac{28}{34} \times 100 = 82.4\%$	צינויים באחוזים
צ'ון בשברים	צ'ון בגאומטריה ומדימות	צ'ון במספרים שלמים	
<u>87.5</u> נק' (סכום הנקודות במספרים שלמים, בגאומטריה ומדימות ובשברים)			צ'ון כולל

הנחיות להרבה מילים וסימני ערך נגדי נזקיקם.

דף ריכוז ציונים לתלמיד

דף ריכוז ציונים לתלמיד (לחישוב ידני) – מ athematics לכיתה ה' – מצ"ב פנימי התשע"א

יש לסמן את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחובן.

שם התלמיד/ה: _____ כיתה: _____

শברים			השאלה
0		2	3 שאלה
0	1		4 שאלה
0		2	5 שאלה
0	1		A27 שאלה
0	1		B27 שאלה
0	1		C27 שאלה
0		2	A28 שאלה
0		2	B28 שאלה
0		2	C28 שאלה
0		2	A29 שאלה
0		2	B29 שאלה
0		2	C29 שאלה
0	1		A30 שאלה
0	1		B30 שאלה
0	1		C30 שאלה
0	1		A31 שאלה
0	1		B31 שאלה
0	1		C31 שאלה
0	1		A32 שאלה
0		2	B32 שאלה
0		2	C32 שאלה
0		2	A33 שאלה
0		2	B33 שאלה
0		2	C33 שאלה
0		2	A34 שאלה
0		2	B34 שאלה
0		2	C34 שאלה
0		2	A35 שאלה
0		2	B35 שאלה
0		2	C35 שאלה
0		2	A36 שאלה
0		2	B36 שאלה
0		2	C36 שאלה
0		2	A37 שאלה
0		2	B37 שאלה
0		2	C37 שאלה
0		2	A38 שאלה
0		2	B38 שאלה
0		2	C38 שאלה
0		2	A39 שאלה
0		2	B39 שאלה
0		2	C39 שאלה

גאומטריה ומידאות			השאלה
0		2	6 שאלה
0		2	7 שאלה
0		2	8 שאלה
0		2	9 שאלה
0		2	20 שאלה
0		2	21 שאלה
0	1		22 שאלה
0		2	23 שאלה
0		2	24 שאלה
0	1	2	24 שאלה
0	2		25 שאלה
0	1		25 שאלה
0	1		25 שאלה
0		2	26 שאלה

מספרים שלמים			השאלה
0		2	שאלה 1 א
0		2	שאלה 1 ב
0		2	שאלה 2 א
0		2	שאלה 10 א
0		2	שאלה 10 ב
0		2	שאלה 10 ג
0		2	שאלה 11
0		2	שאלה 12
0	1	2	שאלה 13
0		2	שאלה 14
0		2	שאלה 15
0		2	שאלה 16 א
0		2	שאלה 16 ב
0	1		שאלה 17 א
0	1		שאלה 17 ב
0	1		שאלה 17 ג
0	1		שאלה 17 ד
0		2	שאלה 18
0		2	שאלה 19

$\frac{(\quad)}{40} \times 100 = \underline{\quad} \%$	$\frac{(\quad)}{26} \times 100 = \underline{\quad} \%$	$\frac{(\quad)}{34} \times 100 = \underline{\quad} \%$	ציונים באחוזים
ציון בשברים	ציון בגאומטריה ומדידות	ציון במספרים שלמים	
נק' (סכום הנקודות במספרים שלמים, בגאומטריה ומדידות ובשברים)		ציון כולל	

הנ' (זאת גראDED כ-50% מכך מהציון ב-100%).

דף מיפוי כיתה – מתמטיקה לכיתה ה' מיצ"ב פנימי התשע"א

יש לרשום את מספר הנקודות שקיבל התלמיד בכל שאלה או סעיף בהתאם למפורט במחוון

הציון הכול ב考场	שברים																				גאומטריה ומדידות (המשך)						
	39	38	38 ב	38 א	37	36	35	34	33	32	32 ב	32 א	31 ג	31 ב	31 א	30	29	28	28 ב	28 א	27 ג	27 ב	27 א	5	4	3	
הציון בנושא	26	25	25 ג	25 ב	25 א	24 ב																					
																											1
																											2
																											3
																											4
																											5
																											6
																											7
																											8
																											9
																											10
																											11
																											12
																											13
																											14
																											15
																											16
																											17
																											18
																											19
																											20
																											21
																											22
																											23
																											24
																											25
																											26
																											27
																											28
																											29
																											30
																											31
																											32
																											33
																											34
																											35
																											36
																											37
																											38
																											39
																											40

ממוצע כייתי של כל התלמידים: _____ מוצע כייתי ללא תלמידים משולבים ועלים: _____

פרק ד': הפקת תוצאות מהבחן

ניתוח פרטיים – מבחן המיצ"ב התשע"א, מתמטיקה לכיתה ה'

הפרק שלפניכם יסייע לכם לנתח את מבחן המיצ"ב הפנימי לשנת התשע"א ואת תשובות התלמידים לשאלות המבחן.

בפרק שני חלקים :

בחלק הראשוני מופיע ניתוח של כל אחת מהשאלות בבחן. הניתוח מתיחס למרכיבי תוכן, למילויו ולקשר לתכניות הלימודים.

בניתוח השאלה מצוינות רמת החשיבה המוצופה בשעת הפתרון ורמת הקושי המשוערת של כל שאלה. כמו כן, לכל שאלה נערך ניתוח של הידע הדרוש לפתורן השאלת, מובאות אסטרטגיות צפויות לפתורן ומפורטים קשיים או שגיאות העשויות להתעורר בשעת הפתרון השאלת. בחלק מהשאלות מוצגות דוגמאות לתשובות של תלמידים, וניתוח שלחן. אנו מכוונים שניתוחים אלה יסייעו לכם להבין את התשובות של תלמידיכם ולנתח את דרכי עובודתם. **בחלק השני** מופיע מיוון שאלות המבחן למקבצים העוסקים בנושאים שונים ובמיומנויות שונות. מיוון זה מאפשר לכם התבוננות רחבה יותר על הביצועים של התלמידים בהקשר לנושא או למילויו מסויימים. מומלץ שלא להסתמך על ניתוח של שאלה אחת. חשוב לבחון הבנה של נושא דרך התבוננות במגוון מיומנויות המוצגות בשאלות שונות. כדי להקל עליכם להתרשם מכמה פרטיים שנדרש בהם ידע דומה, מוגשת בסוף הפרק הצעה להבוננות במקבצים של שאלות העשויות להציגו על נושא אחד או על מיומנות אחת. יחד עם זאת, יש לזכור מספר השאלות בבחן מצומצם, ולאיתור ידע מעמיק בנושא ספציפי אין להסתפק רק בשאלות שבבחן זה.

לצד הנתונים הכלומתיים שניתנו להפקה מהבחן, מומלץ להתעמק בתשובות התלמידים ולנסות להבין את דרכי החשיבה שהניעו אותם להשיב כפי שהשיבו על השאלה. עיוון מעמיק בתשובות התלמידים מאפשר לנתח את דרכי הפתרון שלהם, את התפיסות השגויות שלהם ואת הטיעיות, ולהכיר את דרכי העבודה והלמידה של כל תלמיד בrama האישית, וכן את דרכי העבודה ברמת הכתיבה וברמת בית-הספר. לנוחיותכם, בכל שאלה מוצג גם החלק הרלוונטי מהבחן.

אנו מכוונים שהחומר המובא בפרק זה יסייע לכם לנתח את ההוראה על בסיס נתוני ההערכה בצד תכנית הלימודים הנדרשת, ולפתח את המקצועיות שלכם ושל עמיתיכם.

לפניכם כמה הצעות כיצד להיעזר בבחן המיצ"ב הפנימי ובפרק זה במהלך עבודתכם :

1. **ניתוח השאלות השונות המופיעות בבחן על-פי הפרמטרים המופיעים בפרק**
ניתוח כזו עשוי לחזק את הבנת תכנית הלימודים, את הנושאים המתמטיים והדידקטיים, את האפשרויות השונות לשאול ולהתאמת נושא לרמת חיבורם שונים, וכן לכונן להוראה ייעילה יותר.
2. **ניתוח תשובות התלמידים ומיצאת קשרים בין שאלות ובין תשובות שונות של תלמידים**
ניתוח כזו יסייע בקבלה מושג ראשוני על הידע של התלמידים ועל השלייטה של הכתיבה כולה, של קבוצות תלמידים מסוימות ושל כל תלמיד בנפרד בנושאים המרכזיים שתכנית הלימודים. אם במהלך ניתוח כזו עולה חשש שהתלמידים אינם שלוטים בנושא מרכזי, מומלץ להמשיך את הקשיים באמצעות שיחות ודרך הערכה נוספת.
3. **איסוף מידע בגין אסטרטגיות לפתורן, על שגיאות ועל דרכי הנמקה והצדקה**
איסוף מידע זה יאפשר לכם לקבל תמונה כיთנית בנוגע לשימוש באסטרטגיות יעילות יותר ויעילות פחות, בנוגע לכיקול ההנחה ולהציגת דרך העבודה ובוגר לتفسות שגויות העולות להופעה אצל תלמידים מסוימים או בקרב הכתיבה כולה. על בסיס התמונה המתבקשת מומלץ לתכנן את דרכי ההוראה העתידיות של הכתיבה ושל כתיות אחרות בבית הספר.

4. שימוש במידע המופק מה מבחן בשעת תכונון ההוראה לשנת הלימודים הבאה
בתכנון ההוראה של כל נושא חדש להביא בחשבון את הידע הקודם הקודם הדרוש לתלמידים כדי ללמידה את הנושא, ואת העקרונות המתמטיים שאמורים להיות מושגים בפרק החדש. הידע הקודם כולל הבנת מושגים, ידע פרטצדורלי והבנת עקרונות מתמטיים. ניתן להיעזר בתובנות שיעלו מניתוח שאלות המבחן ותשובות התלמידים, על מנת ללמידה על ההבנה של התלמידים ועל השיטה שיש להם בחומר הנדרש למידת הנושא החדש. כמו כן, על בסיס התמונה המתבקשת מתשובות התלמידים, מומלץ להציג זמן במהלך ההוראה ללימוד המומנויות הנדרשות על-פי תכנית הלימודים, כגון: חישובים בעל-פה, מודעות לשימוש בתובנה חשבונית ופעולות פיתוח הראייה החזותית.

5. ניתוח השאלות ב מבחן ותשובות התלמידים על-פי רמות החשיבות המצופות בפתרון השאלה
חשוב לשים לב שבשלבי הלמידה השונים או בכל חזרה או הבניה מחדש מוחדשת של ידע, כדאי להציג לתלמידים מגוון של שאלות באותו נושא, בין היתר שאלות אלגוריתמיות וכן שאלות הדורשות רמת חשיבה גבוהה והסביר של דרכי הפתרון. חשוב לזכור שתרגול "שאלות דומות" הופך במשך הזמן לידע אלגוריתמי, ואין מפתח חשיבה ברמה גבוהה או יכולת פתרון של שאלות שאינן מוכחות. יחד עם זאת, יש לזכור שהידע המתמטי כולל גם יכולת אלגוריתמית.

מומלץ שהנитוחים השונים של המבחן ייעשו על-ידי צוות המתמטיקה בבית הספר, ששותפים בו מורים המלמדים מתמטיקה בכיתות השונות.

שימוש לב :

- א. בניתוח השאלות מוצגות דוגמאות שונות לאסטרטגיות מצופות לפתרון וכן דוגמאות לקשיים העולמים להופיע. ניתן שתתרשו בכיתתכם אסטרטגיות נוספות שהובילו לתשובה נכונה או שגויה. כדי להבין את האסטרטגיה חשוב לשוחח עם התלמידים ולש特派 אותם בפערו דרך החשיבה שלהם ובבנת התהליך שהוביל לתשובה.
- ב. מספר השאלות ב מבחן מצומצם, ולכן ניתן לשגיאה או שחורה הבנה הם מקרים, אך לעיתים הם גם עשויים להעיד על קושי. כדי לוודא אם קיים קושי בתחום, עליהם להציג לתלמיד/ה או לקובץ התלמידים מטלות נוספת, לעיתים מדרגות, ולאחר מכן באמצעות שיחה אחר תהליכי החשיבה והעבודה שלהם.
- ג. טיפול אמיתי בקשאים מציריך בנית תכנית מדורגת הכוללת שימוש באמצעי המראה, תרגול התלמידים במבנה עצמיות של יצוגים שונים על-ידי ציור או סרטוט סכמטי, ובנית מסודרת של מושגים ושל מומנויות המקשורות לרעיונות מתמטיים מרכזיים.

מס' השאלה ב מבחון	תיאור השאלה
חלק א' – שאלות ברמה בסיסית	
שאלה מס' 1א	תרגיל חיבור מספר תלת-ספרתי למספר ארבע-ספרתי, עם המרה אחת בעשרות.
שאלה מס' 1ב	תרגיל חילוק מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי, כשהמנה דו-ספרתית.
שאלה מס' 2	שאלה חד-שלבית של כפל מספר תלת-ספרתי (מאות שלמות) במספר דו-ספרתי (עשרות שלמות).
שאלה מס' 3	שאלה חד-שלבית של חישוב חלק של כמהות המבוטא בשבר יסודי.
שאלה מס' 4	תרגיל חיסור שבר משלם.
שאלה מס' 5	בעיה מילולית דו-שלבית שנדרשת בה פעמיים פעולה חיבור, או פעולה כפל ב- 2 ואחריה פעולה חיבור. בתהליך החישוב נדרש המרה אחת של עשרות במאות.
שאלה מס' 6	זיהוי מושג האלכוסון במרובע.
שאלה מס' 7	סדרות קו מאונך לקטען (שאיננו מקביל לשולאים של הדף).
שאלה מס' 8	זיהוי מלבן לאחר השלמת סדרות או דימויי סדרות של מלבן.
שאלה מס' 9	שאלה הבודקת את ידיעת היחס בין קילומטרים למטרים.
חלק ב' – שאלות בנושא מספרים ופעולות בשלמים	
שאלה מס' 10א	תרגיל חיסור מספר ארבע-ספרתי במספר ארבע-ספרתי, עם המרה כפולה (מאות בעשרות ואלפים במאות). בין עובדות החיסור נדרש הידע של העובדה : (a-a).
שאלה מס' 10ב	תרגיל כפל מספר חד-ספרתי במספר תלת-ספרתי. ביצוע התרגיל באמצעות האלגוריתם המסורי יש לבצע שתי המرات.
שאלה מס' 10ג	תרגיל כפל מספר דו-ספרתי במספר דו-ספרתי. ביצוע התרגיל באמצעות האלגוריתם המסורי יש לבצע המרה אחת בתהליך הכפל והמרה אחת בתהליך חיבור המכפלות.
שאלה מס' 11	משוואת חילוק שבה המחולק והמנה הם מספרים דו-ספרתיים.
שאלה מס' 12	משואה בביטוי שיש בו שתי פעולות (כפל וחיסור) והוא שווה ל- 0.
שאלה מס' 13	שאלה הבודקת יכולת שימוש באלגוריתם כלשהו לפירוק מספר דו-ספרתי לגורמים, וזיהוי גורמים ראשוניים מבין הגורמים של המספר.
שאלה מס' 14	בעיה מילולית דו-שלבית שנדרשת בה כפל של מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי, ולאחר מכן חיסור מספר תלת-ספרתי במספר תלת-ספרתי. בפתרון השאלה יש צורך בהבנת המושג "לא יותר מ...".
שאלה מס' 15	בעיה מילולית דו-שלבית שנינתן לפתור אותה באמצעות חילוק של מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי ולאחר מכן חיסור שני מספרים בתחום ה- 10, או באמצעות כפל שני מספרים בתחום לוח הכפל, חיסור מספר דו-ספרתי ממספר דו-ספרתי וחילוק בתחום לוח הכפל.
שאלה מס' 16	שני עניינים : סעיף א' כולל בעיה מילולית חד-שלבית של כפל, וסעיף ב' כולל בעיה מילולית חד-שלבית של חילוק. פתרו שתי הבעיה דורש חשיבה פרופורציונלית ברמה בסיסית (בעיות התאמת).
שאלה מס' 17	ארבעה עניינים המתיחסים לחקר אפשרויות של כפל מספר דו-ספרתי זוגי במספר דו-ספרתי. בין השאר, השאלה בודקת יכולת ניתוח והנמקה של מכפלות אפשריות, אומדן גודל תוצאות, הכרת כפלות של מספר דו-ספרתי בעשרות ובמאות שלמות, הכרת כפלות של מספר, והבנה ויישום של תוכנות הזוגיות של מכפלות.
שאלה מס' 18	בעיה מילולית שיש לבדוק בה כדיות של קנייה באמצעות ניתוח מצבי כפל ויחס ישיר. בתשובה נדרש הסבר של דרך החישוב.
שאלה מס' 19	שאלה מילולית הבודקת חישוב ממוצע.

חלק ג' – שאלות בנושא גאומטריה ומדידות	
שאלה מילולית חד-שלבית הבודקת את ידיעת היחס בין גורם לק"ג. לפתורון השאלה נדרשת הבנת המושג "פי".	שאלה מס' 20
שאלה הבודקת יכולת סרטווט או דימויי סרטווט של אלכסונים במרובעים, וזיהוי משולש שווה-שוקיים.	שאלה מס' 21
שאלה הבודקת יכולת מנית יחידות שטח של מקבילית, וסרטווט מלבן בעל אותו מספר יחידות שטח.	שאלה מס' 22
שאלה הבודקת את הבנת המושג "היקף", חישוב היקף של משולש וחישוב צלע של ריבוע בהתנتوו ההיקף של הריבוע.	שאלה מס' 23
שאלה הבודקת את יכולת היישום של עקרון הפירוק וההרכבה של שטחים לצורך חישוב שטח של צורה מורכבת. חישוב השטח מבוסס על יכולת חישוב שטח משולש ישר-זווית ושטחי ריבועים. לביצוע החישוב נדרש הכרת תוכנות אורך הצלעות בריבוע.	שאלה מס' 24
שאלה הבודקת את הכרת המושגים "נפח קובייה", "שטח פאה" ו"שטח פנים של קובייה", ואת יכולת החישוב שלהם.	שאלה מס' 25
שאלה הבודקת הכרת תוכנות של משולש ישר-זווית ושל מקביליות שונות, יכולת דימוי משולש ישר-זווית ומקביליות שונות ויכולת חלוקת צורה לצורות על-פי קרייטריונים נתונים.	שאלה מס' 26
חלק ד' – שאלות בנושא מספרים ופעולות בשברים	
יצוג שלושה שברים כנקודות על ישר-המספרים.	שאלה מס' 27
שלושה תרגילי חיבור וחיסור שברים ומספרים מעורבים.	שאלה מס' 28
<ul style="list-style-type: none"> • בסעיף א' – חיבור שני שברים בעלי מכנים זרים, שככל אחד מהם הוא ייצוג אחר של המספר 1. • בסעיף ב' – חיבור שני מספרים מעורבים שלחלקים השברים שלהם יש אותו מכנה. • בסעיף ג' – חיסור שבר מספר מעורב. החלקים השבריים בשני המספרים מבוטאים על-ידי מכנים זרים זה זהה. בהמשך ביצוע פעולה החיסור יש צורך לבצע המרה של שלים. 	
משוואת כפל של שבר בגעלם, שהמכפלה היא 1.	שאלה מס' 29
שאלה הבודקת את הבנת הכלכלה של שבר ייחידה במספר שלם באמצעות שימוש במושג "פי".	שאלה מס' 30
שלוש משוואות שהן חלק משוויונות בין שני תרגילי חיבור שברים, והנעלמים הם המונחים של השברים.	שאלה מס' 31
השוואת שברים בעלי מכנים זרים, ומיציאת מספר הנמצא בין שני מספרים.	שאלה מס' 32
בעיה מילולית חד-שלבית שנבדקת בה הchèلت שבר בה כלת שבר, חלוקת חלק משלם לחקלים שווים ושימוש החלקים המתקיים באופן יחסית לשלם.	שאלה מס' 33
בעיה מילולית חד-שלבית שנבדקת בה הchèلت שבר במספר שלם.	שאלה מס' 34
חיסור שבר עשרוני משלם.	שאלה מס' 35
שאלה הבודקת את הכרת מבנה המספר העשרוני: זיהוי הערך שמייצגות הספרות בשבר עשרוני והכרת השבר העשרוני כמספר פשוט שמכנהו חזקה של 10.	שאלה מס' 36
משוואה המוצגת בביטויים קיימים בו שווין בין שני תרגילי חיבור של מספרים עשרוניים.	שאלה מס' 37
שני סעיפים שבכל אחד מהם בעיה מילולית חד-שלבית. בעיה הראשונה נבדקת הבנת השער כחלק מכמות, ובבעיה השנייה יש לבטא את השער שמהווה כמות חלקית מכמות שלמה. בפתרון בעיות יש להציג את דרך החישוב.	שאלה מס' 38
בעיה מילולית חד-שלבית שנבדקת בה המיומנות של השוואת שלמים שונים בהינתן גודל השער כחלק שלם והכמות המתאימה לכל חלק (אותה כמות לחקלים שונים). בפתרון השאלה נדרש הנמקה.	שאלה מס' 39

חלק א' – שאלות ברמה בסיסית

שאלה 1א																																																																																																																													
פתרו:																																																																																																																													
$1,573 + 376 =$																																																																																																																													
תשובה :																																																																																																																													
$1,573 + 376 = 1,949$																																																																																																																													
ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה 0 נק' – תשובה שגויה																																																																																																																													
剖析ן השאלה																																																																																																																													
נושא: מספרים ופעולות שלמים – חיבור וחיסור שלמים ה שאלה בודקת פתרו תרגיל חיבור מספר תלת-ספרתי למספר ארבע-ספרתי, עם המורה אחת בעשרות. התרגיל מוצג במאוזן.																																																																																																																													
רמת חשיבה צפוייה: חישבה אלגוריתמית רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך																																																																																																																													
מופיע בתכנית הלימודים																																																																																																																													
ביתה ג': עמדים 57, 58 – פעולות החשבון בתחום הרבבה																																																																																																																													
הידע נדרש לפתורון השאלה																																																																																																																													
ביתות א'-ב': חיבור וחיסור עד 10, חיבור וחיסור עד 100, מבנה המספרים הדו-ספרתיים והתלת-ספרתיים ביתה ג': מבנה עשרוני של מספרים תלת-ספרתיים וארבע-ספרתיים, חיבור וחיסור בתחום האלפים, אומדן תוצאות																																																																																																																													
סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה																																																																																																																													
א. חיבור המרכיבים השונים של המספרים :																																																																																																																													
$1,573 + 376 =$																																																																																																																													
$1,000 + (500 + 300) + (70 + 70) + (3 + 6) = 1,000 + 800 + 140 + 9 = 1,949$																																																																																																																													
הערה: כתיבת הפתרון בצורה מפורטת מציגה את דרך החשיבה הצפוייה של התלמידים. אין הכוונה שהתלמידים יכתבו את הפתרון בדרך זו. יש להניח שחלק מהתלמידים יחשבו את חלק מהשלבים בעל-פה ויכתבו (ב דרכים שונות) את תוצאות הבינים, כדי שיסייעו להם בחישוב התוצאה הסופית.																																																																																																																													
לדוגמה :																																																																																																																													
<p>Handwritten calculation:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>1</td><td>5</td><td>7</td><td>3</td><td>+</td><td>3</td><td>7</td><td>6</td><td>=</td><td>1</td><td>9</td><td>4</td><td>9</td></tr> <tr><td colspan="4">1,000</td><td colspan="4">500</td><td colspan="4">70</td><td colspan="2">3</td></tr> <tr><td colspan="4">500</td><td colspan="4">300</td><td colspan="4">70</td><td colspan="2">6</td></tr> <tr><td colspan="4">300</td><td colspan="4">200</td><td colspan="4">40</td><td colspan="2">9</td></tr> <tr><td colspan="4">200</td><td colspan="4">100</td><td colspan="4">30</td><td colspan="2">1</td></tr> <tr><td colspan="4">100</td><td colspan="4">70</td><td colspan="4">60</td><td colspan="2">4</td></tr> <tr><td colspan="4">70</td><td colspan="4">60</td><td colspan="4">10</td><td colspan="2">9</td></tr> <tr><td colspan="4">60</td><td colspan="4">10</td><td colspan="4">10</td><td colspan="2">4</td></tr> <tr><td colspan="4">10</td><td colspan="4">10</td><td colspan="4">10</td><td colspan="2">9</td></tr> </table>	1	5	7	3	+	3	7	6	=	1	9	4	9	1,000				500				70				3		500				300				70				6		300				200				40				9		200				100				30				1		100				70				60				4		70				60				10				9		60				10				10				4		10				10				10				9	
1	5	7	3	+	3	7	6	=	1	9	4	9																																																																																																																	
1,000				500				70				3																																																																																																																	
500				300				70				6																																																																																																																	
300				200				40				9																																																																																																																	
200				100				30				1																																																																																																																	
100				70				60				4																																																																																																																	
70				60				10				9																																																																																																																	
60				10				10				4																																																																																																																	
10				10				10				9																																																																																																																	

ב. פירוק המחבר השני למרכיבים, והוספה בשלבים של המרכיבים אל המחבר הראשון :

$$1,573 + 376$$

$$1,573 + 300 = 1,873$$

$$1,873 + 70 = 1,943$$

$$1,943 + 6 = 1,949$$

באסטרטגיית חישוב זו אפשר גם "לפרק" את המחוברים למרכיבים שונים לחבר אותם למשל, בשלב השני אפשר "לפרק" את 70 כך שיהיה קל לחבר את המספרים, לדוגמה :

$$1,873 + 70 = 1,873 + 30 + 40 = 1,903 + 40 = 1,943$$

בחישוב זה נעשה שימוש בחוק הקיבוץ של החיבור.

ג. חישוב במאונך בשלבים :

$$\begin{array}{r} 1,573 \\ + \underline{376} \\ 9 \\ 140 \\ 800 \\ \underline{1,000} \\ 1,949 \end{array}$$

ד. חישוב במאונך בשלבים, כאשר מתחילה לחבר מספרת האלפים :

$$\begin{array}{r} 1,573 \\ + \underline{376} \\ 1,000 \\ 800 \\ 140 \\ \underline{9} \\ 1,949 \end{array}$$

ה. חישוב במאונך על-פי האלגוריתם המסורתי, ושימוש ב"זיכרונו".

דוגמאות לשגיאות או לקשדים העשויים להופיע

א. טעויות הנובעות מאי-הבנת המבנה העשוני וההמרה. במקרה זה עשוות להופיע התשובות האלה :

1. כתיבה רק של ספרת היחידות של כל סכום. הדבר נובע בכך כלל מזכירה טכנית של האלגוריתם ומהסתכלות על כל "טור" כתרגיל בפני עצמו.

$$\begin{array}{r} 1,573 \\ + \underline{376} \\ 1,849 \end{array}$$

.2

$$1,573 + 376 = 1,8149$$

טעות זו נובעת מ"הריגל" לפטור תרגילים במאוזן תוך כדי שמירה על הפרדה בין יחידות לעשרות, למאות ולאלפים. לתלמיד קשה מאוד "לזכור" את היחידות המומורטות, ולכן הוא כותב את כל המספר.

על בסיס אותה טעות יכולה להתקבל גם התוצאה: 18,149. במקרה זה, לאחר שהתלמיד פתר את התרגיל, הוא מיקם את הפסקה על-פי כלל שלמד. תשובה כזו מאופיינת גם בחומר בקרה אומדןית על גודל התוצאה.

ב. טעויות חישוב הנובעות מאי-שליטה בעבודות החיבור עד 20.

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לפ

لتלמידים שהשגיאות שלהם נובעות מחוסר הבנה של המבנה העשוני: פיזיציה, המרות ופריטות. חשוב לבדוק במקביל שאלות נוספות שנדרשת בהן הבנה של עקרונות אלה.

מומלץ לבדוק טעויות הקשורות במבנה העשוני גם בשאלות אחרות, וביצוע אלגוריתמים בשאלות המילוליות.

אצל תלמידים שנמצאו אצלם כמה שגיאות הקשורות במבנה העשוני, חשוב לאטאר את מקור התפיסות השגויות ולטפל בהן. לצורך האיתור והעלאת הצעות לדרכי טיפול ניתן להשתמש בחלק הראשון של ערכת ההערכה לכיתה ד', העוסקת במבנה העשוני ובפעולות החיבור והחישור. במדריך למורה של ערכה זו יש הכוונה לנитוח שגיאות של תלמידים והצעות לדרכי עבודה עם התלמידים. להלן קישור

לمقالה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/MathematikaKitaDalet/Arca_math_4_2008_heb.htm

שאלה 1ב

פתרונות:

$$75 : 5 =$$

תשובה:

$$75 : 5 = 15$$

ניקוד: 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות שלמים – חילוק מספרים שלמים

ה שאלה בודקת **פתרון תרגילים** חילוק מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי, במקרה שבו המנה דו-ספרתית. התרגיל מוצג במאוזן.

רמת חשיבות צפופה: חשיבה אלגוריתמית

רמת קושי צפופה: יתפרקם בהמשך

מופיע בתוכנית הלימודים

ביתה ג': עמוד 63 – חילוק בתחום המאה

הידע הדרוש לפתרון השאלה

כיתות א'-ב': הבנת ממשמעותו של החילוק (חילוק להחלה וחילוק לחקלים), הכרת מספרים דו-ספרתיים

כיתות ב'-ג': הכרת מבנה המספר ויכולת ארוגן המספר מחדש על-פי המבנה העשרוני שלו ועל-פי מבנים נוספים; ביסוס והרחבה של ממשמעות החילוק, שליטה בעבודות הכפל והחילוק בתחום לוח הכפל

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. ידוע זיכרונו של עובדת הכפל: $15 \times 5 = 75$

ב. בעזרת חוק הפילוג. אפשר לכתוב בדרכים שונות, ולאו דווקא בדרך הפורמלית המקובלת. במקרה זה ניתן לבטא את המוחולק כסכום מספרים על-פי המבנה העשרוני שלו:

$$75 : 5 = (50 + 25) : 5 = 50 : 5 + 25 : 5 + 5 = 10 + 5 = 15$$

ג. בעזרת האלגוריתם המסורתי לחילוק ארוך:

$$\begin{array}{r} 75 : 5 = 15 \\ -\underline{5} \\ 25 \\ -\underline{25} \\ 0 \end{array}$$

דוגמאות לשגיאות או לקשיים העשויים להופיע

א. קושי הנובע מי-היכרות של תרגילי חילוק שהמנה שלהם גדולה מ-10, או מי-התנסות בפתרון תרגילים כאלה.

ב. פתרון בעזרת האלגוריתם לחילוק ארוך: בדרך זו של פתרון קשה לראות את הערך הcoresטי שהחספות במספר מייצגות. לכן תלמידים רבים שוגרים במתן הפירוש של השארית המתתקבלת בתהליך הפתרון. למשל, כתוצאה מחילוק 7 ב- 5 ולאחר מכן מחילוק 5 ב- 5, עשויה להתקבל התשובה השגויה: (שארית 2) $11 : 5 = 75$. זאת בשל השארית המתתקבלת כתוצאה מחילוק 7 ב- 5.

יש להניח שחלק מהתלמידים השוגרים זו מתחילה לבצע את פעולה החילוק מספרת היחידות (כפי שהם רגילים בביטוי כפל וחיבור), ולא מספרת העשרות.

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

לשאלות אחרות שבחן ניתן לראות אם תלמידים שעשו בפתרון התרגיל, מבינים את מהות החילוק. ניתן שחלק מהתלמידים זוכרים עובדות של חילוק ואינם מבינים את המשמעות השונות של הפעולה. תלמידים המכירים את משמעות החילוק להכלה, יכולים לשאול את עצמו כמה פעמיים 15 "נכנס" ב- 75, ולהגיע לפתרון ללא ביצוע אלגוריתם מורכב. חשוב להפנות את תשומת לבם של תלמידים המכירים את משמעות החילוק להכלה לאפשרות פתרון בדרך זו. את התלמידים שאינם מכירים את משמעות החילוק להכלה יש ללמד משמעות זו ולתרגל אותה. הבנת החילוק להכלה חיונית להבנת השברים והפעולות שבهم.

ניתן לאתר קשיים בהבנת משמעויות החילוק השונות באמצעות חילוק שני של הערכה להערכת תלמידי כיתות ד'. כמו כן, ניתן להיעזר במדריך למורה של ערכה זו כדי להיטיב להבין את הקשיים של התלמידים וכדי לתכנן דרכי פעולה מתאימות לסייע.

להלן קישור לערכה :

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/MathematikaKitaDalet/Arca_math_4_2008_heb.htm

שאלה 2

בחבילת דפים אחת יש 500 דפים.

כמה דפים יש ב- 50 חבילות?

תשובה: _____ דפים

תשובה :

25,000 דפים

ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות שלמים – כפל מספרים שלמים

השאלה בודקת **פתרון שאלה חד-שלבית** שיש לבצע בה כפל מספר תלת-ספרתי (מאות שלמות) במספר דו-ספרתי (עשרות שלמות).

רמת חשיבות צפופה: יישום

רמת קושי צפופה: יתרנסם בהמשך

משמעות הלימודים

כיתה ו': עמוד 61 – כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות; עמוד 65 – שאלות כפל וחילוק

הידע הדרוש לפתרון השאלה

כיתות א'-ב': משמעות פעולות הכפל, כפולות של 5, הכרת מספרים דו-ספרתיים ותלת-ספרתיים

כיתה ג': שאלות כפל וחילוק, כפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות

סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

זיהוי מצב כפל ויחסוב תרגיל הכפל: 50×500 .

בדרכ כל החישוב נעשה באופן טכני-אוטומטי תוך כדי שימוש בחוקי הקיבוץ והחילוק:

$$500 \times 50 = 5 \times 100 \times 5 \times 10 = 5 \times 5 \times 100 = 25 \times 1000 = 25,000$$

הפתרון הטכני יבוצע על-ידי הכפל 5×5 והצמדת שלושה אפסים מימין לתוצאה.

דוגמאות לשגיאות או לטעויות העשויות להופיע

א. קושי בזיהוי המצב הכפל. לעיתים תלמידים מתתקשים לזהות את המצב הכפל כאשר המספרים הנתונים בשאלה גדולים. לרוב קושי

זה נובע מעיסוק בעניות כפל וחילוק רק במספרים שהם בתחוםلوح הכפל.

ב. קושי הנובע שימוש באסטרטגיות של סימון נתונים בלי להבין את הסיטואציה. כתוצאה לכך עשויה להתקבל התשובה 10, הנובעת מריאית קשר בין�数ים 500 ו- 1.

ג. טעויות הנובעות מחישוב שגוי של המכפלה. בדרך כלל הצמדת מספר שגוי של אפסים.

ד. חוסר שליטה בעובדת הכפל: 5×5 .

שאלה 3

בספרייה יש 80 ספרים.

$\frac{1}{4}$ מהספרים הם אנגלית.

כמה ספרים אנגלית יש בספרייה?

תשובה: _____ ספרים

תשובה:

20 ספרים

ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשברים – חישוב חלק של כמהות השאלה בודקת פתרון שאלה חד-שלבית של חישוב חלק של כמהות המבוטא בשבר יסודי.

רמת חשיבות צפוייה: יישום

רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

ביתה ג': עמוד 68 – חלק של כמהות המבוטא בשבר יסודי (שבר שהמכנה שלו 1)

ביתה ד': עמוד 78 – שאלות מילוליות בשברים

הידע הדרוש לפתרון השאלה

ביתה ב': הכרת השברים חצי ורבע

ביתה ג': הכרת שברים יסודים, חלק של כמהות המבוטא בשבר יסודי

ביתה ד': שאלות הקשורות למשמעות השבר

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

חלוקת 80 ב- 4 המבוסס על ההבנה ש כדי למצוא רבע של כמהות יש לחלק את הנקודות ל- 4 קבוצות שוות.

דוגמאות לשגיאות או לקשיים העשויים להופיע

א. כתוצאה מחוסר הבנת מהות השבר, תלמידים יכפלו את 80 ב- 4.

ב. כתוצאה מחוסר הבנה של מהות השבר ומהבנת הסיטואציה כסיטואציה שתוננות בה הנקודות הכלליות וכמהות חלקי, תלמידים

$\frac{1}{4} \cdot 80 = 0.80$.

שאלה 4

פתרו:

$$1 - \frac{5}{6} =$$

תשובה :

$$1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

ניקוד : 1 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשברים – חיבור וחיסור שברים פשוטים
השאלה בודקת **פתרו תרגיל** חישור שבר ממשם.

רמת חשיבה צפוייה: חשיבה אלגוריתמית (יש אפשרות של תלמידים יענו ברמת ידע זיהוי).

רמת קושי צפוייה: يتפרנס המשך

מיפוי בתכנית הלימודים

ביתה ד': עמודים 77, 78 – חיבור וחיסור שברים, ייצוג שלמים כמספר

ביתה ה': עמוד 99 – חיבור וחיסור שברים

הערה: בשל לימוד השברים היסודיים (בעלי מונה 1) בכיתה ג', עוסקים בהרכבים שונים של השלים, ובאופן אינטואיטיבי, בעזרת אמצעי המראה, גם בחיבור ובחיסור שברים בעלי אותו מכנה בתחום השלים.

הידע נדרש לפתרון השאלה

ביתה ג': הכרת שברים יסודיים

ביתה ד': הכרת משמעותות שונות של השבר הפשוט, שמות שונים לשבר, ייצוג שלמים כמספר, חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים שווים באמצעות מודלים ואמצעי המראה

ביתה ה': חיבור וחיסור שברים

סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. ציור או דימוי של ייצוג כלשהו של שלם המוחולק ל- 6 חלקים שווים, והפרדה בין חלק אחד ל- 5 החלקים האחרים.

ב. הפיכת השלים ל- $\frac{6}{6}$ וחיסור $\frac{5}{6}$ ממנו.

דוגמאות לשגיאות או לבעיות העשויות להופיע

א. לאחר הפיכת השלים ל- $\frac{6}{6}$ וחיסור $\frac{5}{6}$ ממנו, עלולות להיות טעויות הנובעות מהתיחסות למספרים המופיעים במונה כאל תרגילים,

ובמקביל למספרים המופיעים במכנה כאל תרגילים. במקרה זה עשויה להופיע **התשובה השגויה** זאת:

$$\frac{6}{6} - \frac{5}{6} = \frac{1}{0}$$

ב. חסר הינה שניתן להמיר את 1 ב- $\frac{6}{6}$. במקרה זה יתכן שהתלמיד לא יוכל להמשיך לפטור את התרגיל, כי הוא לא יוכל אייך אפשר

לחסר 5 מ- 1. יתכן גם שימוש על-פי הכלל השגוי של "מחסרים מספר קטן ממשר גדול", ויחסיר את 1 מ- 5.

לדוגמה :

$$1 - \frac{5}{6} = \frac{4}{6}$$

ג. שילוב של שתי התפישות השגויות שהוצעו לעיל בסעיפים א' ו-ב' עשוי להוביל לחיסור 1 מ- 5 במונה ולחיסור 1 מ- 6 במכנה.

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

لتלמידים המתקשים בהבנת מהות השבר. לאחר שייתכן שחלקים פטרו נכון ברומה הטכנית תרגילים בתחום השברים, חשוב לבדוק את הבנתם את מהות השבר באמצעות שאלות נוספת. מומלץ לעבוד עם תלמידים אלה על יצוגים קונקרטיים ורטוטיים סכמטיים, כדי שייווצר אצלם דימוי מנטלי של ייצוג שלם כשב. כאשר בונים את השלים באמצעות גזרות או חלקיים אחרים המיצגים את שברי היחידה, מומלץ ללוות את הבניה ואת הסרטוט כתיבת תרגילי חיבור וחסור. בדרך זו, יש להניח שיתגבעש אצל התלמידים דימוי ברור של שלם שנייהן לארגן אותו באמצעות שברי יחידה שונים שמספרם שווה למכנה שלהם. גיבוש דימוי זה יסייע בהמשך בבניית דימויים מנטליים מורכבים יותר, וגם ישמש כלי לביטוי תרגילים שבפתרון שלהם נדרש שימוש באלגוריתם ואי אפשר לפטור אותם באמצעות שליפה של ידע.

לדוגמה: בשעת הכרת השבר $\frac{5}{6}$, בונים אותו מ- 5 שישיות שמצרפים יחד. צירוף זה יכול להיות מבוטא בתרגיל חיבור:

$$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

בשלב ההכרה גם מתיחסים לייחס שבין השבר לשלים. יחס זה יכול להיות מבוטא בתרגילי חיסור:

$$1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$$

$$1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$$

שאלה 5

מחיר מעיל הוא 180.50 שקלים.

מחיר חולצה הוא 80 שקלים.

דנ' קנה מעיל ושתי חולצות.

כמה שילם דן עבור כל הבדדים שקנה?

תשובה: _____ שקלים

תשובה :

340.50 שקלים או $\frac{1}{2}$ 340 שקלים או 340 שקלים ו- 50agi'

ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשברים – משמעות מספרים עשרוניים, חיבור מספרים עשרוניים
השאלה בזקמת פתרון בעיה מילולית דו-שלבית שנדרשת בה פעמיים פעולה חיבור, או פעולה כפל ב- 2 ואחריה פעולה חיבור של מספרים עשרוניים. בתהליך החישוב נדרש המרה אחת של עשרות במאות.

רמת חשיבות צפואה: חסיבה תהליכיית (יישום)

רמת קושי צפואה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתוכנית הלימודים

ביתה ה': עמוד 101 – משמעות השבר העשרוני; עמוד 102 – חיבור וחיסור שברים עשרוניים

הידע הדרוש לפתרון השאלה

ביתות א'-ב': משמעות חיבור וחיסור, שאלות איסוף, עובדות חישור בתחום - 20, הכרת מספרים דו-ספרתיים

ביתה ג': מבנה עשרוני – המרות, ערך כמותי של כל ספרה, מיקום עשרוני; אלגוריתם של חיבור במאון, אומדן תוצאות, שאלות העוסקות בהמרת שיטות ומטבעות

ביתה ד': הכרת השברים פשוטים, ייצוגים מספריים שונים לשבר

ביתה ה': הרחבה וצמצום, חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים מוכלים, שברים עשרוניים, חיבור שברים עשרוניים

סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. חישוב בעל-פה של המחיר של שתי חולצות: $2 \times 80 = 160$ ו- $160 + 80 = 240$ שקלים.

ב. חישוב התוצאה של התרגילים $80 + 80 = 160$ שקלים + $80 + 80 = 160$ שקלים = 320 שקלים.

$$340.50 = 80 + 260.50$$

$$340.50 = 80 + 260.50$$

דוגמאות לשגיאות או לקשויים העשויים להופיע

א. חישוב המחיר של חולצה אחת ומעיל, ולא של שתי חולצות ומעיל. טעות זו מקורה או בחוסר תשומת לב לעובדה שנקנו שתי חולצות, או ב"קיובון" הנובע מזיהוי פעללה אחת בשאלות מילוליות.

ב. טעויות הנובעת מחוסר שליטה במבנה העשרוני ובחיבור מספרים שהם שונים זה מזה במספר הספרות שלהם.
במקרה זה עשויות להופיע השגיאות האלה:

- שגיאה הנובעת מכתיבה שלא נשמר בה המיקום של הספרות בשני המוחברים:

$$\begin{array}{r} 180.50 \\ + \quad 80 \\ \hline 1780.50 \end{array}$$

- שגיאה הנובעת מאי-הכרת ערך הספרות המייצגות את החלקים השבריים במספר (עשירות, מאיות), וכתיבה שאינה על-פי עקרון הפוזיציה של הכתיבה העשרונית, שפיו יש לכתוב ספרה מתוך ספרה וכותבים מימין לשמאל (על-פי הכלל "יחידות מתחת ליחידות...").

$$\begin{array}{r} 180.50 \\ + \quad 80 \\ \hline 182.10 \end{array}$$


בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

לключиים האלה:


1. קושי לתרגם סיטואציה מילולית למצב מרכיב שנדרש בו יותר פעולה חשוב אחת. במקרה זה יש להניח שהתלמיד יתקשה בכל השאלות שנן דו-שלביות. קושי זה עשוי להופיע גם אצל תלמידים שיעדים בצע חשוביים בתחום מסוימים.
2. קושי בהבנת החלקים השבריים במספר העשרוני (עשירות ומאיות) – עשוי לנבוע מאי-הכרת השבריים העשרוניים.
3. קושי בהבנת המבנה העשרוני של מספרים שלמים, ובקבות כך קושי בהבנת השבריים העשרוניים. אם יש חשד שקיים קושי כזה, חשוב לבדוק במקביל שאלות נוספת שנדרשת בהן הבנה של עקרונות המבנה העשרוני.
פוזיציה, ערך הספרות במספר, המרות ופריטות.
מומלץ לבדוק גם טעויות הקשורות במבנה העשרוני בשאלות נוספות ב מבחנים, וגם את ביצוע האלגוריתמים בשאלות המילוליות.
אצל תלמידים שנמצאו אצלם כמה שגיאות הקשורות במבנה העשרוני, חשוב לאתר את מקור התפיסות השגויה ו לטפל בהן. מומלץ לעבד עם תלמידים אלה על המבנה העשרוני באמצעות אמצעי המכחשה המאפשרים הקבצה והמרה, לצד הדגשת רעיון הפוזיציה, הערך המספרי של הספרות במספר. כמו כן, חשוב להזכיר על חיבור וחיסור בשלמים ובמספרים עשרוניים. חשוב להציג את הדמיון בין שלמים לשברים עשרוניים, במיוחד בביצוע פעולות חיבור וחיסור.

שאלה 6

באיזו מהמקביליות שלפניכם מסורטטים שני האלבසונים שלה?




4



3




2



1

תשובה :



(4)

ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

אפויון השאלה

נושא: גאומטריה ומדידות – הכרת מושג האלבසון במרובע

ה שאלה בודקת **זיהוי מושג האלבסון במרובע**.

רמת חשיבות צפופה: ידע וזיהוי

רמת קושי צפופה: יתרפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

כיתה ד': עמוד 90 – בניית זיהוי של אלבסון במצולע

הידע הדרוש לפתרון השאלה

כיתות א'-ב': הכרת מצולעים

כיתה ג': הכרת מרובעים

כיתה ד': מצולעים, אלבסון במצולע

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

זיהוי המבוסס על הכרת ההגדרה שלפיה אלבסון הוא קטע המחבר בין שני קודקודים שאינם סמוכים זה לזה.


דוגמאות לשגיאות או לקשירים העשויים להופיע

בחירה של קוויים משופעים (שאינם מאונקיים או מקבילים לשולטים של הדף) – נובעת משימוש שפטי במילה "אלבסון".

יש להניח שתלמידים הבודרים במסיק (3) מזיהים באופן חוויתי את מושג האלבסון במרובע, אך הם אינם מקפידים על התנאי הקיים בהגדרת האלבסון – קטע המחבר בין שני קודקודים.

שאלה 7


סרטוטו קו מאונך לקו המודגש.



תשובה :

כל קטע המאונך לקטע הנתון (הקטע או המשכו יוצרים עם הקטע הנתון זווית בת 90°).

למשל :



ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

הערה: קטע מאונך לשורטט מוחץ לגריד המשבצות, ייחס תשובה נכונה.

השאלה

נושא: גאומטריה ומדידות – יחס המאונכות

השאלה בודקת ידע של מושג וסרטוט קו מאונך לקטע המסורטט בצורה "משופעת" (שאיינה מקביליה או מאונכת לדפנות הדף).

רמת חשיבה צפוייה: יישום

רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

ביתה ג': עמוד 69 – מאונכות ומקבילות

הידע החדש לפתרון השאלה

ביתות א'-ב': הכרת קוויים ישרים, הכרה אינטואיטיבית של זווית ישירה


ביתה ג': ישרים מקבילים וישרים מאונכים, זווית ישירה

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה


סרטוט המבוסס על הכרת התוכנה שני ישרים מאונכים יוצרים ביניהם זווית ישירה.

דוגמאות לשגיאות או לבעיות העשויות להופיע

סרטוט של קטע שנמצא במצב מאונך לשולי הדף:



או




טעות זו נובעת משימוש במושג "מאונך" בהקשרים שאינם גאומטריים, למשל: ישר הניצב לישר שהוא מאוזן. בנוסף, קווי הרשות העשויים לעודד טעות מסוג זה. יש להניח של תלמידים שנחשו לישרים מקבילים ומאונכים רק במצב שהם מקבילים או מאונכים לשולטים של דף נייר, תהיה נטייה גדולה יותר לטעות מסוג זה. לכן, במהלך ההוראה חשוב לחשוף את התלמידים לסרטוטים שבהם הקווים אינם בכרח מקבילים או מאונכים לשולי הדף.

שאלה 8

לפניכם סרטיותים של שתי צלעות מרובע.

סמןו את הסרטיות שאמ יוסיפו לו שתי צלעות, יוכל להתקבל מלבן.



תשובה:
(4)



ניקוד: 2 נק' – תשובה נכונה
0 נק' – תשובה שגויה

השאלה

נושא: גאומטריה ומדידות – הכרת מרובעים

השאלה בודקת יכולת **סרטווט** של מלבן או יכולת דימוי של מלבן. הסרטווט והדמיות מבוססים על הכרת התכונות של המלבן.

רמת חשיבה צפופה: יישום

רמת קושי צפופה: יהפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

ביתה ג': עמוד 70 – היכרות עם ריבוע, מלבן

ביתה ד': עמוד 91 – ריבוע ומלבן

ביתה ה': עמוד 112 – מרובעים : ניתוח תכונות, מינון מרובעים

הידע הדרוש לפתרון השאלה

ביתות א'-ב': הכרת מרובעים (זיהוי ובנייה)

ביתות ג'-ד': היכרות עם תכונות הריבוע והמלבן

ביתה ה': ניתוח תכונות מרובעים, ביןיהם הריבוע והמלבן, ומינון מרובעים

סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. התבבשות על תכונות המלבן (אב-טיפוס של המלבן) : זווית ישרה ושתי צלעות סמוכות שאינן שוות באורךן.

ב. ניסוי וטעייה : סרטווט (או דימוי הסרטווט) של שתי הצלעות החסרות בכל התשובות האפשריות או בחלקן, ובבדיקה על-ידי השוואת דימוי שיש לתלמידים למלבן, או על-ידי בדיקת התכונות של המרובע שסורטט.

דוגמאות לשגיאות או לקשיים העשויים להופיע

תלמידים שאינם יודעים לדמיין מלבן, יתकשו לסרטווט את שתי הצלעות החסרות כדי להשלים למלבן.

שאלה 9

כמה מטרים יש בקילומטר אחד?

10 מטרים 1

100 מטרים 2

1,000 מטרים 3

10,000 מטרים 4

תשובה:

(3) 1,000 מטרים

ניקוד: 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: גאומטריה ומדידות – יחידות למדידות אורך
שאלה הבודקת ידע של מושג העוסק ביחס שבין קילומטרים למטרים.

רמת חשיבה צפוייה: ידע

רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתוכנית הלימודים

ביתה ג': עמוד 70 – מדידות אורך במטרים ובקילומטרים

ביתה ד': עמוד 92 – מדידות: חזרה על מדידות אורך

הידע הדרוש לפתרון השאלה

ביתה א'-ב': מדידות אורך, הכרת יחידות האורך "סנטימטר" ו"מטר"

ביתה ג': מדידות אורך ביחידות שונות

ביתה ד': חזרה על מדידות אורך

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

שליפת ידע

דוגמאות לשגיאות או לקשיים העשויים להופיע

חומר שליטה ביחס שבין קילומטר למטר עשוי לגרום לטעות שלפיה יחולש שבסכל קילומטר יש 100 מטרים. טעות זו מקורה בהכרת היחס שבין סנטימטר למטר.

חלק ב' – מספרים ופעולות בשלמים

שאלה 10 א'

פתרו:

$$5,089 - 1,999 =$$

תשובה:

$$5,089 - 1,999 = 3,090$$

ניקוד: 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשלמים – חיבור וחיסור בשלמים
השאלה: בזאת פתרון תרגיל חישור מספר ארבע-ספרתי ממספר ארבע-ספרתי עם המאה כפולה (מאות בעשרות אלפיים במאות). בין עובדות החישור הנדרשות בשאלה, נדרש גם חוק ה-0 בחיבור (a-a).
התרגיל מוצג במאוזן.

רמת חשיבות צפוייה: חשיבה אלגוריתמית

רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

ביתה ג': עמודים 57, 58 – פעולות החשבון בתחום הרבבה

הידע הדרוש לפתרון השאלה

ביתות א'-ב': חיבור וחיסור עד 10, חיבור וחיסור עד 100, בניית המספרים הדו-ספרתיים והתלת-ספרתיים
ביתה ג': בניית עשרוני של מספרים תלת-ספרתיים, חיבור וחיסור בתחום אלפיים, אומדן תוצאות

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. חיסור במאונך על-פי האלגוריתם המקובל.

ב. חיסור בשני שלבים על-ידי שימוש בעיקרונו של שימירת ההפרש :

$$5,089 - 1,999 = 5,090 - 2,000 = 3,090$$

ג. חיסור מספר גדול ב- 1 (חיסור אלפיים שלמים) ולאחר מכן הוספת ה- 1 :

$$5,089 - 2,000 + 1 = 3,089 + 1 = 3,090$$

ד. חיסור בשלבים תוך כדי שילוב אסטרטגיות המבוססות על עקרון הפיצוי ועל ארגון מחדש של המחסר :

$$5,089 - 1,999 = 5,089 - 1,000 - 900 - 90 - 9$$

$$5,089 - 1,000 = 4,089$$

כדי לחסר את 900, נוח מאד לחסר 1,000 ול לחבר 100. כך גם בחיסור 90 וביחסור 9 :

$$4,089 - 900 = 4,089 - 1,000 + 100 = 3,089 + 100 = 3,189$$

$$3,189 - 90 = 3,189 - 100 + 10 = 3,089 + 10 = 3,099$$

כדי לחסר את ה- 90 אפשר גם לחסר 89 ועוד 1 :

$$3,189 - 90 = 3,189 - 89 - 1 = 3,100 - 1 = 3,099$$

בשלב זה נותר לחסר 9 :

$$3,099 - 9 = 3,090$$

הערה: כתיבת הפתרון בצורה מפורטת מציגה את דרך החשיבה הצפוי של התלמידים. אין הכוונה שהתלמידים יכתבו את הפתרון בדרך זו. יש להניח שחלק מהתלמידים יחשבו את חלק מהשלבים או את כולם בעל-פה.

דוגמאות לשגיאות או לקשדים העשויים להופיע

a. בחישור במאונך: טעויות הנובעות מאי-הבנת המבנה העשורי והחמרה. במקרה זה עשוות להופיע התשובות האלה :

בכל מקרה שלא ניתן לחסר, "מוסיפים 10" בלי לבצע המרה ביחסית שגדולה פי 10. פועלה זו מבוססת על הידיעה ה"טכנית" ש"מוסיפים 10", ללא הבנת עקרונות החמרה והפריטה.	-	5,089
		<u>1,999</u>
		4,190
המרת אלף אחד ב- 10 עשרות כדי לאפשר חישור 9 עשרות, ולאחר מכן המרת אלף נוסף במאה כדי לאפשר חישור של 9 מאות.	-	5,089
		<u>1,999</u>
		2,990

b. בחישור במאונך: טעויות הנובעות מתפיסה שגوية שלא ניתן לחסר מספר גדול ממספר קטן, או טעויות הנובעות מחוסר שליטה

בפעולות שיש בהן 0 והנובעות מחוסר הבנה או הכרה של רעיון הפריטה. במקרה זה עשוות להופיע התשובות האלה :

בכל עמודה : חישור המספר הגדל מהמספר הקטן.	-	5,089
		<u>1,999</u>
		4,910

בעשרות : חישור המספר הקטן מהמספר הגדל, ובמאות : שימוש בכל המוטעה שלפיו אם מחסרים מספר מ- 0,

התוצאה היא 0

(אינטואיטיבי מאד ומתאים לתיאור הכלמי - 0 הוא "כלום", ולכן "כלום" אי אפשר לחסר).

הערה : עשוות להופיע שגיאות נוספות המשלבות בין התפיסות השגויות שהוצעו לעיל.

g. שגיאות הנובעות מחוסר שליטה בעבודות החישור עד 20 .

d. שימוש בעקרון הפיזוי של החיבור, במקומות בהבנת תוכנות ההפרש בחישור :

$$5,089 - 1,999 = 5,088 - 2,000 = 5,088$$

החלת עקרון הפיזוי על החישור גורם הגדלה של אחד המספרים והקטנת המספר الآخر כדי להגיע לתרגיל שקל לבצע אותו בעל-פה.

פעולה זו הקטינה את ההפרש ולא שמרה עליו. כדי לשמור על ההפרש יש להקטין את שני המספרים באותו שיעור.

במקרה זה גם בולט חוסר הבקраה האומדנית על התוצאה.

h. ארגון מחודש של המחסר, ולאחר מכן חישור רק של חלק ממנו וחיבור החלק הנוסף. למשל :

$$5,089 - 1,999 =$$

$$5,089 - 1,000 = 4,089$$

$$4,089 + 999 = 5,088$$

טעות זו נפוצה מאוד בקרב תלמידים צעירים העוסקים בחישור מספרים דו-ספרתיים. למשל, בתרגיל :

$$12 - 10 = 24 - 34 \quad \text{ולאחר מכן יוציאו 2, כי כדי לקבל 12 "צריך להוסיף 2 לעשר".}$$

ההסבר המתמטי לטעות הוא :

$$34 - 10 - 2 = 34 - (10 + 2) \neq 34 - 10 + 2$$

גם במקרה זה בולט חוסר הבקраה האומדנית על התוצאה.

i. שימוש שגוי בתוכנות ההגדלה והקטינה של החישור :

$$5,089 - 1,999 = 5,089 - 2,000 - 1 = 3,088$$

גם טעות זו נובעת מהבנה שיש לחסר 1 מ- 2,000 כדי להגיע ל- 1,999 .

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

א. לתלמידים שהשיגוות שלהם נובעת מחוסר הבנה עמוקה של המבנה העשורי: פוזיציה, המרות ופრיטות. חשוב לבדוק במקביל שאלות נוספת שנדרשת בהן הבנה של עקרונות אלה.

מומלץ לבדוק טיעיות הקשורות במבנה העשורי בשאלות אחרות, וביצוע אלגוריתמים בשאלות המילוליות.

אצל תלמידים שנמצאו אצלם כמה שגיאות הקשורות במבנה העשורי, חשוב לאתר את מקור התפיסות השגוויות ולטפל בהן. לצורך האיתור ניתן להשתמש בחלק הראשון של ערכת ההערכה לכיתה ד', העוסק במבנה העשורי ובפעולות החיבור והחיסור. לתשומתיכם, במדריך למורה של ערכה זו יש הכוונה לניתוח שגיאות התלמידים והצעות לדרכי עבודה עם התלמידים. להלן קישור לערכה:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/MathematikaKitaDalet/Arca_math_4_2008_heb.htm

ב. עם תלמידים המשמשים בצורה שגوية בתוכנות החישור חשוב לעבוד על תוכנות החישור במספריים קטנים, ולסייע להם לבסס יכולת לבצע אנלוגיה בין השימוש בחוקי הפעולות במספריים גדולים לפעולות במספריים גדולים.

שאלה 10ב

פתרונות:

$$8 \times 599 =$$

תשובה:

$$8 \times 599 = 4,792$$

ניקוד: 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

פתרון השאלה

נושא: מספרים ופעולות שלמים – כפל במספרים שלמים
השאלה בודקת **פתרון תרגילים** כפל מספר חד-ספרתי במספר תלת-ספרתי. ביצוע התרגילים באמצעות האלגוריתם המסורי יש שתי המרווח.
התרגילים מוצגים במאזן.

רמת חשיבות צפופה: חשיבה אלגוריתמית

רמת קושי צפופה: יתרורסם בהמשך

מופיע בתוכנית הלימודים

כיתה ג': עמוד 62 – כפל במאזן (במספרים חד-ספרתיים)

הידע נדרש לפתרון השאלה

כיתות א'-ב': הבנת משמעות הכפל, הכרת מספרים תלת-ספרתיים

כיתה ג': שליטה בעובדות הכפל בתחום לוח הכפל, כפל בעשרות שלמות, הבנת המבנה העשוי של מספרים תלת-ספרתיים: הערך הנקוטי של כל ספרה, עקרונות הפויזיציה וההמרה; כפל מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי בדרכים שונות, לרבות האלגוריתם לכפל בטור, שימוש בחוק הפילוג, חוקי סדר הפעולות, אומדן תוצאות

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. כפל בעזרת חוק הפילוג:

1. $599 \times 600 = 600 - 1 =$

$$8 \times 599 = 8 \times (600 - 1) = 8 \times 600 - 8 \times 1 = 4,800 - 8 = 4,792$$

2. ייצוג הגורם התלת-ספרטי על-פי המבנה העשוי:

$$8 \times 599 = 8 \times 500 + 8 \times 90 + 8 \times 9 = 4,000 + 720 + 72 = 4,792$$

הערה: כתיבת הפתרון בצורה מפורטת מציגה את דרך החשיבה הצפופה של התלמידים. אין הכוונה שהתלמידים יכתבו את הפתרון בדרך זו. יש להניח שחלק מהתלמידים ייחסבו את כל השלבים או את חלקם בלבד. אחרים יכתבו את ארגון המספר 599 בדרכים שונות, או שיכתבו רק את תוצאות הביניים של המכפלות.

3. ייצוג המספר 8 כ- 2 – 10 ויצוג המספר 599 כ- 600 – :

$$8 \times 599 = (10 - 2) \times 599 = 10 \times 599 - 2 \times 599 = 5,990 - 2 \times 600 + 2 = 5,990 - 1,200 + 2 =$$

$$4,790 + 2 = 4,792$$

4. ייצוג אחד הגורמים בדרך אחרת המאפשרת חישוב מהיר על-פי חוק הפילוג. לדוגמה:

$$8 \times 599 = 4792$$

ב. שימוש בחבנה ש- $2 \times 2 = 8$ וביצוע חיבור מספר לעצמו במקום לכפול ב- 2 :

$$2 \times 599 = 2 \times 600 - 2 = 1,198$$

$$1,198 + 1,198 = 2,396$$

$$2,396 + 2,396 = 4,792$$

ג. כפל בעזרת האלגוריתם (שאינו מקוצר) לכפל מאונך, המבוסס גם הוא על חוק הפילוג. החלפת סדר הגורמים מבוססת על התוכנית:
חולופיות של הכפל:

$$\begin{array}{r} 599 \\ \times \\ \hline 8 \\ 72 \\ 720 \\ \hline 4000 \\ 4792 \end{array}$$

את האלגוריתם שאינו מקוצר אפשר גם לכתוב כך:

$$\begin{array}{r} 500 + 90 + 9 \\ \times \\ \hline 8 \\ 4000 + 720 + 72 = 4792 \end{array}$$

ד. כפל בעזרת האלגוריתם המקוצר לכפל מאונך:

$$\begin{array}{r} 77 \\ 599 \\ \times \\ \hline 8 \\ 4792 \end{array}$$

דוגמאות לשגיאות או לבעיות העשויות להופיע

א. בעיות הנובעים מאי-שליטה בעבודות הכפל.

ב. שגיאות הנובעות מהבנה לקויה של המבנה העשרוני. במקרים אלה עשויה להתקבל תשובות כגון אלה:

1. פתרון הכלול רק את ספרת היחידות של המכפלות. טעות זו יכולה לנבוע כתוצאה מכטיבת ספרת היחידות של המכפלה ללא "שמירה בזיכרון" של העשרות המכפלות:

$$\begin{array}{r} 599 \\ \times \\ \hline 8 \\ 4277 \end{array}$$

2. כתיבת ספרת העשרות של המכפלות (במקום ספרת היחידות) על-פי סדר ה"אמירה" של המספר :

$$\begin{array}{r} 22 \\ \times 599 \\ \hline 8 \\ 4277 \end{array}$$

שגיאות כאלה נובעות בדרך כלל מלמידה אוטומטית של האלגוריתם לכפל בלי מoten תשומת לב :

- להרכיב הכמויות של המספר התלת-ספרתי $(9 + 90 + 500 = 599)$ ולהבין הערכיהם שככל ספרה מייצגת.

• להבנת האלגוריתם והקשר שלו למבנה העשרוני.

ג. שגיאות שמקורן בשימוש שגוי בחוק הפילוג. לדוגמה :

.1

$$599 \times 8 = 500 \times 8 + 99$$

.2

$$599 \times 8 = 600 \times 8 - 1$$


.3

$$599 \times 8 = 600 \times 8 - 599$$

בשלושת המקרים השגיאה קשורה גם להבנת פועלות המכפל.

משמעות המכפל יכולות להיות מיוצגות כ"פעמים" – על התלמידים להבין שבמקרה של התרגיל הזה, המספר 599 מוכפל 8 פעמים או לחופין, המספר 8 מוכפל 599 פעמים. לכן אם מכפילים את המספר 8 ב- 600, הרי המכפלו אותו פעמיים אחת מיותרת ויש לחסר 8, ולא 599 (המקרה של תרגיל 3).

אפשר גם לייצג את המכפלת באמצעות סרטוטים סכמטיים של מלבן שמידותיו הן גורמי המכפלת. לדוגמה :



לשם הנוחיות ביצוע המכפלות ניתן לחלק את המלבן למלבני משנה בדרכים רבות. בייצוג זה ניתן לראות בבירור את המרכיבים השונים של ייצוג התרגיל באמצעות חוק הפילוג.

סטרטגיות אפשריות נוספת המסתמכו על חוק הפילוג הן, בין היתר, "שיטת המקולות" (ראו שאלה 10ב) ו"שיטת המכפל": "העכמתות של נפירות".

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

א. לתלמידים שהשיגוות שלהם נובעת מוחסר הבנה מעמיקה של המבנה העשרוני: פוזיציה, המרות ופრיטות. חשוב לבדוק במקביל שאלות נוספת שנדרשת בהן הבנה של עקרונות אלה.

מומלץ לבדוק טיעיות הקשורות במבנה העשרוני בשאלות אחרות, וביצוע אלגוריתמים בשאלות המילוליות.

אצל תלמידים שנמצאו אצלם כמה שגיאות הקשורות במבנה העשרוני, חשוב לאט את מקור התפיסות השגויות ולטפל בהן. ניתן להשתמש לצורך כך בחלק הראשון של ערך התערכות לכיתה ד', העוסק במבנה העשרוני ובפעולות החיבור והחישור. תשומת לבכם, במדريك למורה יש הכוונה לנитוח שגיאות התלמידים והצעות לדרכי עבודה עם התלמידים. להלן קישור לערך:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/MivchaneyMadafLamore02/MathematikaKitaDalet/Arca_math_4_2008_heb.htm

חשוב מאוד לעזור לתלמידים לראות את הקשר שבין הבנת המבנה העשרוני בפעולות החיבור והחישור, לבין הצורך ביישום עקרונות המבנה העשרוני בתרגילי כפל של מספרים גדולים.

ב. אצל תלמידים שיישמו לצורך שגואה את חוק הפילוג, מומלץ לבדוק את הבנת פעולה הכפל הנו בראיות קבוצות שוות והן מבוסן על "פעמים". בין השאר, חשוב לבדוק אם התלמידים מיחסים את משמעות הכפל גם לפעולות במספרים גדולים, ואם הם מקשרים בין שיטה מלבן לפעולת הכפל. מרבית האסטרטגיות לחישוב כפל מבוססות על חוק הפילוג (כולל האלגוריתם המסורי במאונך). לכן יש חשיבות רבה לשיפור יכולת השימוש בחוק זה. ייצוג פעולה הכפל באמצעות שיטה מלבן היא דרך טובה ויילה על מנת להמחיש את משמעות ה"פעמים" בכפל, את חוק החילוף ואת חוק הפילוג. מודל המלבן יכול לשמש כלי עזר לחישוב מכפלות של מספרים גדולים בהרכבים שונים.

שאלה 10ג

פתרונות:

$$37 \times 14 =$$

תשובה:

$$37 \times 14 = 518$$

ניקוד: 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

أفينו השאלה

נושא: מספרים ופעולות שלמים – כפל שלמים

השאלה בודקת פתרון תרגילים כפל שלם דוא-ספרתי במספר אחד. ביצוע התרגיל באמצעות האלגוריתם המסורתי יש המראה אחת בתהליך הכפל והמראה אחת בתהליך חיבור המכפלות. התרגיל מוצג במאוזן.

רמת חשיבות צפוייה: חשיבה אלגוריתמית

רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

مופיע בתוכנית הלימודים

ביתה ד': עמוד 80 – כפל במאונך בגורם דו-ספרתי

הידע נדרש לפתרון השאלה

כיתות א'-ב': הבנת משמעות הכפל, הכרת מספרים דו-ספרתיים

כיתות ב'-ג': הכרת מספרים בתחום האלפיים – הבנת המבנה העשורי: הערך הcompaniy של כל ספרה, המרות ופוזיציה. שליטה בעבודות הכפל בתחום לוח הכפל, כפל עשרות בעשרות, כפל מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי בדרכים שונות, לרבות האלגוריתם לכפל במאונך, שימוש בחוק הפילוג, חוקי סדר הפעולות, אומדן ווצאות

ביתה ד': כפל מספר דו-ספרתי במספר דו-ספרתי

استراتيجيات צפויות לפתרון השאלה

א. כפל בעזרת האלגוריתם המקוצר לכפל במאונך:

$$\begin{array}{r} 37 \\ \times \\ 14 \\ \hline 148 \\ 37 \\ \hline 518 \end{array}$$

ב. כפל בעזרת האלגוריתם (שאינו מקוצר) לכפל במאונך:

$$\begin{array}{r} 37 \\ \times \\ 14 \\ 28 \\ 120 \\ 70 \\ \hline 300 \\ 518 \end{array}$$

אותה אסטרטגיה יכולה להיכתב גם בצורה זאת:

$$\begin{array}{r} 37 \Rightarrow 30 + 7 \\ \times \\ 14 \Rightarrow 10 + 4 \\ \hline 300 + 70 + 120 + 28 = 518 \end{array}$$

ג. דרכי שונות המבוססות על חוק הפילוג, למשל:

.1


$$37 \times 14 = 37 \times 10 + 37 \times 4 = 370 + (30 \times 4 + 7 \times 4) = 370 + 120 + 28 = 518$$

: או

$$37 \times 14 = 30 \times 10 + 30 \times 4 + 7 \times 10 + 7 \times 4 = 300 + 120 + 70 + 28 = 518$$

הערה: כתיבת הפתרון בצורה מפורטת מציגה את דרך החשיבה הצפוי של התלמידים. אין כוונה שהתלמידים יכתבו את הפתרון בדרך זו. יש להניח שחלק מהתלמידים יחשבו חלק מהשלבים בעלי-פה, או שחלקים יכתבו את שלבי הביניים כתרגילים נפרדים, וויסיפו סימנים שונים המצביעים על "פירוקי המספר" או אפילו על התהילה, בלי שישמר השווון המתמטי.

2. תלמידים רבים משתמשים בסכמאות של מלבן כדי לייצג את תרגיל הכפל. סכמה זו עוזרת להם בשימוש בחוק הפילוג לצורך ביטוי המכפלות החלקיות.




3. שיטת ה"מקלות": גם שיטה זו מבוססת על חוק הפילוג.

השיטה נוחה לשימוש משומש שהיא מאפשרת לייצג את המספרים על-פי ההרכוב העשרוני שלהם בצורה מאוד ברורה.

————— מקל עבה מייצג עשרות.

————— מקל דק מייצג יחידות.



בסך הכל התקבלו:

$$28 \text{ "פגשים" בין יחידות ליחידות} = 28$$

$$12 \text{ "פגשים" בין יחידות לעשרות} = 120$$

$$7 \text{ "פגשים" בין יחידות לעשרות} = 7$$

$$3 \text{ "פגשים" בין עשרות לעשרות} = 300$$

$$\text{סך הכל} = 518$$

דוגמאות לשגיאות או לקשים העשויים להופיע

- א. קשיים הנובעים מאי-שליטה בעבודות הכפל.
- ב. שגיאות הנובעות מהבנה לKOיה של המבנה העשורי. במקרים אלה עשוות להתקבל תשיבות כהלא:
1. לא כתבים ב"זיכרון" כאשר כופלים וגם כאשר מוחברים את המכפלות:

$$\begin{array}{r} 37 \\ \times \\ 14 \\ \hline 128 \\ 37 \\ \hline 498 \end{array}$$

2. מקומות במקומות שגוי את מכפלת העשרות:

$$\begin{array}{r} 37 \\ \times \\ 14 \\ \hline 128 \\ 37 \\ \hline 165 \end{array}$$

- ג. הבנה שגوية של חוק הפילוג:

1. "החלה" של האלגוריתם לחיבור על כפל (כופלים עשרות בעשרות ויחידות ביחידות):

$$37 \times 14 = 30 \times 10 + 7 \times 4 = 300 + 28 = 328$$

שגיאה זו נובעת בדרך כלל מלמידה אוטומטית של האלגוריתם, ללא שלבי ביניים המבוססים על הבנה ועל המחשה.

שגיאה דומה יכולה להופיע גם בחישוב במאונך:

$$\begin{array}{r} 37 \\ \times \\ 14 \\ \hline 28 \\ 30 \\ \hline 328 \end{array}$$

2. חוסר הבנת הקשר שבין מושגים ה"פעריים" לחוק הפילוג:

$$37 \times 14 = 37 \times 10 + 4 = 374$$

בשעת הבדיקה מומלץ לשיטם לב

למגוון האסטרטגיות שהתלמידים משתמשים בהן לפתרון השאלה. מומלץ להציג בכיתה אסטרטגיות שונות, לשוחח על העקרונות של כל אסטרטגיה, לראות מה דומה ומה שונה בין האסטרטגיות ולהשווות בין יעילות השימוש של כל אסטרטגיה בתרגילים שונים. לכל דיון על אסטרטגיה נכונה או שגوية חשוב לכרף סכמה מוחשית (רצוי של מלבן) כדי להבהיר את המכפלות החלקיות השונות. מומלץ לבדוק אצל תלמידים שאיתרו אצלם שגיאות הקשורות לבנייה העשוריית לבנייה הבסיסית של המבנה העשורי ואת היכולת שלהם לפתרו תרגילי חיבור וחיסור שיש בהם המרווח. ביסוד המבנה העשורי חיוני יכולת לפתרו בעזרת האלגוריתם המסורתית של הכפל. ניתן לעקוּף זמני קושי זה על-ידי הוראה של האלגוריתם שאיננו מוקוצר לכפל, על-ידי פתרו הcoil שימוש בסכימות של המלבן או בעזרת כל דרך אחרת שבה התלמידים מחשבים את ארבע המכפלות החלקיות ומוחברים אותן בדרך שאינה מוקצתת.

שאלה 11**השלימו את המספר החסר.**

63 : _____ = 21

תשובה :

63 : 3 = 21

ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות שלמים – משוואות כפל וחילוק
השאלה בודקת **פתרון משווהת חילוק** שבה המחלק והמנה הם מספרים דו-ספרתיים.

רמת חשיבה צפוייה: חשיבה אלגוריתמית**רמת קושי צפוייה:** יתפרנס בהמשך**משמעות בתכנית הלימודים****ביתה ב':** עמוד 43 – הכפל וחילוק כפעולות הפוכות**ביתה ג':** עמוד 60 – פתרת משוואות כפל וחילוק**ביתה ה':** עמוד 106 – חילוק במספר דו-ספרתי**הידע הדרוש לפתרון השאלה****כיתות א'-ב':** הבנת משמעותיות שונות של הכפל ושל החילוק (כולל הקשר שבין הפעולות), הכרת משוואות**כיתות ג'-ד':** עובדות הכפל והחילוק בתחום - 100, כפל במספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי; פתרון משוואות כפל וחילוק**ביתה ה':** חילוק במספר דו-ספרתי**סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה**

א. שיווק משמעויות חילוק לתרגיל: חילוק לחולקים – לכמה קבוצות צריך לחלק את 63 אם בכלל קבוצה יש 21?

ב. הסתמכות על הבנת הקשרים שבין המספרים המשוואת (אפשרות להיעזר באנלוגיה לתרגיל דומה במספרים קטנים יותר): ביצוע התרגילים 21 : 63 כדי למצוא את הנעלם המשווה.

דוגמאות לשגיאות או לטעויות העשויות להופיע

הנחה שגויה שבכל משווהת חילוק, כדי למצוא את הנעלם יש לבצע פעולה כפל, וכותזאה מכך ביצוע התרגיל:

63 × 21. במקרה זה עשויה להתקבל התשובה :

63 : 21 = 1,323

תשובה כזו מותאמת רק במקרה שלא נעשתה בקרה אומדןית על התוצאה.

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

מומלץ להנחות את התלמידים המתקשים בתרגיל כזה לסתת משמעות "סיפוריית" לתרגיל: למשל, "לכמה קבוצות צריך לחלק את 63 כדי שבכל קבוצה יהיה 21 חפצים?" אסטרטגיה זו עשויה לסייע למציאת הפתרון, גם אם הוא יימצא על-ידי חיבור חוזר של 21.

שאלה 12**השלימו את המספר החסר.**

$150 - 5 \times \underline{\quad} = 0$

תשובה :

$150 - 5 \times 30 = 0$

ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגوية

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשלמים – סדר פעולות החשבון, כפל בעשרות שלמות וחוקי ה- 0 וה- 1. השאלה בודקת **פתרון משווה** שהיא ביטוי שווה ל- 0, והוא כולל שתי פעולות: כפל וחיסור.

רמת חשיבה צפופה: חסיבה תהליכיית (תובנה חשבונית)

רמת קושי צפופה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים**ביתה ג':** עמודים 60, 61 – תכונות ה- 0 וה- 1, כפל בעשרות שלמות; עמוד 64 – סדר הפעולות והשימוש בסוגרים**ביתה ד':** עמוד 87 – סדר הפעולות, תכונות ה- 0 וה- 1**הידע נדרש לפתרון השאלה**

ביתות ב'-ג': ממשמעות הכפל והחילוק, פתרון משווהות כפל וחילוק, עבודות כפל וחילוק בתחום ה- 100, סדר פעולות החשבון, כפל בעשרות שלמות

ביתה ד': סדר פעולות החשבון**אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה**

פתרון המשווה מושפע על ראייה גלובלית של כל השוויון, פירוקו והשלמת המספר החסר.

שלב א': הבנה שכדי לשמור על השוויון (לקבל 0 בתוצאה התרגילים) יש לחסר 150 מ- 150.

שלב ב': עבודה על-פי חוקי סדר הפעולות וחישוב המספר החסר במשווהה: $150 - \underline{\quad} = 5$. מציאת המספר החסר יכולה להיות מבוססת על ידיעת עובדת הכפל ($150 = 30 \times 5$) או על ביצוע תרגיל החילוק: $150 : 5$.**דוגמאות לשגיאות או לקשירים העשויים להופיע**

א. טעות הנובעת מאי-שמירה על חוקי סדר פעולות החשבון. במקרה זה עשויה להופיע התשובה השגויה הזאת: $0 = 150 - 5$ (מתוך הנחה שהשלב הראשון בוצע החישור: $5 - 150 = 145$, ולאחר מכן מהפרש הוכפל ב- 0 כדי לקבל 0). אותה טעות יכולה להתකבל גם כתוצאה מכטיבה אוטומטית של 0 הנשענת על הידיעה שכדי לקבל מכפלת שהוא 0 יש לכפול ב- 0.

ב. טעות הנובעת מחוסר שליטה בכפל בעשרות. במקרה זה עשויה להתקבל התשובה הזאת: $0 = 150 - 5 \times 3$.

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

لتלמידים שלא שמרו על חוקי סדר פעולות החשבון או שנמנעו מלהפזר את המשווהה. ייתכן שתלמידים אלה מתקשים לראות ראייה גלובלית את התבנית השלמה, או שאינם מודעים לכך שיש להביע בכל התבנית. ייתכן שתלמידים אלה סבורים שככל תרגיל בחשבון יש לפתור משמאלי למין, ובמקרה הזה הם אינם יודעים מה לעשות. עם תלמידים אלה מומלץ לעבוד על משימות שונות הדורשות ראייה גלובלית ומכילות יותר פעולה אחת (משווהה שיש בה רק פעולה אחת ניתן לפתור על-ידי ביצוע הפעולה ההופוכה, ללא צורך בראייה גלובלית ובפירוק של המשווהה). לפיתוח מיומנויות אלה יש חשיבות רבה בלימודי האלגברה.

שאלה 13
הגורמים הראשוניים של 42 הם:
תשובה: 7,3,2
<p>ניקוד: 2 נק' – תשובה נכונה: רק שלושה גורמים ראשוניים, ושלושתם נכונים 1 נק' – תשובה חלקלית: רק שני גורמים ראשוניים, ושניהם נכונים 0 נק' – רק גורם ראשוני אחד נכון או תשובה שגויה.</p> <p>הערה: תשובה הכלולת גורמים ראשוניים נכוןים וגם גורמים שגויים, תיחסב תשובה שגויה.</p>
剖析 השאלה
<p>נושא: מספרים ופעולות בשלמים – מספרים ראשוניים ופריקים. השאלה בודקת יכולת שימוש באלגוריתם כלשהו לפירוק מספר לגורמים ויזיהו גורמים ראשוניים מ בין הגורמים של המספר.</p> <p>רמת חשיבות צפופה: חשיבה אלגוריתמית רמת קושי צפופה: יתרפרנסים בהמשך</p>
מופיע בתכנית הלימודים
ביתה ד': עמוד 88 – מספרים ראשוניים ופריקים
הידע נדרש לפתורון השאלה
<p>ביתות א'-ב': הבנת משמעות הכפל וחילוק ביתה ג': כפל וחילוק בתחום לוח הכפל, ייצוג מספר כמכפלה של שני גורמים ביתה ד': הכרת המספרים הראשוניים, ייצוג מספר כמכפלה של מספר גורמים, אלגוריתם לפירוק מספר לגורמים ראשוניים</p>
אסטרטגיות צפויות לפתורון השאלה
<p>פירוק לגורמים של המספר 42 באמצעות מהדרcis האלה :</p> <p>א. עבודה על-פי השלבים הבאים :</p> <ul style="list-style-type: none"> • זיהוי המספר 42 כמכפלה של 6 ו- 7 . • זיהוי המספר 7 בראשוני והמספר 6 כפריך. • ייצוג המספר 6 כמכפלה של 2 ו- 3 . <p>ב. עבודה על-פי השלבים הבאים :</p> <ul style="list-style-type: none"> • זיהוי המספר 42 כזוגי וחולקו ב- 2 . מתקבלת התוצאה 21 . • זיהוי המספר 21 כמכפלה של 3 ו- 7 . <p>ג. עבודה על-פי השלבים הבאים :</p> <ul style="list-style-type: none"> • זיהוי המספר 42 ככפולה של 3 וחולקו ב- 3 . מתקבלת התוצאה 14 . • זיהוי המספר 14 כמכפלה של 2 ו- 7 .
דוגמאות לשגיאות או לקשיים העשויים להופיע
<p>קשיים להבדיל בין המושגים "גורם" ל"גורם ראשוני". כתוצאה לכך עשויות להתקבל התשובות: 6 ו- 7 או 2 ו- 21 .</p>

שאלה 14

בוחנות לנעלים ספורט יש 7 מדפים.

על כל מדף אפשר להניח לא יותר מ- 21 קופסאות נעלים.

על המדפים יש בסך הכל 130 קופסאות נעלים.

כמה קופסאות נוספות אפשר להניח על המדפים?

תשובה: _____ קופסאות

תשובה:

17 קופסאות

ניקוד: 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגوية

אפיון השאלה

נושא: מספרים ופעולות שלמים – ארבע פעולות במספרים שלמים
ה שאלה בזאת פתרון בעיה מילולית דו-שלבית שנדרש בה כפל של מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי ולאחר מכן חישור מספר תלת-ספרתי במספר תלת-ספרתי. בפתרון השאלה יש צורך בהבנת המשפט "לא יותר מ...".

רמת חשיבות צפוייה: חשיבה תהליכיית (יישום)

רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

כיתה ד': עמוד 86 – שאלות דו-שלביות

הידע הדרוש לפתרון השאלה

כיתות א'-ב': חיבור וחיסור עד 100, הכרת מספרים דו-ספרתיים ומספרים תלת-ספרתיים, הבנת משמעות פעולות החיבור, החיסור, הכפל והחילוק; בעיות חד-שלביות ב- 4 הפעולות

כיתות ג'-ד': חישור בתחום המאות, כפל וחילוק בתחום לוח הכפל, כפל מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי, בעיות מילוליות דו-שלביות

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. שלב א': חישוב המספר המרבי של קופסאות שנitin להניה על כל המדףים : $21 \times 7 = 147$.

להלן דוגמה לחישוב המבוסס על ציור סכמטי של הסיטואציה (מספר על כל מדף) וחיבור. ייתכן שהתלמיד חיבר ולא כפל בשל הנוחיות לחבר את המספרים הנתונים.

בחנות לנעלי ספורט יש 7 מדפים.

על כל מדף אפשר להניח 21 קופסאות נעלים.

אם על המדףים יש 120 קופסאות נעלים,

כמה קופסאות נוספות אפשר להניח על המדףים?

תשובה:  קופסאות

שלב ב': חיסור מספר הקופסאות המונחות על כל המדףים מסpter הקופסאות שאפשר להניח על כל המדףים : $147 - 130 = 17$.

את שני השלבים אפשר גם לבטא בתרגיל אחד : $147 - 21 \times 7$.

ב. באמצעות שימוש באומדן, שימוש בנקודת אחיזה וניסוי וטעייה מבוקרים :

אם היו 140 קופסאות, היה אפשר לסדר 20 קופסאות על כל מדף (בהתבסס על ידיעת עובדת הכפל : $140 = 20 \times 7$). לאחר מכן אפשר להוציא עוד קופסה אחת לכל מדף (על-פי הנתונים אפשר להניח 21 קופסאות על כל מדף). כמובן, בסך הכל להוציא 10 קופסאות, שכן ההפרש בין 140 ל- 130 (הkopasot שכך מונחות), ועוד 7 קופסאות.

דוגמאות לשגיאות או לקשיים העשויים להופיע

א. קושי בהבנת המבנה הלוגי הדו-שלבי של השאלה. במקרה זה עשויה להתקבל תשובות כגון :

1. $147 = 21 \times 7$ אצל תלמידים שביצעו רק שלב א' של השאלה.

2. $130 - 21 = 109$ אצל תלמידים שהסיקו מבנה חיבורו (גם בשל המונח "בסק הכל").

ב. היאחזות במספריים בשאלת ביליאק או להבין את הסיטואציה. במקרה זה יש להניח שהתלמידים יחלקו את 21 ב- 7 (בגלל הקשר הכפלי, המוכר לתלמידים, בין המספריים). כתוצאה לכך יש לתשובה שתבטיח קשר חיבורו ככלו בין המספריים 130 ו- 3, למשל : 127 או 133.

ג. קושי בהבנה שבמשפט "כמה קופסאות נוספות..." למשה מボטא הפרש, וכך יש לבצע פעולה חיסור. יש להניח שקיים זה והיאחזות במילול "נוספות" כמילה המרמזת על פעולה חיבור, עשויים לגרור ביצוע פעולה חיבור של מספריים מבין המספריים הנתונים או של מספריים שהתקבלו כתוצאות ביניים.

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

- א. לתלמידים המשמשים באסטרטגיות שונות של סימון מילים מרמזות או מסתפים, ואינם קוראים או מבינים את הסיטואציה הכללית. בשאלת זו יש מספר רב של "מוקשים" בדמות מילים כגון: "בסק' הכלול" או "נוספות" שאינן מכוננות בהכרח לפעלת חיבור. כמו כן, בין המספרים 7 ו- 21 אין צורך לבצע פעולה חילוק ואין שימוש בקשר הכפלי ביניהם. מומלץ שלא להנחות תלמידים לשימוש באסטרטגיות של "מילים מרמזות", אלא לכוון אותם לкриיאת השאלה במלואה, לניתוח הסיטואציה ולהבנהה.
- ב. חשוב לשים לב גם לתלמידים המתקשים בהבנת המבנה הלוגי של שאלה דו-שלבית. מומלץ לבחון את הביצועים שלהם גם בשאלות אחרות ב מבחן שיש בהן יותר משלב אחד. עם תלמידים כאלה יש לעבור על ניתוח שלבי הסיטואציה המוצגת בכל שאלה ועל התאמתו פעולה חשבונית לכל שלב בסיטואציה. על מנת להבהיר את ההתאמה בין כל שלב בסיטואציה לביטוי החשובי המבतא את אותו שלב, מומלץ שלא לבטא את כל התהליכים המוצגים בסיטואציה בתרגיל אחד שיש בו כמה פעולות. עדיף לבטא כל שלב על-ידי ביטוי המתאים לו. ביטוי מרכיב המכיל כמה שלבים וכמה פעולות מקשה על התלמידים, ועשוי לגרום לעתים שימוש שגוי בחוקיסדר פעולות החשבון ופתרון שגוי.

שאלה 15

בדלי היו בסך הכל 88 כלניות, חלקן לבנות וחלקן אדוות.

את כל הכלניות סיידרו ב- 8 זרים שווים.

בכל זר סיידרו 5 כלניות לבנות.

כמה כלניות אדוות יש בכל זר?

תשובה: _____ כלניות אדוות

תשובה:

6 כלניות אדוות

ניקוד: 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות שלמים – ארבע פעולות במספרים שלמים

השאלה בודקת **פתרון בעיה מילולית דו-שלבית** שנitin לפתרו אותה באמצעות חילוק של מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי ולאחר מכן חישור שני מספרים בתחום ה- 10, או באמצעות כפל שני מספרים בתחום לוח הכפל, חישור מספר דו-ספרתי ממספר דו-ספרתי וחילוק בתחום לוח הכפל.

רמת חשיבות צפוייה: חשיבה תהליכיית (יישום)

רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

כיתה ד': עמוד 86 – שאלות דו-שלביות

הידע הדרוש לפתרון השאלה

פתרונות א'-ב': חיבור וחישור עד 100, הבנת שימושות הכפל והחילוק; בעיות חד-שלביות בכפל ובחילוק

פתרונות ג'-ד': כפל וחילוק בתחום לוח הכפל, חילוק מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי, בעיות מילוליות דו-שלביות

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. שלב א': חישוב מספר הכלניות בכל זר – $8 : 8 = 1$

שלב ב': חישוב מספר הכלניות האדוות בכל זר על-ידי חישור מספר הכלניות הלבנות הכולל הכלן בכל זר – $6 - 5 = 1$

לדוגמה:

$$11 - 5 = 6$$

$$88 : 8 = 11$$

ב. שלב א': חישוב מספר הכלניות הלבנות בכל הזרים: $5 \times 8 = 40$

שלב ב': חישוב מספר הכלניות האדוות בכל הזרים על-ידי חישור מספר הכלניות הלבנות מהמספר הכולל של

$$88 - 40 = 48$$

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה (המשך)

שלב נ' : חישוב מספר הצלניות האדומות בכל אחד מהזרים על-ידי חילוק מספר הצלניות האדומות במספר הזרים – $48 : 8 = 6$

לדוגמה :

Calculation: $48 \div 8 = 6$

הערה: יש להניח שתלמידים רבים יבצעו את כל החישובים או את חלוקם בעל-פה.

דוגמאות לשגיאות או לטעויות העשויים להופיע

קושי בהבנת המבנה הלוגי של השאלה וקושי להבין את הקשר בין שני השלבים בשאלה.

במקרה זה עשוות לחתקל התשובות האלה:

1. $8 : 8 = 88$ זיהוי פעולה חילוק זו הוא קל יחסית, אך בשל הסיטואציה המרמזת על חלוקה פיזית של הצלניות והן בשל הקשר

הכפל הבולט שבין המספרים 88 ו- 8.

2. $5 \times 8 = 40$ גם זיהוי פעולה הכפל הוא קל יחסית, בשל העובדה שモצגת סיטואציה של קבוצות שוות.

שאלה 16

חתול וגירפה הקיפו יחד את החצר של גן החיות.

בכל פעם שהג'ירפה צעדה צעד אחד, החתול צעד 10 צדים.

א. כמה צדים צעד החתול כאשר הג'ירפה צעדה 20 צדים?

תשובה: _____ צדים

ב. כדי להקיף את החצר, צעד החתול 600 צדים.

כמה צדים צעד הג'ירפה כדי להקיף את החצר?

תשובה: _____ צדים

תשובות:

א. 200 צדים

ב. 60 צדים

ניקוד:

סעיף א': 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

סעיף ב': 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשלמים – כפל וחילוק במספרים שלמים

בשאלה שני סעיפים: בסעיף א' שאלת הבודקת **בעיה מילולית חד-שלבית** של כפל, ובסעיף ב' שאלת הבודקת **בעיה מילולית חד-שלבית** של חילוק. פתרו השאלה דרשו חשיבה פרופורציונלית ברמה בסיסית (בעיות התאמת).

רמת חשיבה צפוייה: חשיבה תحلיךית (יישום)

רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

ביתה ד': עמוד 86 – שאלות מילוליות של כפל וחילוק

ביתה ה': עמוד 107 – שאלות ארבע הפעולות במספרים טבעיות

הידע נדרש לפתרון השאלה

פיתות א'-ב': הבנת משמעות הכפל והחילוק, בעיות חד-שלביות בחיבור ובכפל

פיתות ג'-ד': עובדות הכפל והחילוק בתחום לוח הכפל, בעיות כפל וחילוק (הרחבה)

ביתה ה': שאלות ארבע הפעולות במספרים טבעיות

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. הבנה שמספר הצעדים שהחтол צועד גדול פי 10 מאשר מספר הצעדים שהגירה צועדת. לכן בסעיף א' יש לכפול את מספר הצעדים של הגירה ב- 10, ובסעיף ב' יש לחלק את מספר הצעדים של החтол ב- 10.

ב. סרטוט או צייר סכמטי המציגים את ההתאמה בין צעד אחד של החтол ל- 10 צעדים של החтол.

דוגמאות לשגיאות או לקשיים העשויים להופיע

א. קושי בהבנה שמדובר במצב כפלי בשל העובדה שהמצב אינו טיפוסי לקבוצות שוות או במספר "פערני", אלא זהו מצב המתאים התאמה.

ב. החלפת הפעולות – ביצוע כפל במקום חילוק וחילוק במקום כפל – מצביעה על קושי בהבנה אינטואיטיבית של יחס ישיר ושל יחס הפוך (חסיבה פרופורציונלית בסיסית).

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

لتלמידים המתקשים לראות את המצבים הבסיסיים של חסיבה פרופורציונלית כמקורה פרטיו של כפל. חשוב להציג לתלמידים אלה סוגיים שונים של בעיות ברמה בסיסית שיש בהן מצבים של יחס ישיר ושל יחס הפוך, ולשוחח אתם על הפתרון ברמה אינטואיטיבית. יחד עם זאת, יש לזכור שהחשיבות הפרופורציונלית מתפתחת בגיל מאוחר יותר ותתופל לעומק בשלבים מאוחרים יותר של הלמידה.

שאלה 17

כופלים מספר דו-ספרתי ב- 12

- א. האם אפשר לקבל את התוצאה 1,200 ?
נמקו את תשובהיכם.
- ב. האם אפשר לקבל את התוצאה 130 ?
נמקו את תשובהיכם.
- ג. האם אפשר לקבל את התוצאה 720 ?
נמקו את תשובהיכם.
- ד. האם אפשר לקבל תוצאה שהיא מספר אי-זוגי?
נמקו את תשובהיכם.

תשובות:

- א. נימוק הכלול התייחסות לכך שאין מספר דו-ספרתי שאם נכפול אותו ב- 12 נקבל 1,200 .
- ב. נימוק הכלול התייחסות לכך ש- 130 אינו כפולה של 12 .
- ג. נימוק הכלול הצגת דרך חישוב שלפיה 720 הוא כפולה של 12 ושל מספר דו-ספרתי.
- ד. נימוק הכלול התייחסות לכך שכפל הכפולות של 12 הן זוגיות או לכך ש- 12 הוא מספר זוגי,
וכל כפולה של מספר זוגי היא זוגית.

ניקוד:

סעיף א': 1 נק' – תשובה נכונה
0 נק' – תשובה שגויה

הערה: התשובה "לא" ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה.

סעיף ב': 1 נק' – תשובה נכונה
0 נק' – תשובה שגויה

הערה: התשובה "לא" ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה.

סעיף ג': 1 נק' – תשובה נכונה
0 נק' – תשובה שגויה

הערה: התשובה "כן" ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה.

סעיף ד': 1 נק' – תשובה נכונה
0 נק' – תשובה שגויה

הערה: התשובה "לא" ללא נימוק תיחשב תשובה שגויה.

אפיון השאלה

מושא: מספרים ופעולות שלמים – כפל וחילוק במספרים שלמים
השאלה בזקמת **יכולת ניתוח והنمקה** של תשובות אפשריות לפעולות כפל. הנitionה מבוסס על פעולות הכפל והחילוק של מספרים דו-ספרתיים, אומדן גודל תוצאות, הכרת כפולות בעשרות ובמאות שלמות, הכרת כפولات של מספר או הבנה ויישום הקשר שבין כפל לחילוק והכרת תכונת הזוגיות של מכפלות.

רמת חשיבות צפוייה: חיפוש פתוח

רמת קושי צפוייה: يتפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

כיתה ה': עמודים 105, 106 – כפל: חזרה, הרחבה והעמקה, חילוק במספר דו-ספרתי, אומדן תוצאות של פעולות, אומדן כמותיות, פיתוח תחשוה למספרים גדולים

הידע נדרש לפתרון השאלה

כיתה א'-ב': הבנת משמעות הכפל והחילוק והכרת העשרות והמאות השלומות, הכרת תכונת הזוגיות של מספרים; הכרת המונחים: מספר חד-ספרתי, דו-ספרתי, תלת-ספרתי

כיתה ג': עבודות הכפל והחילוק בתחום לוח חילוק, כפל בעשרות ובמאות שלמות; בעיות כפל וחילוק (הרחבה)

כיתה ד': כפל במספרים דו-ספרתיים במספרים דו-ספרתיים ותלת-ספרתיים, הכרת תכונת הזוגיות של מכפלות, חילוק בעשרות שלמות

כיתה ה': חקירה וניתוח של מכפלות, אומדן מכפלות, חילוק במספר דו-ספרתי

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

סעיף ב'

א. הכרת עובדת הכפל ב- 100 : $100 \times 12 = 1200$ והוא מספר תלת-ספרתי גדול מכל מספר דו-ספרתי. לכן לא ניתן לכפול את 12 במספר דו-ספרתי ולקבל את התוצאה 1200.

לדוגמה:

$$15 \times 12 = 180$$

$$25 \times 12 = 300$$

ב. ביצוע פעולות החילוק : $1200 : 12 = 100$ והבנה שההתוצאה שהתקבלה – 100 – היא מספר תלת-ספרתי ולא מספר דו-ספרתי, כפי שמתבקש בנתוני השאלה.

לדוגמה:

$$100 \div 12 = 1200 : 12 = 100$$

$$12 \div 100 = 1200 : 12 = 100$$

ג. היישנות על העבודה שהמספר 99 הוא המספר הדו-ספרתי הגדול ביותר, ומהכלה של 12 ו- 99 איננה 1,200.

לדוגמה:

$$100 \div 12 = 1200 : 12 = 100$$

$$1188 \div 12 = 1200 : 12 = 100$$

סעיף ג'

א. הכרת עובדת הכפל: $120 = 10 \times 12$ והבנה שכדי לקבל 130 יש להוסיף ל-120 רק 10 ולא 12, ולכן לא תתקבל מכפלה של 12.

לדוגמה:

$\begin{array}{r} 12 \\ \times 10 \\ \hline 120 \end{array}$
האוסף 10 ל-120 מקבלים 130

ב. הישענות על הכרת עובדת הכפל: 10×12 ובדיקה כפולה אחת גדולה יותר: 12×11 .

$\begin{array}{r} 12 \\ \times 11 \\ \hline 120 \\ +12 \quad \leftarrow \\ \hline 132 \end{array}$
אם יתכן שאחד התלמידים קיבל את התוצאה 130?
נמכו את תשובהיכם.

ג. ביצוע פעולות החילוק: ($10 : 12 = 130$) $130 : 12 =$ כתוצאה לכך הבנה ש- 130 אינו כפולה של 12.
דיבעה ש- 100 הוא מספר תלת-ספרתי גדול מכל מספר דו-ספרתי. לכן לא ניתן לכפול את 12 במספר דו-ספרתי ולקבל את התוצאה 1,200.

סעיף ד'

א. ביצוע פעולות החילוק: $60 : 12 = 720$ בדרכים שונות (חילוק ארוך, חיסור חוזר, פילוג על-ידי ביטוי המוחול לסכום המתחלקים).

ב- (12).

לדוגמה:

$\begin{array}{r} 60 \\ \overline{)720} \\ 72 \\ \hline 0 \end{array}$
אם יתכן שאחד התלמידים קיבל את התוצאה 720?
נמכו את תשובהיכם.

ב. פתרון המשווה: $12 \times 60 = 720$
לדוגמה:

$$\begin{array}{r} 12 \times \underline{60} = 720 \\ \hline 12 \times 50 = 600 \quad 120 \\ \hline (12 \times 50) + (10 \times 12) = 720 \end{array}$$

במקרה זה אין דרישה להציג דרך החישוב, והnymok יכול לכלול רק את התשובה המספרית. לדוגמה:

$$12 \times 60 = 720$$

הערה: גם תלמידים שמכירים את $12 \times 60 = 720$ ומסיקים מכך שהוא גם כפולה של 12, צריכים להראות שהגורם השני במכפלה הוא דו-ספרתי.

סעיף ד'

דיעה שכאשר כופלים מספר זוגי בכל מספר מתקבלת תוצאה זוגית. לאחר ש- 12 הוא מספר זוגי, אי אפשר לקבל מכפלה שהיא אי-זוגית.

דוגמאות לשגיאות או לטעויות העשויים להופיע

א. ניסוח השאלה מבוסס על הבנת הכללה ודורש יכולת פירוק מוצבים מוכללים. בשאלת לא מוצגות דוגמאות מספריות והתלמידים צריכים להציג בעצם דוגמאות מספריות, או לחלופין, לדעת מהי הכללה. לכן עשויים להטעור קשיים בהבנת המצב המתמטי שהשאלה מציגת.

ב. קשיי בניסוח הנימוקים. במקרים אלה עשויים להיכתב נימוקים שאינם מלאים, ניסוחים לא ברורים, או נימוקים שאינם מתמטיים, כלומר-Calculating كالה שאינו מבוסס על עובדות חשבנו או על תוכנות המספריים.

לדוגמה:

סעיף ג':

nymok לא ברור:

Calculating 12 \times 60 = 720

130

הערה: nymok יכול להיות מדויק גם אם הוא כתוב בשפה אינטואיטיבית, ללא שימוש מדויק במינוחים מתמטיים מקובלים. יחד עם זאת, על המורה לבחין בין המקרים שביהם רעיון מתמטי מסוים בworthy, לבין המקרים שבהם המורה עשויה "השלמות" של מה שכתב התלמיד, כי נדמה לו שהוא מבין למה התלמיד הוכח. הדוגמה שליל מייצגת מקרה שבו המורה עשויה לפרש בעצמו למה הוכח התלמיד במשפט "מרכיב את 130", כאשר קיימת סבירות גבוהה שלא זו כוונת התלמיד.

נימוק שאיננו מתמטי:

12 ק-ט' 130 כויה ועתונאה דוחה.

סעיף ד'

נימוק לא מלא: העובדה ש-12 הוא מספר זוגי איננה מספקת. יש לצריך שככל כפולה של מספר זוגי היא זוגית.

215-200 x 75-120 mm, 18

ג. עשוי להטעורר קושי בהבנת המבנה הכללי של השאלה : תלמידים שלא יבינו שהמשפט הראשון ב שאלה מתיחס לכל ארבעת הסעיפים של השאלה.

ד. קושי לחשב חילוק מספר תלת-ספרתי במספר דו-ספרתי בסעיף ג'.

שאלה 18

בחנות של יעקב מחיר 7 עפרונות הוא 6 ש"ח.

בחנות של יואל מחיר 5 עפרונות הוא 3 ש"ח.

באיזה חנות זול יותר לנקות 70 עפרונות?

בחנות של יואל 1

בחנות של יעקב 2

הסבירו כיצד הגיעם לתשובה.

תשובה :

(1) **בחנות של יואל**

הסבירו אפשריים :

1. הצגת מחיר עיפרון אחד בשתי החניות והשוואת מחיריהם

2. הצגת מחיר כמהות שווה של עפרונות (הגדרה מ-1) בשתי החניות, גם ללא השוואת מחיריהם

3. הצגת כמהות העפרונות שאפשר לנקות בכל אחת מהחניות באותו הסכום

ניקוד : 2 נק' – הסביר נכון (גם אם לא סומנה תשובה או אם סומנה תשובה שגויה)

0 נק' – תשובה ללא הסבר או תשובה הכוללת הסבר שגוי (גם אם סומנה תשובה נכונה)

אפיון השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשלמים – שאלות כוללות אינטגרטיביות

השאלה בודקת **יכולת ניתוח והنمקה** של מוצבי כפל ויחס ישר.

רמת חשיבות צפואה: חיפוש פתרות

רמת קושי צפואה: יתרנסס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

ביתה ה': عمودים 106, 107 – כפל: חזקה, הרחבה והעמקה, חילוק במספר דו-ספרתי, אומדן תוצאות של פעולות, אומדן כמהות, פיתוח תחושה למספרים גדולים, שאלות כוללות אינטגרטיביות

הידע הדרוש לפתרון השאלה

ביתה א'-ב': הבנת משמעות הכפל והחילוק

ביתה ג': עובדות הכפל והחילוק בתחום לוח הכפל, הבנת הקשרים שבין כפל לחילוק, הבנת משמעות הכפל בהקשר ליחס ישר (שאלות התאמת)

ביתה ד': שאלות כוללות אינטגרטיביות המשלבות הבנה עמוקה של הפעולות

ביתה ה': חקירה וניתוח של מוצבים שונים, חקירת מכפלות, בעיות אינטגרטיביות וחקירת מוצבי כדאות שונים

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. חישוב המחיר של 70 עפרונות בכל אחת מהחניות:

בchnerות של יעקב – $60 = 10 \times 6$ מבוסס על ההבנה ש- 70 גדול פי 10 מ- 7.

בחנות של יואל – $3 \times 14 = 42$ מבוסס על ההבנה ש- 70 גדול פי 14 מ- 5, או על ביצוע תרגיל החילוק : $70 : 5 = 14$

להלן דוגמאות לתשובות תלמידים:

בוננות של יעקב מחיר / עפרונות הוא 6 ש"ח.

בחנות של ניר מחיר 5 עפראוניות הוא 3 ש"ח.

באייזו חנות זול יותר לknoot 70 אפרונוגות?

הציגו את דרך החישוב.

תשובה:

$$\begin{array}{l} \text{Prob. Not } 70-8 \text{ girls} \\ 70 : 7 = 10 \times 6 = 60 \\ \text{Prob. Not } 70-8 \text{ girls} \\ 70 : 5 = 14 \times 3 = 42 \end{array}$$

תשובה: ה'גנ'ג'ג'ג'

המשך:

בתשובה השנייה כתבה בביבטום החשבונאים שגיה ואינה שומרת על שוויון. חשוב להפנות את תשומת לב התלמידים לכך, אף על פי שבבדיקה המבחן נקבע שלא מורידים על כך נקודות (מאחר שמטרת השאלה היא בדיקת ההסבר בדרך החישוב, ולא בדיקת היכולת לכתוב ביטויים מתמטיים מסוימים).

ב. חישוב המחיר של כל עיפרון בכל אחת מהחנויות:

$$\text{בחנות של יעקב} - \frac{6}{7}$$

$$\text{בחנות של יואל} - \frac{3}{5}$$

יש להניח שבמקרה זה ישוו בין שני השברים ולא יהפכו את השברים לחלקם המבוטאים באגורות. זאת לאחר שאות השבר המבטא את המחיר בחנות של יעקב לא ניתן להפוך לאגורות. השוואת השברים יכולה להיעשות בדרכים שונות, ביניהן השוואת שאלות:

ל-. $\frac{6}{7}$ יש להוסיף מעט מאוד (רק $\frac{1}{7}$) כדי להגיע לשאלות. ואילו ל-. $\frac{3}{5}$ יש להוסיף כמעט חצי ($\frac{2}{5}$) כדי להגיע לשאלות.

לכן, $\frac{6}{7}$ גדול מ- $\frac{3}{5}$ ובחנות של יואל זול יותר.

ג. לאחר שידוע המחיר של 7 עפרונות בחנות אחת ושל 5 עפרונות בחנות אחרת, אפשר לחשב כמה יعلו 35 עפרונות בכל אחת מהחנויות:

$$\text{בחנות של יעקב} - 6 \times 5 = 30$$

$$\text{בחנות של יואל} - 3 \times 7 = 21$$

מנתו זה אפשר להסיק שמחיר 70 עפרונות זול יותר בחנות של יואל, או שאפשר גם לכפול את הסכומים שהתקבלו ב- 2 (כי 70 גדול פי 2 מ- 35) כדי להגיע למסקנה זו.

דוגמאות לשגיאות או לקשיים העשויים להופיע

א. קושי בהבנת המצב הכללי הנדרש לצורך חישוב המחיר של 70 או 35 עפרונות. קושי זה נובע מכך שהתלמידים רגילים למצביים שבהם נתון להם המחיר של פריט אחד ולא של קבוצת פריטים.

ב. עלול להטעור קושי אצל תלמידים שיבחרו באסטרטגיה של חישוב המחיר של עיפרון אחד בכל אחת משתי החנויות. במקרה זה יש צורך לבצע פעולה חילוק, והקושי הוא שהמספר המבטא את המחיר של קבוצת הפריטים אינו מתחלך במספר הפריטים.

ג. קושי במציאת מספר הקבוצות שצריך לחשב במקרה של יואל (בחנות של יעקב המחיר ברור יותר בשל הקשר המספרוני הבולט בין 7 ל- 70).

ד. קושי בהבנה שניתן לבטא את המחיר של כל עיפרון באמצעות שבר (הבנה של משמעות השבר כמנת שני שלמים).

ה. תלמידים שיבחרו לחשב את המחיר של כל עיפרון וירצזו לבטא את המחיר בשקלים ובאגורות, ייתקלו בקושי לבטא באגורות $\frac{6}{7}$ שקל.

ו. קושי להסביר (במילים או בתרגילים) את דרך הפתרון.

שאלה 19

בבנייה גרות ארבע משפחות:

למשפחה כהן 4 ילדים,

למשפחה שקד 4 ילדים,

למשפחה פז 3 ילדים,

למשפחה ברק ילד אחד.

כמה ילדים בממוצע יש למשפחה בבנייה זהה?

תשובה: במבנה הזה _____ ילדים בממוצע למשפחה.

תשובה :

במבנה הזה 3 ילדים בממוצע למשפחה.

ניקוד : 2 נקי – תשובה נכונה

0 נקי – תשובה שגויה

apiroon ha-shala

נושא: חקר נתונים, ממוצע (במבחן כניסה של קטגוריה של מספרים ופעולות בשלמים) – חישוב ממוצע שאלה מילilitית הבודקת **חישוב ממוצע**.

רמת חשיבות צפוייה: יישום

רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

mo'pi'ut ba-tacniyah ha-limodim

כיתה ה': עמוד 109 – חישוב ממוצע

ha-yad u derush la-paturon ha-shala

כיתה א'-ב': חיבור והבנת משמעותות החילוק

כיתה ג': עובדות הכפל והחילוק בתחום לוח הכפל

כיתה ה': חישוב ממוצע

astrotzgiyot zpoyot la-paturon ha-shala

א. חיבור מספר הילדים בכל המשפחות וחילוק הסכום ב- 4 .

ב. "העברה" של ילדים משפחה למשפחה כך שיחיה מספר שווה של ילדים בכל אחת מהמשפחות.

חלק ג': גאומטריה ומדידות

שאלה 20

משקל אפרוח הוא 40 גרם.

משקל תרנגולת הוא 4 ק"ג.

ב) כמה משקל התרנגולת גדול ממשקל האפרוח?

תשובה: _____

תשובה:

פי 100

ניקוד: 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: גאומטריה ומדידות – מדידות משקל

שאלה מילולית חד-שלבית הבודקת את הקשר בין גרם לkilogram. לפתרון הבעיה נדרש הבנת המושג "פי".

רמת חשיבות צפופה: יישום ותובנה חשבונית

רמת קושי צפופה: يتפרנס בהמשך

מופיע בתוכנית הלימודים

כיתה ד': עמוד 86 – שאלות אינטגרטיביות הקשורות במידות של אורך ומשקל

כיתה ה': עמוד 107 – שאלות אינטגרטיביות

הידע הדורש לפתרון השאלה

כיתות א'-ב': הכרת מספרים דו-ספרתיים, מבנה המספר והבנת מעניות הכפל והחילוק, מדידות משקל

כיתה ג': מבנה עשרוני של מספרים בתחום הריבבה, הגדלה והקטנה פי 10 ופי 100, עבודות הכפל והחילוק בתחום לוח הכפל, בעיות השוואה כפליות, מדידות משקל, הכרת היחידות "גרם" ו"קילוגרם"

כיתה ד'-ה': שאלות אינטגרטיביות

סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

בשלב הראשון יש להמיר את הק"ג ב- 1,000 גרם. לאחר מכן קיימות כמה אפשרויות להשוואה. לדוגמה:

א. בדיקה – כמה פעמיים 40 מוכל ב- 4,000 באמצעות חילוק, חיבור חוזר או הבנת מעניות האפסים במספר.

ב. חילוק 4,000 ב- 40 – על בסיס ההבנה שמדובר בשאלת השוואה כפלית, ובשאלה כזו משתמשים בכפל ובחילוק.

ג. הבנה או חישוב כמה עשרות יש ב- 1,000, והבנה שאותו יחס מתקיים בין 40 ל- 4,000 .


דוגמאות לשגיאות או לטעויות העשויות להופיע

א. קושי הנובע מהמרה שגויה של ק"ג בגרם. הטעות הנפוצה היא המרת ק"ג אחד ב- 100 גרם. במקרה זהعشוויה להופיע התשובה "פי 10".


ב. התשובה "פי 10" יכולה להופיע גם כתוצאה מהבנה שמדובר בשאלת השוואה כפלית, אבל משווים בין המספרים 4 ו- 40 . כל זאת בלי להתייחס ליחידות ולעובדה שהתרנגולת כבדה מהאפרוח.

שאלה 21

סמן את המרובע שאחד האלכסונים שלו מחלק אותו לשני משולשים שווה-שוקיים.



תשובה:



ניקוד: 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

הפניון השאלה

נושא: גאומטריה ומדידות – תכונות מרובעים, מינון משולשים
השאלה בודקת את **יישום תכונות האלכסונים** בדلتון ויזיהו משולש שווה-שוקיים. לצורך פתרון השאלה יש להכיר את המושג "אלכסון".

רמת חשיבות צפופה: חסיבה תحلילית (יישום ותובנה)

רמת קושי צפופה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתוכנית הלימודים

ביתה ג': עמוד 70 – מינון משולשים

ביתה ד': עמודים 90, 91 – תכונות משולשים ומרובעים

ביתה ה': עמוד 112 – ניתוח תכונות מרובעים

הידע הדרוש לפתרון השאלה

ביתות א'-ב': הכרת מצלעלים שונים (לרבוט מרובעים שונים ומשולשים שונים), מדידות אורך

ביתה ג': מרובעים – הכרת הריבוע, חקירת תכונות הריבוע, מדידות אורך והיקף, משולשים – זיהוי ומינון על-פי צלעות

ביתה ד': תכונות משולשים ומרובעים, אלכסון במלצלעלים

ביתה ה': מרובעים – ניתוח וחקירת תכונות מרובעים

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

- א. סרטיות האלכסוניים בכל מרובע וחיפוש משולש שווה-שוקיים.
- ב. זיהוי הדלתון והישענות על הגדרת הדלתון כמרובע הבנוי משני משולשים שווי-שוקיים.
- ג. חיפוש בין המרובעים מרובע שיש לו שתי צלעות סמכות שוות לאורכו היכולות להיות השוקיים של משולש שווה-שוקיים.

דוגמאות לשגיאות או קשיים העשויים להופיע

קשיי הנובע מאי-הכרת האלכסון או מאי-יכולת לזהות או לדמות אלכסון במצולע. במקרה זה יש להניח שהתלמידים ייחסו למושג "אלכסון" את הקווים המשופעים בסרטוטי המקבילית, הטרפז והדلتון, ויתקשו להמשיך בפתרון השאלה. לאחר שבסרטוטו הנתון האלכסון הקצר בדלתון איננו קו "משופע", עשוי להתעורר קשיי מיוחד בזיהוי שלו כאלכסון.

שאלה 22

לפניכם מקבילית.

סרטוטו מלבן ששטחו שווה לשטח המקבילית.



תשובה :



סרטוט מלבן ששטחו 8 משבצות כאליה:

ניקוד : 1 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: גאומטריה ומדידות – שטחים של מרובעים
השאלה בודקת יכולת מניהה של יחידת שטח וסרטוט מצולע חדש בעל אותו מספר יחידות שטח.

רמת חישבה צפוייה: חישיבה תحلיךית (יישום ותובנה)

רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

ביתה ה': עמוד 114 – מדידות שטחים

הידע הדורש לפתרון השאלה

ביתה א'-ב': הכרת מצולעים שונים (לרבות מרובעים שונים), מדידות שטח, חישוב שטח מלבן


ביתה ג': מרובעים

ביתה ד': מדידות שטח

ביתה ה': מרובעים, מדידות שטח

סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. פירוק והרכבה של שטח המקבילית: הזזה של ה"משולש" ששטחו 2 משבצות כך שיוצג למשולש השני הזזה לו.



אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה (המשך)

ב. חישוב שטח המקבילית על-ידי מנית מספר יחידות השטח הריבועיות (וחישוב שני מושלמים כיחידה אחת), ולאחר מכן סרוטוט מלבן שטחו שווה לשטח זה. במקרה זה יתכנו שני מלבנים שונים (שאורכי צלעותיהם מספרים שלמים). מידות האחד : 8×1 יחידות ריבועיות נתונות, ומידות האחר : 4×2 יחידות ריבועיות נתונות. אפשר ליצור עוד אין-סוף מלבנים מתאימים שאורכי צלעותיהם אינם מספרים שלמים.

ג. חישוב שטח המקבילית בעזרת הנוסחה, והמשך כפי שמתואר באסטרטגיה ב'.

דוגמאות לשגיאות או לקשירות העשויים להופיע

א. מניה של מושלש כיחידה שטח השווה לשטח ריבוע. תלמידים יכולים לטעת טעות זו אם הם משתמשים באסטרטגיה של מניה יחידות השטח במקבילית.

ב. טעויות הנובעת מבלבול בין המושגים "שטח" ו"היקף". יתכנו תשובות שבן התלמידים ימנו את יחידות השטח של המקבילית ויסרטו מלבן שמספר יחידות ההיקף שלו שווה למספר יחידות השטח של המקבילית.
אצל תלמידים שיתייחסו להיקף במקום לשטח, עשויות להופיע טעויות שכיחות במושג ההיקף, כמו מנית האלכסון של ריבוע כיחידה אורך השווה לאורך צלע הריבוע.

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב



א. לתלמידים המבלבלים בין המושגים "שטח" ו"היקף" ולהבהיר להם את משמעותם המושגים. מושגים אלה דומים למושגים שימושיים בהם בחיי היום-יום, כמו "שטח" ו"היקף", וניתן להיעזר באנלוגיות למושגים המוכרים כתומכי זיכרון.

ב. לתלמידים שאינם מכירים את העקרונות המרכזיים במדידת שטח, לדוגמה: מונחים יחידות שאין שות בשטחן (ריבועים ומושלמים) כיחידות שטח. עם תלמידים אלה מומלץ לחזור על עקרונות מדידות השטח.

שאלה 23

לפניכם סרטוט מוקטון של משולש ושל ריבוע.

היקף המשולש שווה להיקף הריבוע.



מה אורך צלע הריבוע?

תשובה: ס"מ

תשובה :

6 ס"מ

ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: גאומטריה ומדידות – היקף מצולעים: מרובעים ומשולשים, תכונות הריבוע

השאלה בודקת את **ידע המשוגג** "היקף", חישוב היקף ומיציאת אורך צלע ריבוע באמצעות **יישום** תכונת אורך הצלעות בריבוע.

רמת חשיבה צפוייה: חישבה תحلילית (יישום ותובנה)

רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתוכנית הלימודים

ביתה ג': עמוד 70 – מדידת היקף של מצולע, מרובעים שונים: תכונות

ביתה ד': עמודים 91, 92 – ריבוע ומלבן, מדידות, נוסחאות היקף מלבן

ביתה ה': עמודים 110–112 – תכונות מרובעים ומשולשים

הידע נדרש לפתרון השאלה

כיתות א'-ב': הכרת מצולעים שונים (לרבבות מרובעים שונים ומשולשים שונים), מדידות אורך והיקף, מושגים – צלע והיקף, הכרת יחידת האורך "סנטימטר"

ביתה ג': מרובעים – הכרת ריבוע, חקירת תכונות הריבוע, מדידות אורך והיקף

ביתה ד': ריבוע ומלבן, חזרה על מדידות אורך

ביתה ה': מרובעים – ניתוח וחקירת תכונות מרובעים

סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

שלב א': חישוב היקף המשולש.


שלב ב': חלוקת היקף ב- 4 על בסיס הידע שכל הצלעות בריבוע שוות באורך.

שאלה 24

גְּזֻרוּ פִּתְקִיתָ נַיֵּר רִיבּוּעִית, וְקִיבְלוּ מַחְוֹמֵשׁ וּמַשׂוֹלֵשׁ.

לִפְנֵיכֶם סְרִטּוֹת שֶׁל המַחְוֹמֵשׁ וּמַשׂוֹלֵשׁ.

6 ס"מ



א. מה שטחו של המחומש?

תשובה: _____ סמ"ר

ב. הסבירו (במילים, בתרגילים או בסרטוט) כיצד חישבתם את שטחו של המחומש.

תשובות:

א. $\frac{1}{2} 31 \text{ סמ"ר}$

ב. הסביר הכלול התייחסות למרכיבים הבאים:

- הצגה (במילים, בתרגיל או בסרטוט) של פירוק המחומש למצולעים שכונים או שהפרש שטחים שווה לשטח המחומש
- חישוב שטחי המצולעים
- הצגת תרגיל המתאר את חישוב השטח הכלול של המחומש

ניקוד:

סעיף א': 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

סעיף ב': 3 נק' – הסביר הכלול את מרכיבי לפחות.

2 נק' – הסביר הכלול את מרכיבים אי' ו-ב' או את מרכיב ב' בלבד, בתנאי שחוושב שטח המשולש.

1 נק' – הסביר הכלול את מרכיב אי' בלבד.


0 נק' – הסביר שגוי

הערה: אם התשובה בסעיף ב' שגויה כתוצאה מגורירת טעות חישוב מסעיף א', ובסעיף ב' נכתב ההסבר בהתאם לטעות זו, יש לתת 3 נקודות על סעיף ב'.

剖析 השאלה
<p>גושא: גאומטריה ומדידות – תכונות אורך הצלעות בריבוע, שטחים של מלבנים, משולשים וצורות מורכבות השאלת בודקת יישום עקרון הפירוק וההרכבה של שטחים לצורך חישוב שטח של צורה מורכבת, חישוב שטח של מושלץ ישר-זווית ושטח של ריבועים. לביצוע החישובים נדרש שימוש שילתי בתכונת אורך הצלעות בריבוע.</p> <p>רמת חשיבות צפופה: חיפוש פתוח</p> <p>רמת קושי צפופה: יתפרנס בהמשך</p>
מופיע בתוכנית הלימודים
<p>ביתה ד': עמודים 91, 92 – תכונות הריבוע, נסחאות שטח מלבן</p> <p>ביתה ה': עמוד 114 – מדידות שטחים, חישובי שטח של מלבנים, ריבועים ומשולשים</p>
הידע הדורש לפתרון השאלה
<p>כיתות א'-ב': הכרת מצולעים שונים, לרבות מצולעים שאינם משוכלים, הכרת המושג "שטח", חישוב שטח של מלבן,משמעות הכפל בחישוב שטח, הכרת תכונות הריבוע, מדידות אורך ויחידות אורך</p> <p>כיתות ג'-ד': עובדות הכפל והחילוק, הכרת מלבן וריבוע ותכונותיהם, יחידות שטח, נסחאות של שטח מלבן, מינן משולשים על-פי צלעות וזווית</p> <p>ביתה ה': ניתוח תכונות מרובעים, שטח משולש</p>
סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה
<p>א. חישוב אורך הניצבים במשולש ישר-זווית על-ידי פועלות החישור : 3 – 6, וחישוב שטח המשולש ישר-זווית הקטן (4.5 סמ"ר).</p> <p>חישוב שטח הריבוע הגדל (36 סמ"ר) וחיסור שטח המשולש משטח הריבוע.</p> <p>ב. חלוקת המושם, חישוב השטח של כל אחד מחלקים, והיבור המספריים המבטאים את השטחים :</p> <ul style="list-style-type: none"> • ל- 3 ריבועים שטח כל אחד מהם הוא 9 סמ"ר ולמשולש ישר-זווית שטחו 4.5 סמ"ר. • למלבן שטחו 18 סמ"ר, לריבוע שטחו 9 סמ"ר ולמשולש ישר-זווית שטחו 4.5 סמ"ר. <p>הערה: את שטחו של המשולש אפשר לחשב בעזרת נוסחת שטח משולש ישר-זווית: מכפלת הניצבים חלק 2 או מחצית משטח הריבוע.</p>
דוגמאות לשגיאות או לטעויות העשויים להופיע
<p>א. קושי לפרק את הצורה המורכבת למרכיבים שיעודים לחשב את שטחים.</p> <p>ב. קושי בחישוב שטח המשולש. שגיאה אופיינית היא שטח המשולש הוא 9 סמ"ר, והוא נובעת מכך שמקפילים את הניצבים אבל לא מחלקים ב- 2.</p> <p>ג. קושי הנובע מההנחה שיש לחשב היקף במקום לחשב שטח. במקרה זה יש להניח שהתלמיד לא ייתקל בקושי במציאת אורך של היתר במשולש ישר-זווית.</p>
בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב
<p>א. לתלמידים המבלבלים בין המושגים "שטח" ו"היקף". יש להבהיר לתלמידים אלה את משמעות המושגים. מושגים אלה דומים למושגים שימושיים בהם בחיי היום-יום, כמו "שטח" ו"היקף", וניתן להשתמש באנalogיות למושגים המוכרים כתומכי זיכרון.</p> <p>ב. לתלמידים המתתקשים לפרק צורה ולהסביר את שטחה של צורה מורכבת על-ידי חישוב סכום או הפרש של שטחים חלקיים שלה. בשלב הראשון יש לתרגל את התלמידים האלה בפירוק ובהרכבה על-ידי גזירה של צורות ושמור השטח בעלי לחשו, ורק בשלב השני להוציא את חישוב השטח.</p>

שאלה 25

לפניכם קובייה שאורך הצלע שלה הוא 3 ס"מ.



- א. מה נפח הקובייה?
תשובה: _____ סמ"ק
- ב. מה שטח פאה אחת של הקובייה?
תשובה: _____ סמ"ר
- ג. מה שטח הפנים של הקובייה?
תשובה: _____ סמ"ר

תשובות:

- א. 27 סמ"ק
ב. 9 סמ"ר
ג. 54 סמ"ר

ניקוד:

- סעיף א': 2 נק' – תשובה נכונה
0 נק' – תשובה שגויה
- סעיף ב': 1 נק' – תשובה נכונה
0 נק' – תשובה שגויה
- סעיף ג': 1 נק' – תשובה נכונה
0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: גאומטריה ומדידות – תיבות

השאלה בודקת את **הברת המושגים**: "נפח תיבת", "שטח פאה" ו"שטח פנים של קובייה", וכן יכולת חישוב של שטח פאה ריבועית, של שטח פנים של קובייה ושל נפח קובייה.

רמת חשיבה צפוייה: אלגוריתמית

רמת קושי צפוייה: יהפרנס בהמשך

<p>מופיע בתוכנית הלימודים</p> <p>ביתה ד': עמודים 91, 92 – מדידות שטח, נפח תיבת ושטח פנים של תיבה</p>
<p>הידע הדרוש לפתרון השאלה</p> <p>ביתה ב': משמעות הכפל, מושג השטח, הכרת המלבן וחישוב שטח המלבן, הכרת תיבות ווגפים תלת-ממדיים</p> <p>ביתה ג': הכרת המושג "נפח" ומדידת נפחים של גופים, משמעות הכפל, עובדות הכפל בתחום לוח הכפל, חישוב שטח מבנים</p> <p>ביתה ד': הכרת התיבות והקוביה, ייחודת מדידת שטח (סמי"ר) ולמדידת נפח (סמי"ק), שטח פנים</p>
<p>סטרטגיית צפויות לפתרון השאלה</p>
<p><u>סעיף א'</u></p> <p>א. שימוש בנוסחה לחישוב נפח: מכפלת שלושת ממדיו הקובייה.</p> <p>ב. חישוב כמה קוביות של 1 סמי"ר יש ב"קומה" הראשונה, וחיבור המספר שלוש פעמים, או מנית מספר הקוביות שיש ב"עמוד" אחד והכפלה במספר העמודים שבכל הקובייה.</p>
<p><u>סעיף ב'</u></p> <p>א. מנית מספר ייחודת השטח.</p> <p>ב. כפל: 3×3.</p> <p>ג. מכפלת השטח של פאה אחת ב- 6.</p>
<p>דוגמאות לשגיאות או לבעיות העשויות להופיע</p>
<p>א. קושי הנובע מאי-הכרת המושגים.</p> <p>ב. קושי בראייה מרחבית.</p>
<p><u>סעיף א'</u></p> <p>קושי לדמות את הקוביות שאינן נראהות. במקרה זה עשויה להתקבל התשובה: 19 סמי"ק – מספר הקוביות הנראות.</p> <p>בשאלה זו עשויה גם להתקבל תשובה נכונה מהסיבה اللا-נכונה: תלמידים שימנו את מספר הריבועים הנראים בסרטוט, קיבלו את המספר 27, שהוא גם מספר ייחודת הנפח בקוביה.</p>
<p><u>סעיף ג'</u></p> <p>מניה של מספר הריבועים הנראים בתמונה (27) בלי להתחשב בעובדה של קובייה 6 פאות.</p>
<p>בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב</p>
<p>لتלמידים המתקשים לדמות את המבטים הלא-נראים של הקובייה. חשוב מאוד לתת לתלמידים משימות שבחן עליהם בניית מקוביות קטנות מבנים הנראים בתמונה. עבודה ביישומים הממחישים בצורה אינטראקטיבית את המבטים השונים של תיבות עשויה לפתח את יכולת הראייה המרחבית ואת הבנת המבנה של תיבות. חשוב לתרגל מעבר מייצוג לייצוג ומעבר מסרטוט דו-ממדי לבניה מוחשית בתלת-ממד או להפוך. חשוב שלתלמידים יהיה דמיוני מנטלי של מושגים תלת-ממדיים, ביןיהם התיבה והקוביה.</p>

שאלה 26


לפניכם סרטוות של מלבן.

על היקף המלבן מסומנות נקודות הנמצאות במרחקים שווים זו מזו.

סרטטו שני קטעים ישרים לפי הדרישות האלה:


- כל קטע יחבר בין שתי נקודות.

- הקטעים יחלקו את המלבן לשני משולשים ישרי-זווית ולמקבילית אחת.




תשובה :


I.




II.




III.




VI




V




IV



IIIIV



IIIIV



ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

הערה: כל סרטווט שהוא תמונה ראי של אחד הסרטווטים המוצגים, ייחשב תשובה נכונה.

אפיון השאלה

נושא: גאומטריה ומדידות – משולשים ומרובעים

ה שאלה בודקת **יכולת יישום** של תכונות משולש ישר-זווית ומקביליות שונות, **על-ידי סרטווט**.

רמת חשיבות צפופה: חיפוש פתרון

רמת קושי צפופה: יתרנסס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

ביתה ג': עמוד 70 – מיוון משולשים לפי זוויות ולפי צלעות, מרובעים: הכרת ריבוע, מלבן, מקבילית, מעוין, טרפז ודלתון

ביתה ה': עמוד 112 – מרובעים: ניתוח תכונת, מיוון מרובעים וקשרי הכללה

הידע הדרוש לפתרון השאלה

ביתות א'-ב': הכרת מצולעים, משולשים ומרובעים

ביתה ג': זוויות, מיוון זוויות, תכונות של משולשים, מיוון משולשים על-פי זוויות, מיוון משולשים על-פי צלעות, הכרת מרובעים

ביתה ד': הכרת הריבוע והמלבן

ביתה ה': ניתוח תכונות המרובעים, מיוון מרובעים וקשרי הכללה


אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

ניסוי וטעייה תוך כדי הישענות על הכרת התכונות של הצורות הנדרשות, או דמיוי הצורות.

דוגמאות לשגיאות או לקשדים העשויים להופיע

קושי בהבנת מכלול האילוצים עשוי לגרום חלוקה של המלבן לשני משולשים ישר-זווית (על-ידי סרטווט האלכסון). במקרה כזה התichier התלמיד רק לאחד התנאים שבוחראה.

לדוגמה :



חלק ג' – מספרים ופעולות בשברים


שאלה 27

חברו בקו כל אחד מהשברים למקום המתאים על ישר-המספרים.

א. $\frac{3}{8}$


ב. $1\frac{1}{2}$

ג. $\frac{5}{4}$




תשובות :


א.



ב.



ג.



ניקוד :

סעיף א' : 1 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

סעיף ב' : 1 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

סעיף ג' : 1 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

אפיון השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשברים – שברים פשוטים על ישר-המספרים

השאלה בודקת את **יצוג השבר** כנקודה על ישר-המספרים.

רמת חשיבה צפופה: סעיפים א'-ו-ב' – ידע ויזיהוי, סעיף ג' – חשיבה אלגוריתמית

רמת קושי צפופה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

ביתה ה': עמוד 98 – הצגת השבר כנקודה על ישר-המספרים

הידע הדורש לפתרון השאלה

כיתות א'-ב': הכרת ישר-המספרים ופירוש יחס הסדר של מספרים על הישר

כיתות ג'-ד': הרחבת ההיכרות עם ישר-המספרים לתחומי מספרים גדולים, הכרת שברים יסודיים, הכרת ממשמעויות שונות של השבר הפשוט, מספרים מעורבים, יחסי סדר גדול בין שברים, שמות שונים לשבר

ביתה ה': הרחבת המשמעות של השבר כנקודה על ישר-המספרים, ייצוג שברים, מספרים מעורבים ושלמים על ישר-המספרים

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

כל קטוע בין שני מספרים שלמים על ישר-המספרים שבסالة מחולק ל-8 חלקים שווים. לכן צפויות שתי אסטרטגיות לפתרון
סעיףים ב' ו-ג' של השאלה :

א. **יצוג השברים כশמניות:**

$$1 \frac{4}{2} = 1 \frac{1}{8} = \frac{12}{8}$$

$$\frac{5}{4} = \frac{10}{8} = 1 \frac{2}{8}$$

ב. סימונו נקודת האמצע שבין 1 ל- 2 כمبرטה את השבר $1 \frac{1}{2}$, וסימונו נקודת האמצע שבין 1 ל- 1 כمبرטה את השבר (מבוסס על
 $\frac{5}{4}$ ההבנה ש- $1 \frac{1}{4}$).

דוגמאות לשגיאות או לקשיים העשויים להופיע

א. סימונו נקודת שערכה $1 \frac{5}{4}$, וסימונו נקודת שערכה $1 \frac{1}{8}$. טעות זו נובעת מהתבלבול על המונה של השבר בעל מספר
ה"קפיצות", ללא התייחסות למכנה ולכמה חלקים השלם שעל הציר מחולק.

ב. מנית השנתות (הקוים שעל הציר) ולא המרווחים שבין שנת לשנת.

ג. תלמידים המזהים את השברים כמייצגים שטחים (כחול משלם) ומתתקשים לייצג את השבר בדרכים אחרות.

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

لتלמידים המתৎשים למקם את השבר שבטעיף א' במקומו המקורי. חשוב לבדוק בשיחה מה מקור הקושי :

لتלמידים שנראה שיש להם תפיסה שגوية כלשהי הקשורה בהבנת ישר-המספרים, יש להבהיר את משמעות סידור המספרים על הימין תחילת במספרים שלמים ורך לאחר מכן לעבור לשברים.

لتלמידים שהשבר מזוהה אצלם רק כחלק ממשם במודל כלשהו, והם מתৎשים לראותו כנקודה על הימין, יש להבהיר את המעבר מייצוג ליצוג כאשר שני הייצוגים מסמלים אותו שבר : בכל אחד מהייצוגים חשוב לראות את החלם, את חלוקה לחלקים השווים ואת מנתית מספר החלקים.

שאלה 28

פתרונות:

א. $\frac{3}{3} + \frac{7}{7} =$

ב. $8\frac{2}{9} + 2\frac{8}{9} =$

ג. $2\frac{1}{3} - \frac{1}{2} =$

תשובות:

א. או $\frac{3}{3} - \frac{7}{7} = 2$

ב. $8\frac{2}{9} + 2\frac{8}{9} = 10\frac{10}{9}$ או $8\frac{2}{9} + 2\frac{8}{9} = \frac{100}{9}$ או $8\frac{2}{9} + 2\frac{8}{9} = 11\frac{1}{9}$

או $11\frac{1}{9}$

התשובה $10\frac{10}{9}$ תיחסב תשובה נכונה.

ג. $2\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{11}{6}$ או $2\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = 1\frac{5}{6}$

ניקוד:

סעיף א': 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

סעיף ב': 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

סעיף ג': 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

אפיון השאלה

נושא : מספרים ופעולות בשברים – חיבור וחיסור שברים פשוטים

השאלה בודקת **פתרון תרגילי חיבור וחיסור שברים ומספרים מעורבים :**

- בסעיף א' – חיבור שני שברים בעלי מכנים זרים, שכל אחד מהם הוא ייצוג אחר של 1.
- בסעיף ב' – חיבור שני מספרים מעורבים שבחלקים השכרים שלהם אותו מכנה.
- בסעיף ג' – חיסור שבר ממשהך מעורב. החלקים השכרים בשני המספרים מבוטאים במכנים הזרים זה לזה. במקרה ביצוע פעולה החיסור יש צורך לבצע המרה בשלם.

רמת חשיבות צפוייה : חשיבה אלגוריתמית ו/או תהליכיית (תובנה חשבונית)

רמת קושי צפוייה : יתפרנס המשך

מופיע בתכנית הלימודים

כיתה ד': עמוד 77 – חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים שווים או מכנים קרובים (מולדים)

כיתה ה': עמוד 99 – חיבור וחיסור שברים

הידע הדרוש לפתרון השאלה

כיתה ג': הכרת שברים יסודיים

כיתה ד': הכרת משמעותות שונות של השבר הפשוט, שמות שונים לשבר, ייצוג שלמים כশברים, מספרים מעורבים, חיבור וחיסור שברים שווים ושברים דומים באמצעות מודלים ואמצעי הממחשה

כיתה ה': הרחבת וצמצום של שברים, מכנה משותף, חיבור וחיסור שברים

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

סעיף א'

א. זיהוי שני השברים הם ייצוג של המספר 1, ולכן התרגיל 쉬ול לתרגיל: $1 + 1 = 2$

ב. מיציאת מכנה משותף לשני השברים וחיבור המונחים:

$$\frac{3}{3} + \frac{7}{7} = \frac{21}{21} + \frac{21}{21} = \frac{42}{21} = 2$$

סעיף ב'

א. חיבור השלמים ולאחר מכן החלקים השכרים של המספר:

$$8\frac{2}{9} + 2\frac{8}{9} = 10 + \frac{2}{9} + \frac{8}{9} = 10\frac{10}{9} = 11\frac{1}{9}$$

$$\begin{array}{r} & 2 \\ 8 & - \\ & 9 \\ + & \\ & 8 \\ 2 & - \\ & 9 \\ \hline & 10 \\ 10 & - \\ & 9 \\ & 1 \\ & 9 \end{array}$$

אפשר גם לכתוב במאונך:

אפשר גם לבצע את החיבור כמו באלגוריתם לחיבור שלמים במאונך. ההמרה מתבצעת תוך כדי תהליך החיבור, והשלים נרשם ב"זיכרונו" בטור של השלמים:

$$\begin{array}{r} 1 \\ 2 \\ 8 - \\ 9 \\ + \\ 8 \\ 2 - \\ 9 \\ \hline 1 \\ 11 - \\ 9 \end{array}$$

סעיף ג'

א. שלב א': הបאת שני השברים למכנה משותף

שלב ב': פריטה של שלם אחד על-פי המכנה המשותף או פריטות שני השלים עלי-פי המכנה המשותף

שלב ג': ביצוע החישור –

$$2\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = 2\frac{2}{6} - \frac{3}{6} = 1\frac{8}{6} - \frac{3}{6} = 1\frac{5}{6}$$

$$2\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = 2\frac{2}{6} - \frac{3}{6} = \frac{14}{6} - \frac{3}{6} = \frac{11}{6}$$

הפתרון השני יכול להיות מלאוה בהוצאת שלמים ובביטוי התוצאה הסופית על-ידי מספר מעורב.

ב. שלב א': הפיכת המספר המערוב לשבר

שלב ב': הបאת שני השברים למכנה משותף

שלב ג': ביצוע החישור –

$$2\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{7}{3} - \frac{1}{2} = \frac{14}{6} - \frac{3}{6} = \frac{11}{6}$$

ג. שלב א': חישור $\frac{1}{2}$ מ-2

שלב ב': חיבור $1\frac{1}{2}$ (ההפרש שהתקבל) ל- $\frac{1}{3}$ פעולה זו יכולה להיעשות בעל-פה תוך כדי התבוסות על הידע ש:

וש- $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$. מכאן שהתוצאה היא: $1\frac{5}{6}$. אפשר להגיא לתוכה זו גם על-ידי ייצוג המספרים בעיגולים או בריבועים.

דוגמאות לשגיאות או לקשדים העשויים להופיע

סעיף א'

א. חיבור מונה ומכנה למכנה (ברמה האינטואיטיבית, המספרים הנתונים "מוזמנים" לעשות את הטעות

$$\frac{3}{3} + \frac{7}{7} = \frac{10}{10}$$

הזאת:

ב. תלמידים הבוחרים לחבר את שני המספרים לאחר הרחבת השברים כדי להביאם למכנה משותף, יכולים לבצע טעויות המאפיינות הרחבות לא נכונות, לדוגמה:

$$\frac{3}{3} + \frac{7}{7} = \frac{3}{21} + \frac{7}{21} = \frac{10}{21}$$

סעיף ב'

א. המרת $\frac{10}{9}$ בשלם על-פי בסיס ההמרה הידוע בשלמים. במקרה זה עשוי להתקבל הפתרון:

$$8\frac{2}{9} + 2\frac{8}{9} = 10\frac{10}{9} = 11$$

סעיף ג'

א. חיסור מונה ממונה וממכנה :

$$2\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{7}{3} - \frac{1}{2} = \frac{6}{1} \quad \text{או} \quad 2\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = 2\frac{0}{1}$$

ב. חוסר הבנה שאפשר לפרט את השלם, עשוי להביא לחיסור השבר הקטן מהשבר הגדול (מקביל לשגיאה שבה תלמידים מיחסרים את המספר הקטן מהמספר גדול ללא קשר לאיזה מספר הוא חלק של המחוסר ואיזה הוא חלק של המחסר). במקרה כזה עשוי להתקבל הפתרון :

$$2\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = 2\frac{2}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$$

ג. טעויות הנובעות מהבאיה למכנה משותף בדרך שגوية, לדוגמה :

$$\begin{array}{r} \frac{7}{3 \times 2} = \frac{1}{2 \times 3} \\ \frac{7}{6} - \frac{1}{6} = \frac{6}{6} \\ 2\frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{6}{6} \end{array}$$

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

لتלמידים העובדים ברמה טכנית, שאינם מבינים במכנים והם ווכפלים באופן טכני את המכנים. למשל, בתרגילים בסעיף ב' ימצאו תלמידים אלה שהמכנה המשותף הוא 81. יש לשים לב גם ל/galleryים ההפכים את כל המספר המעורב לשבר כדי לבצע את פעולות החיבור והחיסור. יש להניח שתלמידים אלה גם לא יבחינו בכך שני המוחברים בסעיף א' הם שני שלמים.

עם תלמידים אלה מומלץ לעבוד על:

א. ייצוג מספרים בסרטוטים סכמטיים ומהחשת פעולות החיבור והחיסור באמצעות הייצוגים הסכמטיים. ייצוג המספרים הסרטוטים יסייע לתלמידים לבדוק בתוצאות המספר וביכולת לבצע פעולות על מרכיבים של המספר ולא על כל המספר.

ב. פירוקים שונים של המספרים המעורבים, למשל: לשלים או לחלקים השברים במספר מעורב או פירוקים אחרים. חשוב להסביר את תושמתם לבם של התלמידים ליכולת השימוש בפירוקים השונים כדי לבצע פעולות חיבור וחיסור בצורה ייעילה.

בכל מקרה, חשוב לתרגל את התלמידים בתבוננות מקדימה על המספרים בכל תרגיל, ולהבהיר להם שקיים הרבה דרכים רבות לפתרון. ואין אלגוריתם אחד שחייבים לבצע.

שאלה 29**השלימו:**

$$\frac{1}{4} \times [] = 1$$

תשובה:

$$\frac{1}{4} \times 4 = 1$$

ניקוד: 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשברים – כפל שלם בשבר

השאלה בזוקת השלמה מספר חסר **במשוואה כפל**.

רמת חשיבה צפוייה: חסיבה תהליכיית (מבנה חשבוניות)

רמת קושי צפוייה: يتפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

ביתה ג': עמודים 67, 68 – הכרת שברי יחידה, מספר הפעמים שלם מכיל שבר ייחידה מסוימת

ביתה ד': עמודים 76–78 – הכרת השבר הפוטו, ייצוג מספר טבעי בצורה של שבר, כפל שלם בשבר

הידע הדרוש לפתרון השאלה

ביתות ב'-ג': ממשמעות הכפל, פתרו משוואות כפל, הכרת שברים יסודיים

ביתה ד': ייצוגים שונים לשברים ולשלמים, ייצוג מספר טבעי בצורה של שבר, כפל שלם בשлем

סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

פתרון המשוואה מצריך את הבנת ממשמעות הכפל כ"פעמים". יש להניח שחלק מהתלמידים ישלימו אוטומטית את המספר החסר ממשוואה על סמך ידע ועל סמך דמיוי שיש להם לשלהו המחולק לרבעים.

חלקים יסתרכו ייצוג כלשהו של שלם, יחלקו אותו לרבעים ויבדקו כמה פעמים הרבע "נכנס" בשלם.

דוגמאות לשגיאות או לקשירות העשויים להופיע

קשי הטעון בהבנה שהמשמעות של פעולת הכפל המוכרת בשלמים נשמרת גם בשברים. תלמידים שאינם מקשרים בין המשמעות של כפל בשלמים למשמעות של כפל בשברים, יתקשו להבין שמדובר במספר הפעמים שרבע נכללו בשלם. אצל תלמידים אלה מומלץ לחזק את הבנת ממשמעות הכפל בשברים על ידי חוזה על ממשמעות הכפל בשלמים והציג המרכיבים הזוהים של הפעולה בשלמים ובשברים (למשל: מספר הפעמים שכופלים גודל קבוע – בשלמים גודל זה הוא מספר שלם ובשברים גודל זה הוא שבר).

שאלה 30

פי כמה 3 גדול מ- $\frac{1}{3}$?

תשובה :

פי 9

ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשברים – מהות השבר
השאלה בודקת את הבנת הכלכלה של שבר ייחידה במספר שלמים באמצעות שימוש במושג "פי".
רמת חשיבה צפוייה: חסיבה תحلילית (תובנה חשובית)
רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

ביתה ג': עמודים 67, 68 – הכרת שברי ייחידה, מספר הפעמים שלם מכיל שבר ייחידה מסוים

ביתה ד': עמודים 76–78 – הכרת השבר פשוט, ייצוג מספר טבעי בצורה של שבר, כפל שלם בשבר

הידע הדרוש לפתרון השאלה

ביתות ב'-ג': משמעות הכפל, הכרת שברים יסודיים והבנה כמה פעמים שבר יסודי מוכל בשלם, הכרת המושג "פי"

ביתה ד': ייצוגים שונים לשברים ולשלמים, ייצוג מספר טבעי בצורה של שבר, כפל שבר בשלם

סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. הבנה שבכל שלם יש שלושה שלישים, ולכן ב- 9 שלמים יש תשעה שלישים. מכאן ש- 3 שלמים גדולים פי 9 ושליש אחד.

ב. סריטוט שלושה שלמים בצורה עיגול, מלבן או ייצוג אחר, ובדיקה כמה פעמים שלושת השלמים מכילים את השליש.

ג. בנית משווה את כפל : $3 = \frac{1}{3} \times []$ ומציאת מספר הפעמים שיש לכפול את $\frac{1}{3}$ כדי לקבל 3.

דוגמאות לשגיאות או לטעויות העשויים להופיע

המושג "פי" מוכר בהקשר כפל שלמים. יכול להתעורר קושי לקשרו לתחום השברים.

בשעת הבדיקה מומלץ לשיטם לב

להבנת משמעות השבר אצל תלמידים שהתקשו בשאלה. חשוב לחזק את הבנת משמעות השבר לא רק בהקשר של חלוקת השלם לחלקים שווים, אלא גם בהקשר של הפעולה ההפוכה: בדיקה כמה פעמים השלם מכיל חלק (שבר) מסוים. פעולה זו מבוססת על הבנת החילוק להכללה, ומומלץ לקשר אותה לשאלות כמו: "פי כמה גדול השלים משבר ייחידה מסוים?", "פי כמה גדולים מספר שלמים משבר ייחידה מסוים?" ו"פי כמה קטן שבר ייחידה מסוים מהשלם?".

שאלה 31

השלימו מספרים מתאימים.

.א.

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \frac{12}{12} + \frac{12}{12}$$

.ב.

$$\frac{5}{6} + \frac{2}{9} = \frac{18}{18} + \frac{18}{18}$$

.ג.

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{15}{15} + \frac{10}{15}$$

תשובות:

א. או כל שני שברים אחרים שהמכנה שלהם 12 וסכוםם שווה $\frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \frac{9}{12} + \frac{8}{12}$

$$1\frac{5}{12}$$

ב. או כל שני שברים אחרים שהמכנה שלהם 18 וסכוםם שווה $\frac{5}{6} + \frac{2}{9} = \frac{15}{18} + \frac{4}{18}$

$$1\frac{1}{18}$$

ג. או כל שני שברים אחרים המתאימים לשווין. $\frac{2}{5} + \frac{2}{3} = \frac{6}{15} + \frac{10}{15}$

ניקוד :

סעיף א' : 1 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

הערה : כתיבת המונה של אחד השברים בלבד תיחס תשובה שגויה.

סעיף ב' : 1 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

הערה : כתיבת המונה של אחד השברים בלבד תיחס תשובה שגויה.

סעיף ג' : 1 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

הערה : כתיבת המונה של אחד השברים בלבד תיחס תשובה שגויה.

أفيون השאלה

נושא : מספרים ופעולות בשברים – חיבור וחיסור שברים פשוטים בעלי מכנים קרובים ובעלי מכנים זרים
השאלה בודקת השלמת מספרים חסרים במשוואות. המשוואות הן חלק מסווגות בין שני תרגילי חיבור של שברים, והנעלמים הם מונינים בשברים.

רמת חשיבה צפופה : סעיפים א' ו-ב' – חשיבה תحلילית (מבנה חשבונית), סעיף ג' – חיפוש פתווח

רמת קושי צפופה : יתפרנס בהמשך

مופיע בתכנית הלימודים

ביתה ד' : עמודים 77, 78 – חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים שוים או קרובים

ביתה ה' : עמוד 99 – חיבור וחיסור שברים

הידע הדרוש לפתרון השאלה

ביתות ב'-ג' : משוואות חיבור וחיסור, ממשמעות הכפל והחילוק, עובדות כפל וחילוק בתחום ה- 100, הכרת שברים יסודיים

ביתה ד' : הכרת ממשמעויות שונות של השבר הפשוט, שברים גדולים מ- 1, שמות שונים לשבר, חיבור וחיסור שברים בעלי מכנים קרובים, משוואות חיבור וחיסור שברים

ביתה ה' : הרחבה וצמצום, חיבור וחיסור שברים

استراتيجيات צפויות לפתרון השאלה

סעיף א'

א. מבנה המשווה כפי שהוא מוצג, והעובדת שהמכנה שבאגף הימני הוא מכפלת שני המכנים שבאגף השמאלי, עשויים לرمוז על כך שהפעולה שהתקבצה היא הרחבה השברים, ולמעשה באגף השמאלי מוצגים אותו התרגיל ואותם השברים, רק שכל שבר מבוטא בשם"ם" אחר. לכן, יש לצפות שהמונים החסרים יושלמו על-ידי הרחבה : המונה הראשון יהיה מכפלה של 3 ו- 3, והמונה השני יהיה מכפלה של 2 ו- 4 .

$$\frac{3}{4} + \frac{2}{3} = \frac{9}{12} + \frac{8}{12} = \frac{17}{12}$$

שלב ב' : השלמה של שני מספרים שלמים שסכומם 17 .

סעיף ב'

א. ההבנה שהמספר 18 הוא כפולה של שני המכנים שבאגף השמאלי, עשויה לרמז על כך שהפעולה שהתבצעה היא הרחבת השברים, ולמעשה באגף השמאלי מוצגים אותו תרגיל ואוטם שברים, רק שכל שבר מבוטא ב"שם" אחר. לכן, יש לצפות שהמוניים החסרים יושלמו על-ידי הרחבה: המונה הראשון יהיה מכפלה של 6 ו-3, והמונה השני יהיה מכפלה של 2 ו-2.

$$\text{ב. שלב א': פתרון התרגיל שבאגף השמאלי של המשווה} \\ \frac{5}{6} + \frac{2}{9} = \frac{15}{18} + \frac{4}{18} = \frac{19}{18}$$

שלב ב': השלמה של שני מספרים שלמים שסכוםם 19.

יש להניח שתלמידים שיבחרו באסטרטגייה א' בפתרון לסעיף א', ישתמשו באותה אסטרטגייה גם בפתרון לסעיף ב', וכך גם במקרים לאסטרטגייה ב'.

סעיף ג'

א. פתרון על-פי אותו עיקרונו שהוצע באסטרטגייה א' בשני הטעיפים הקודמים: הרחבת השברים בשני התרגילים בהתאם. ככלומר, השבר השמאלי שבאגף הימני יורחב ל- $\frac{6}{15}$, והשבר הימני שבאגף השמאלי יהיה $\frac{2}{3}$, שהוא מצויום של $\frac{10}{15}$.

ב. פתרון על-ידי ניסוי וטעה: השלמה של מספר כלשהו באחד המקומות החסרים שבאחד האגפים, פתרון התרגיל באותו אגף והשלמה של המספר החסר באגף האחר כך שהשוינו יישמר. למשל, אם נשלים את המספר 1 במונה החסר שבאגף השמאלי:

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{6}{15} + \frac{5}{15} = \frac{11}{15}$$

ונפתרו את התרגילים, נקבל את התוצאה: $\frac{11}{15}$. כדי לשמר על השוויון בין שני האגפים, כתוב את המספר 1 במונה החסר שבאגף הימני.

על-פי אסטרטגייה זו, כל מספר שהוא שווה או גדול מ-1 שיוצג במקומות החסר באגף השמאלי, אפשר הצבה של מספר שלם באגף הימני. לעומת זאת, לא כל מספר שלם שהוא שווה או גדול מ-1 שיוצג במקומות החסר באגף הימני, אפשר השלמה של מספר שלם במקומות החסר באגף השמאלי. לדוגמה, אם נציב במקומות החסר באגף הימני את המספר 2, נקבל:

$$\frac{2}{5} + \frac{1}{3} = \frac{2}{15} + \frac{10}{15}$$

במקרה זה אין מספר שלם שאפשר להציב במקומות החסר באגף השמאלי.

דוגמאות לשגיאות או לקשיים העשויים להופיע

א. קושי בהבנת השוויון בין שני האגפים.

ב. קושי הנובע מחוסר יכולת לפתרון תרגילי חיבור בעלי מכנים שונים, או קושי הנובע מהתפיסות שגויות הקשורות בחיבור שברים. במקרים אלה יש להניח שלבייטויים לא תהיה משמעות עבור התלמידים, והם יבחרו שלא לענות על שאלה זו.

שאלה 32

א. סמנו את השבר הגדל מ- $\frac{1}{2}$ והקטן מ- $\frac{2}{3}$

$$\frac{5}{12} \quad \square_4 \quad \frac{6}{12} \quad \square_3 \quad \frac{7}{12} \quad \square_2 \quad \frac{8}{12} \quad \square_1$$

ב. כתבו שבר גדול מ- $\frac{2}{3}$ וקטן מ- 1

תשובה: _____

תשובות:

א. $\frac{7}{12}$ (2)

ב. כל שבר הגדל מ- $\frac{2}{3}$ וקטן מ- 1, לדוגמה: $\frac{11}{12}, \frac{10}{12}, \frac{9}{12}, \frac{5}{6}$

ניקוד:

סעיף א': 1 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

סעיף ב': 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析ו השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשברים – השוואת שברים פשוטים

ה שאלה בזאת השוואת שברים במקורה שבו נדרש הרחבה או צמצום כדי לבצע את ההשוואה. כמו כן, נדרשות הבנת רעיון הצפיפות של שברים ומציאת שבר הנמצא בין שני שברים נתונים.

רמת חשיבות צפוייה: חשיבה תהליכיית (תובנה חשבונית)

רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתכנין הלימודים

כיתה ד': עמוד 77 – השוואת שברים בדרכים אינטואיטיביות ללא אלגוריתם

כיתה ה': עמוד 99 – השוואת שברים

הידע הדרוש לפתרון השאלה

כיתה א'-ב': הכרת ה"חצית" וה"רבע"

כיתה ג': הכרת שברי היחידה, השוואת שברי יחידה

כיתה ד': הכרת שברים, משמעות השבר, שמות שונים לשבר, השוואת שברים בדרכים אינטואיטיביות, השוואת שלם, השוואת לחצי

כיתה ה': השוואת שברים, הרחבה ומצום של שברים

סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

סעיף א'

א. שלב א': הסתמכות על נקודת האחיזה "חצית" וידיעה ש: $\frac{8}{12}$, $\frac{7}{12}$, $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. לכן שני השברים, $\frac{8}{12}$ ו- $\frac{7}{12}$, גדולים מחצי.

שלב ב': מצום השבר: $\frac{7}{12} - \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$. לכן הפתרון המתאים הוא:

ב. הרחבות שני השברים, $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$, $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$. מכאן שהשבר ביניהם הוא $\frac{7}{12}$.

סעיף ב'

א. הסתמכות על דרך הפתרון בסעיף א' ושימוש בשברים שהמכנה שלהם הוא 12. לכן השברים: $\frac{11}{12}$, $\frac{10}{12}$, $\frac{9}{12}$ יתאימו.

ב. הכרת שברים שיש בהם שימוש רב ושהערכות סדר הגודל ביניהם עשויה להוביל לשליפת התשובה:

ג. ביטוי השבר $\frac{5}{6}$ כדי למצאו שבר נוסף הקטן מ- 1 בעל אותו מכנה. במקרה זה תיכתב התשובה.

דוגמאות לשגיאות או לטעויות העשויות להופיע

א. קושי בהבנת טווח המספרים או קושי בהבנה שיש שני תנאים לייצרת טווח המספרים.

ב. קושי הנובע מאי-הבנה אינטואיטיבית של עקרון הצפיפות: תמיד אפשר למצוא שבר בין שני שברים. תלמידים שאינס מבינים זאת, עשויים שלא להבין שקיים מספר המתאים לנדרש בסעיף ב'.

ג. קושי הנובע מאי-הבנה שאפשר לבטא שבר בייצוגים מסוימים שונים (שמות שונים). תלמידים שאינס מבינים זאת, לא יוכל למצוא את הקשר בין המספרים המופיעים בשאלת בין אפשרויות הפתרון.

ד. קושי הנובע מאי-הבנה בסיסית של השוואת שברים (השוואת שברי יחידה, השוואת שלם, השוואת לחצי).

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

בשאלה זו נדרש הבנה עמוקה של כמה עקרונות מהותיים ובסיסיים בהבנה של השבר פשוט: השוואת שברי יחידה, ביטוי שבר על-ידי כמה ייצוגים מסוימים, ביטוי המספר 1 כמספר יכולת מעבר מייצוג מספר לייצוג מספרי.

אצל תלמידים שהתקשו בשאלה זו, מומלץ לבדוק בעזרה כלים אחרים את ההבנה הבסיסית של העקרונות שהזכירו, ולא לתרגל באמצעות אסטרטגיות טכניות הכלולות השוואת על-ידי מעבר למכנה אחד והשוואת המונחים.

שאלה 33

דני אכל חצי עוגה.

את שאר העוגה הוא חילק שווה בשווה בין 5 חברים.

איזה חלק מהעוגה השלמה קיבל כל אחד מחמשת החברים?

תשובה: _____

תשובה:

**1
10** או "עשירות" העוגה

ניקוד: 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

أفينון השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשברים – שימושות השבר הפשוט, שמות שונים לשבר, הكلת שבר בשבר
השאלה בודקת **פתרו בעיה** חד-שלבית שנבדקת בה הchèלט שבר בשבר, חלוקת חלק משלם ושוויו החלק באופן יחסית לשלם. **לפתרו**
השאלה נדרשות יכולת ייצוג שברים בסכימה, הבנה מהו השלם והבנה שם השבר נקבע על-פי מספר הפעמים שהוא מוכל בשלם.

רמת חשיבות צפופה: חשיבה תהליכיית (יישום ותובנה חשבונית)

רמת קושי צפופה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

ביתה ד': עמודים 76, 77 – הכרת השבר הפשוט, שמות שונים לשבר, ייצוג שלמים כמספר

ביתה ה': עמודים 98, 99 – שימושויות השבר הפשוט, ייצוגים שונים של שברים

הידע הדרוש לפתרון השאלה

כיתות א'-ב': הבנת שימושיות שונות של כפל ושל חילוק (חילוק להחלה), שאלות בכפל ובחילוק, הכרת ישר-המספרים, שימושות החצי ושבירים יסודיים

כיתות ד'-ה': שימושיות שונות של שברים, שמות שונים לשבר, ייצוג שלמים כמספר, חיבור שברים, ייצוג שברים על ישר-המספרים, שלמים שונים

סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. פתרו באמצעות ייצוג הסיטואציה בציור סכמטי של מודל, עיגול, מלבן או ישר-המספרים: בניית שלם, חלוקתו לשני חלקים שווים ולאחר מכן חלוקת כל אחד ממחצאים ל- 5 חלקים שווים.

ב. פתרו באמצעות דמיון מנטלי של ייצוגים מבין אלה המזוכרים באסטרטגיה א'.

ג. פתרו המבוסס על הבנת הקשר שבין�数ים 2, 5 ו- 10, והבנה שהמספרים מציננים את מספר החלקים שמחלקים את השלם.

דוגמאות לשגיאות או לקשדים העשויים להופיע

התשובה השגויה "חמיישית" עשויה להתוצאה מהסתמכות על המשפט "חלוקת שווה בשווה בין חמיישה חברים", ומהתעלמות לכך שהשלם שוחלך הוא למעשה לששה מחצית העוגה.

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

מומלץ להציג לתלמידים שכتبו את התשובה "חמיישית" שאלות נוספות בהן איתור השלם, ולבזוק אם הם מודעים לכך שיש לבדוק על-פי נתוני השאלה מהו השלם שאותו מחולקים לשאים שווים.

שאלה 34

אורן צועד על מדרכתה ישרה.

אורן כל צעד שלו הוא $\frac{2}{3}$ מטר.

כמה צעדים עליו לצעוד כדי לעبور מרחק של 2 מטרים?

תשובה: _____ צעדים

תשובה:

3 צעדים

ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשברים – משמעות השבר הפשוט, הchèלת שבר בשלם, חיבור שברים שווים
השאלה בודקת **פתרון בעיה** חד-שלבית שנבדקת בה הchèלת שבר במספר שלם. לפתרון השאלה ניתן של חיבור שברים באמצעות אינטואטיביים והבנה של ייצוג שלמים כמספר.

רמת חשיבה צפוייה: חסיבה תהליכיית (יישום ותובנה חשבונית)

רמת קושי צפוייה: יתפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

כיתה ד': עמודים 76, 77 – הchèלת השבר הפשוט, שמות שונים לשבר, ייצוג שלמים כמספר, חיבור שברים, כפל שלם בשבר

כיתה ה': עמודים 98, 99 – משמעויות השבר הפשוט, ייצוג שלמים על ישר-המספרים, חיבור שברים

הידע החדש לפתרון השאלה

כיתות א'-ב': הבנת משמעויות שונות של כפל ושל חילוק (חילוק להחלה), שאלות בכפל ובחילוק, הchèלת ישר-המספרים

כיתות ד'-ה': משמעויות שונות של שברים, שמות שונים לשבר, ייצוג שלמים כמספר, חיבור שברים, ייצוג שלמים על ישר-המספרים

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. פתרון באמצעות ייצוג הסיטואציה בציור סכמטי של מודל, עיגול, מלבן או ישר-המספרים: בניית המספר 2 על-ידי חיבור חוזר של $\frac{2}{3}$

ובדיקה כמה פעמים $\frac{2}{3}$ "יכנס" ב- 2 .

ב. פתרון באמצעות דימוי מנטלי של ייצוגים מבין אלה המזוכרים באסטרטגיה א'.

ג. פתרון באמצעות ייצוג מספרי של משווה: $\frac{2}{3} \times [] = 2$. מציאת המספר החסר במשווה על-ידי התנסות בחיבור חוזר של $\frac{2}{3}$

שאלה 35**סמן את המספר הקטן ב- 0.1 מ- 3**2 ₁2.9 ₂2.99 ₃2.999 ₄

תשובה :

(2) 2.9

ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה**נושא:** מספרים ופעולות בשברים – מבנה המספר העשרוני, חיבור וחיסור מספרים עשרוניים**השאלה בודקת את ה^{כברת} השיטה לכתיבת שברים על-פי המבנה העשרוני וחיסור שבר עשרוני משלם.****רמת חשיבות צפואה:** חשיבה אלגוריתמית**רמת קושי צפואה:** יתפרנס בהמשך**מופיע בתכנית הלימודים****כיתה ה':** עמודים 101–104 – שימושות השבר העשרוני, חיבור וחיסור שברים עשרוניים**הידע נדרש לפתורון השאלה****כיתות א'-ב':** שיטת הכתיבה העשרונית**כיתה ג':** מבנה המספר העשרוני, שברים יסודים**כיתה ד':** שברים פשוטים – מהות, שמות שונים לאותו שבר, השוואת שברים, ייצוג שלמים בשברים, מהות השלם**כיתה ה':** שברים עשרוניים, חיבור וחיסור שברים עשרוניים**אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה**

א. הכרת מבנה המספר ו"ספירה" אחרת בעשריות.

ב. ביצוע אלגוריתם של חיסור : 0.1 – 3 במאונך.

דוגמאות לשגיאות או לקשיים העשויים להופיע

א. קושי הנובע מא-הבנה שאפשר לפרק מספרשלם לעשריות.

ב. קושי בביצוע המורთ (ייתכן שנובע מא-הבנה של עקרונות המבנה העשרוני של מספרים).

בשעת הבדיקה מומלץ לשים לב

لتלמידים המתקשים בהבנת העקרונות של הקבוצה, של פריטה ושל המראה. מומלץ לבדוק אצל תלמידים את הביצוע של תרגילי חיבור וחיסור בשלמים, ובמידת הצורך לעבד אתם על הבנת עקרונות המבנה העשרוני בשלמים תוך כדי קישור לשברים עשרוניים.

שאלה 36**3.05 שווה ל:**

$$\frac{300}{100} + \frac{0}{100} + 5 \quad \square_1$$

$$\frac{3}{100} + \frac{0}{100} + \frac{5}{100} \quad \square_2$$

$$3 + \frac{5}{100} \quad \square_3$$

$$3 + \frac{5}{10} \quad \square_4$$

תשובה :

$$3 + \frac{5}{(3)} \quad \square$$

ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה**נושא:** מספרים ופעולות בשברים – מבנה המספר העשרוניהשאלה בזקתה את **הכרת** המבנה העשרוני של שבר עשרוני: זיהוי הערך שמייצגות הספרות במספר, והכרת השבר העשרוני כשבר פשוט שמכנהו חזקה של 10.**רמת חשיבות צפוייה:** ידע וזיהוי**רמת קושי צפוייה:** يتפרקם בהמשך**מופיע בתכנית הלימודים****ביתה ה':** עמוד 101 – משמעות השבר העשרוני, הכרת המונחים: עשריות, מאיות, אלפיות, השבר העשרוני כשבר שמכנהו 10, 100, 1000 וכדומה**הידע הדרוש לפתרון השאלה****ביתה ג':** הבנת המבנה העשרוני במספרים שלמים, חיבור וחיסור במספרים שלמים (לרבות המורות), הכרת שברי יחידה**ביתה ד':** הכרת שברים, השוואת שברים, שמות שונים לשבר**ביתה ה':** הרחבה, הכרת השברים העשרוניים, משמעות הנקודה, משמעות המיקום והערך שמייצגות הספרות בשברים עשרוניים, הכרת המונחים – עשריות, מאיות, אלפיות, השבר העשרוני כשבר שמכנהו 10, 100, 1000 וכדומה, מעבר לשבר עשרוני לשבר פשוט**אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה**

א. קריית הערך של המספר על סמך הבנת הערך שכל ספרה מייצגת על-פי המבנה העשרוני, ועל סמך הבנת הערך הכמותי הכלול של המספר.

ב. כתיבת המספר כמספר פשוט.

שאלה 37

השלימו את המספר החסר.

$$2.34 + 1.20 = 3 + \underline{\hspace{1cm}}$$

תשובה :

$$2.34 + 1.20 = 3 + 0.54$$

ניקוד : 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשברים – מבנה המספר העשרוני, חיבור וחיסור מספרים עשרוניים

השאלה בודקת את **הכרת השיטה** לכתיבת מספרים על-פי המבנה העשרוני, ידיעת הערך של ספרה מייצגת בכתיב העשרוני של שברים ושימרה על שוויון. בפתרון השאלה נדרשת הבנת השקילות שבין שני האגפים בשוויון.

רמת חשיבות צפופה: חשיבה אלגוריתמית

רמת קושי צפופה: יתרנסם בהמשך

מופיע בתוכנית הלימודים

ביתה ה': עמודים 101–104 – שימושות השבר העשרוני, חיבור וחיסור שברים עשרוניים

הידע נדרש לפתרון השאלה

ביתות א'–ב': שיטת הכתיבה העשרונית, הבנת שימושות השוויון

ביתה ג': מבנה המספר העשרוני

ביתה ה': שברים עשרוניים, חיבור וחיסור שברים עשרוניים

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

א. השוואת סכום השלים בין שני האגפים וסכום החלקים השברים בין שני האגפים, והשלמת החסר כדי שיתקבל שוויון.

ב. חיבור המספרים באגף השמאלי: $2.34 + 1.20 = 3.54$, ולאחר מכן השלמת המספר החסר באגף הימני כדי שיתקבל שוויון בין האגפים. במקרה זה הפתרון יהיה מבוסס על הבנת השוויון ועל פתרון משווה המשתמך על הבנת הקשר שבין חיבור לחיסור, ולא יהיה מבוסס על החשווה בין המרכיבים השונים של כל תרגיל תוך כדי שימירה על השוויון שבין שני האגפים.

לדוגמה :

7.040

$$5.03 \cancel{+} 2.01 \cancel{=} 4.03 \cancel{+} 3.00$$

3.54

$$2.34 + 1.20 \cancel{=} 3 + 0.54$$

דוגמאות לשגיאות או לקשישים העשויים להופיע

- א. קושי הנובע מאי-דיעה איך לכתוב מספר קטן מ- 1 בכתב עשרוני.
- ב. קושי הנובע מאי-הבנת משמעות השווין. במקרה זה עשוי/li היכתב במקום הריק הסכום של המספרים 2.34 ו- 1.20 או הסכום של המספרים 2.34 ו- 1.20 - 3.
- ג. קושי בהשוואת המרכיבים של התרגילים תוך כדי שמירה על השוויון. במקרה זה יש להניח שתתקבל תשובה נכונה על סמך פתרון האגף השמאלי והשלמת המספר החסר באגף ימני באמצעות מציאת המספר החסר במשוואת החיבור (ראו דוגמה לעיל).

בשעת הבדיקה מומלץ לשיטם לב

لتלמידים שאינם מבינים את מהות השוויון שבין שני האגפים. מומלץ לתת לתלמידים אלה לתרגל משוואות שלמים שנדרשת בהן השווהה בין שני אגפי השוויון, ולבוחן את האסטרטגיית השבחן נוקטים התלמידים. הבנת משמעות השוויון מאפשרת השווהה בין חלקים מכל אגף וקיזוזו והוספה כדי לשמור על השוויון, כל זאת בלי להזדקק לפתרון של אחד האגפים. יש חשיבות רבה לתרגול נושאים אלה, שכן הם הבסיס להבנה אלגברית.

שאלה 38

א. ב- $\frac{1}{3}$ מִכְלָ-דָלָק שֶׁל מַכְנוּנִית יֵשׁ 15 לִיטְרִים שֶׁל דָלָק.

כדי לנסוע מאילת לירושלים במכונית צרייך $\frac{2}{3}$ מכמות הדלק שיש במקל-dalak מלא.

כמה ליטרים של דלק צרייך כדי לנסוע מאילת לירושלים?

תשובה: _____ ליטרים

ב. במקל-dalak מלא של משאית יש 60 ליטרים של דלק.

כדי לנסוע מירושלים לבית-שמש במשאית צרייך 10 ליטרים של דלק.

איזה חלק מכמות הדלק שיש במקל צרייך כדי לנסוע מירושלים לבית-שמש?

תשובה: _____

תשובות:

א. 30 ליטרים

ב. $\frac{10}{60}$ או כל ייצוג מספרי אחר של מספר זה.

ניקוד:

סעיף א': 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

סעיף ב': 2 נק' – תשובה נכונה

0 נק' – תשובה שגויה

剖析 השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשברים – משמעות השבר הפשוט, קשר בין שברי יחידה לשברים בעלי אותו מכנה שהחומר שלהם גדול מ-1, חלק ממוכנות

השאלה בודקת **פתרונות בעיות חד-שלביות** שנבדק בהן הקשר בין שבר יחידה לשבר אחר בעל אותו מכנה, והבנת השבר כחלק ממוכנות.

לפתרון הבעיה נדרשת הבנת משמעות ההסתremaה והבנה אינטואטיבית שליחס ישר.

רמת חשיבות צפופה: חסיבה תحلילית (יישום)

רמת קושי צפופה: يتפרנס מהמשך

מיפוי בתכנית הלימודים

כיתה ד': עמודים 76–78 – הכרת השבר הפрост, שמות שונים לשבר, שאלות מילוליות בשברים

כיתה ה': עמודים 98, 99 – שימושיות השבר הפрост

הידע הדורש לפתרון השאלה

כיתות א'–ב': הבנת שימושיות שונות של כפל ושל חילוק (חילוק להכללה), שאלות בכפל ובחילוק

כיתה ג': משמעות הכפל, שאלות התאמה בכפל, שברי יחידה, שימושות שברי היחידות כחלק ממשלים וכחילוק מכמות

כיתות ד'–ה': שימושיות שונות של שברים, שמות שונים לשבר, פתרון שאלות מילוליות בשברים

סטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

סעיף א'

א. מבוסס על ההבנה ש- $\frac{1}{3}$ גדול פי 2 מ- $\frac{2}{3}$, ועל-כן, על-פי ההבנה האינטואיטיבית של יחס ישיר, יש להכפיל פי 2 את הכמות שהיא

ממל' הדלק.

לדוגמה :

תשובה: 30 ליטרים

הציגו את דרך החישוב:

$$16 \text{ ש. } 30 = 2 \times 16 \text{ ש. } 15 = \frac{1}{3} \times 2 \times 16 \text{ ש. } 60 = \boxed{32}$$

ב. חישוב הכמות שהיא השלם ולאחר מכן חישוב $\frac{2}{3}$ ממנה.

ג. חישוב הכמות שהיא השלם ולאחר מכן חישור $\frac{1}{3}$ ממנה, מתוך ההבנה ש- $\frac{1}{3}$ משלימים לשלם.

לדוגמה :

תשובה: 30 ליטרים

הציגו את דרך החישוב:

$$2 \times \frac{2}{3} \times 15 \text{ ש. } 45 = 15 \text{ ש. } 90 = 30 \text{ ש. }$$

ולא 30.

דוגמאות לשגיאות או לקשיים העשויים להופיע

קושי בהבחנה בין חלק לכמות. במקרה זה עשויה להופיע בסעיף א' התשובה: $\frac{2}{3}$ ליטר.

שאלה 39

תמר קראה $\frac{1}{3}$ ממספר העמודים בספר הקריאה שלה.

יעל קראה $\frac{1}{4}$ ממספר העמודים בספר הקריאה שלה.

כל אחת מהבנות קראה 20 עמודים.

האם ייתכן שבשני הספרים, של תמר ושל יעל, יש אותו מספר עמודים? נמקו.

תשובה:
לא.

ニימוקים אפשריים:

1. בספר של תמר יש 60 עמודים, ובספר של יעל יש 80 עמודים.

2. 20 עמודים בספר של תמר הם חלק גדול יותר מ- 20 עמודים בספר של יעל כי $\frac{1}{3}$ גדול מ- .

ניקוד: 2 נק' – נימוק נכון

0 נק' – נימוק שגוי או תשובה ללא נימוק

הערה: התשובה "לא" ללא נימוק תהחשב תשובה שגואה.

אפיון השאלה

נושא: מספרים ופעולות בשברים – משמעות השבר הפשטוט, מציאת השלים על-פי חילקו (שבר יחידה)

השאלה בודקת פתרון בעיה חד-שלבית שנבדקת בה מיומנות השוואת שלמים בהינתן גודל החלק. בפתרון השאלה נדרש יכולת הנמקה.

רמת חשיבות צפוייה: חיפוש פתווח

רמת קושי צפוייה: יתרפרנס בהמשך

מופיע בתכנית הלימודים

ביתה ג': עמודים 67, 68 – שבר יסודי

ביתה ד': עמודים 76–78 – שאלות מילוליות בשברים

ביתה ה': עמוד 99 – השוואת שברים

הידע הדרוש לפתרון השאלה

ביתות א'-ב': הבנת משמעויות שונות של כפל ושל חילוק (חילוק להכלה), שאלות בכפל ובחילוק, משמעות החצי והרביע

ביתה ג': משמעות הכפל, כפל עשרות שלמות במספר חד-ספרתי, שברי יחידה, משמעות שברי היחידה כחלק שלם וכחלק מכמות וחישוב השלם בהינתן החלק (שבר יחידה)

ביתות ד'-ה': משמעויות שונות של שברים, שמות שונים לשבר, פתרון שאלות מילוליות בשברים, השוואת שברי יחידה

אסטרטגיות צפויות לפתרון השאלה

- א. חישוב מספר העמודים בכל אחד מהספרים: בספר של תמר יש $20 \times 3 = 60$ עמודים, ובספר של יעל יש $80 = 4 \times 20$ עמודים.
- ב. הבנה שאם $\frac{1}{3}$ מספר אחד הוא 20 עמודים ובספר الآخر 20 עמודים הם $\frac{1}{4}$ מהספר, ואם $\frac{1}{4}$ מהספר של יעל יש $\frac{1}{3}$ מספר אחד יותר.
- ג. ייצוג החלק (שהוא 20 עמודים) בכל אחד מהמקורים בעזרת סרטו. במקרה הראשון יש "לשבפל" את החלק המיצג 20 עמודים 3 פעמים כדי להשלים לשלים, ובקרה השני יש לשכפל חלק זה 4 פעמים לשם כך. לכן במקרה שבו יש "לשבפל" את החלק 4 פעמים השלם גדול יותר.

דוגמאות לשגיאות או לבעיות העשויים להופיע

קושי הנובע Mai-יכולת להבין שגודל כל אחד מהশלמיים שונה, וכך השבר הגדל יותר מימי'ן יחסית חלק גדול יותר מהשלם לעומת השבר השני. וכך השם במקרה זה יהיה קטן יותר.

סעיף א'

- א. בחירה שגויה בمسئלה הראשון (בספר של מיליל יש יותר עמודים) בשל ההשוואה בין השברים: $\frac{1}{3} > \frac{1}{4}$. בחירה זו מצביעה על הבנה של יחס גודל בין השברים, אבל מעידה על אי-הבנה כיצד גודל החלק משפיע באופן יחסית על השם.
- ב. בחירה שגויה בمسئלה השלישי (בשני הספרים יש אותו מספר עמודים) יכולה לנבוע מהבנה שגויה שמספר העמודים שקרה כל אחת הבנות הוא השם. טעות זו עשויה לנבוע מחוסר הבנה בסיסית של השבר כמייצג חלק ממשם כלשהו.

סעיף ב'

נוסף על הקשיים שהוצעו לעיל – קושי בהנמקה. במקרה זה יכולים להופיע נימוקים מסוימים שונים:

- נימוק הכלול עובדות הנתונות בשאלת, ללא התייחסות לסיבה לבחירת המשנה בסעיף א'.

לדוגמה:

- נימוק הכלול את המשנה הסופית, ללא התייחסות לסיבה מדוע זו המשנה.

לדוגמה:

דוגמאות לשגיאות או לקשיים העשויים להופיע (המשך)

• קושי בביתי מלא של הרעיון.

בדוגמה הבאה ניתן לראות שהתלמיד הבין את הרעיון שם השבר הקטן יותר מייצג אותו חלק שמייצג השבר הגדל יותר, הרי הנקודות השלמה תהיה גדולה יותר ב מקרה של השבר הקטן, כי יש יותר חלקים ככל הנטה השלמה לעומת המקרה השני. ואולם הוא ניסח את הרעיון באופן שגוי בכך שטען ש- $\frac{1}{3}$ גדול מ- $\frac{1}{4}$ ולא הסביר את הקשר ל- 20 העמודים, שהם החלק קבוע מתוך שתי הנקודות השלמה, השונות זו מזו.

נקנו את בחרוננט.

$$\frac{1}{3} \cdot N = 62 \quad \text{ו-} \quad \frac{1}{4} \cdot N = 75$$

$$N = 180$$

בדוגמה הבאה מופיע נימוק שבו נתונות הנקודות שהיא $\frac{1}{4}$ מהשלם במקרה הראשון והנקודות שהיא $\frac{1}{3}$ מהשלם במקרה השני, אך לא מוצג הקשר בין מספר החלקים בכל אחד מהשלמים.

מיון השאלות למקבצים

א. שאלות שנדרשת בהן הבנת המבנה העשוני: פוזיציה, עקרון ההמרה והפריטה וייצוג מספר בהרכבים שונים

מספר השאלה	פירוט הנושא או המיומנות
1א	חיבור: פוזיציה, המרה, אומדן סדר גודל התוצאה.
1ב	חלוקת מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי: ייצוג מספר בהרכבים שונים, ערך כמותי שמייצגת כל ספרה במספר.
2	שאלת כפל במספרים שהם מאות שלמות ועשרות שלמות: ייצוג מספר בהרכבים של מאות ושל עשרות.
5	שאלה מילולית דו-שלבית במספרים עשרוניים: פוזיציה, ערך כמותי שמייצגת ספרה בשבר עשרוני והמרה בשלמים.
10א	יחסור: פריטה, ערך כמותי שמייצגת ספרה במספר, ייצוג מספר בהרכבים שונים.
10ב	כפל מספר תלת-ספרתי במספר חד-ספרתי: המרה, פוזיציה, ערך כמותי שמייצגת ספרה במספר, ייצוג מספר בהרכבים שונים.
10ג	כפל מספר דו-ספרתי במספר דו-ספרתי: המרה, פוזיציה, ערך כמותי שמייצגת ספרה במספר, ייצוג מספר בהרכבים שונים.
35	יחסור שבר עשרוני משלם: פוזיציה, הערך הכמותי שמייצגת ספרה במספר, פריטה והמרה.
36	ערך הכמותי שמייצג מספר עשרוני: הערך הכמותי שמייצגת ספרה במספר.

ב. הבנת כללי הקבוצה שונים (נוסף על שאלות שהן מופיעות פעולות בשלמים, ובן נדרשת הקבוצה על-פי המבנה העשוני)

מספר השאלה	פירוט הנושא או המיומנות
4	יחסור שבר משלם: המרת שלם בישיותו.
9	יחס בין קילומטר למטרים: המרת קילומטר למטרים.
20	יחס בין מידות משקל: המרת קילוגרם בגרם.
28א	חיבור שברים: המרת שברים בשלם.
28ב	חיבור מספרים מעורבים: המרה ופריטה של מספרים מעורבים לשברים שהמינה שלהם 9, ולהפוך – המרת השברים בשלמים.

ג. שאלות שנדרשת בהן הבנת שימושיות שונות של כפל וחילוק

מספר השאלה	פירוט הנושא או המיומנות
1ב	חלוקת מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי (כדי להבין את המשמעות קל לתת לתרגיל את המשמעות של חילוק לחלקים).
2	שאלה מילולית: כפל.
3	שאלה מילולית של מציאת חלק מכמות: המשמעות של מציאת רביע מכמות היא חילוק ב- 4.
10ב	תרגיל כפל במספר תלת-ספרתי במספר חד-ספרתי: אלגוריתם מסורתית או פתרון בדרך אחרת הנשענת על חוק הפילוג, עובדות כפל, אומדן סדר גודל התוצאה.
10ג	תרגיל כפל במספר דו-ספרתי במספר דו-ספרתי: אלגוריתם מסורתית או פתרון בדרך אחרת

מספר השאלה	פירוט הנושא או המימוננות
	הנשענת על חוק הפלוג, עובדות כפלי, אומדן סדר גודל התוצאה.
11	משוואת חילוק : ניתנת לפתרון על-ידי שימוש בהפיקות בין כפל לחילוק או במשמעות של חילוק להכלה.
12	משוואה שיש בה שתי פעולות : כפל וחיסור.
13	מציאת גורמים ראשוניים של מספר : פירוק מספר לגורמים באסטרטגיות שונות – מבנה כפלי של מספר וחילוק.
14	שאלה מילולית דו-שלבית שיש בה מצב כפלי.
15	שאלה מילולית דו-שלבית שיש לבצע בה חילוק.
16	שאלה מילולית חד-שלבית (שני עיעיפים) : כפל במובן של התאמת/יחס ישיר (חשיבות פרופורציונית).
17	שאלת חקר על כפולות : היבטים שונים של כפולות – אומדן גודל, כפל בעשרות ובסאות, שארית או הבנת הכפל כ"פעמים", פירוק כפולות וזוגיות של כפולות.
18	שאלה שיש לבדוק בה כדיות של קנייה : היבטים שונים של כפל, של חילוק ושל יחס ישיר.
19	שאלה מילולית בנושא מוצר – במחלך הפתרון יש לבצע חילוק.
20	שאלה מילולית חד-שלבית שיש בה שימוש במושג "פי" והבנת הכללה של כמהות בכמהות.
23	שאלה בגאומטריה בנושא היקפים : בחישובים יש לבצע חילוק ב- 4 .
24	שאלה בגאומטריה בנושא שטחים : בחישובים יש לבצע פעולה כפלי.
א 25	שאלה בגאומטריה : חישוב נפח – את הנפח ניתן למצוא במנייה או בעזרת מכפלות.
ב 25	שאלה בגאומטריה : חישוב שטח – את השטח ניתן למצוא במנייה או בעזרת מכפלות.
ג 25	שאלה בגאומטריה : חישוב שטח פנים – את שטח הפנים ניתן למצוא במנייה או בעזרת מכפלות.
ג 28	תרגיל חישור בשברים בעלי מכנים זרים : לצורך הבאת השברים למכנה משותף יש להשתמש בפעולות הכפל (בהרחבה).
29	משוואת כפל בשברים : בדיקת משמעות ההכלה של רבע בשלם.
30	שאלת השוואת כפלית בשברים : עסקת בהכלת שליש בשלושה שלמים.
31	משוואות חיבור בשברים : דרישות מינימוניות כפלית לצורך הרחבה.
33	שאלה מילולית בשברים : חלוקה לחלקים שווים של שבר.
א 38	שאלה מילולית בשברים : הבנת הכפל ב- 2 במובן של שאלת התאמת (יחס ישיר).

ד. שאלות שנייתן לבצע בהן את החישוב במהירות וביעילות תוך כדי שימוש בתוכנה חשבונית או בידע אוטומטי של עבודות

מספר השאלה	פירוט הנושא או המינונות
1ב	תרגיל חילוק מספר דו-ספרתי במספר חד-ספרתי שנייתן לחשב בעל-פה.
2	שאלה מילולית של כפל: ניתן לחשב את המכפלה בעזרת ידע של עבודות הכפל ו"הוספה" אפסים.
3	שאלה מילולית של מציאת חלק מסוים: מבוססת על חישוב בעל-פה של חילוק 80 ב- 4.
4	תרגיל חיסור שבר מסוים: ניתן לפתור בעל-פה על בסיס הבנת הרכיב של המספר 1.
9	שאלה הבודקת את היחס בין קילומטר למטר: מבוסס על ידע של עבודות.
10א	תרגיל חיסור מספר ארבע-ספרתי במספר ארבע-ספרתי: ניתן לחשב באמצעות תוכנת ההפרש או ערך הפיצוי, במהירות ובעל-פה.
10ב	כפל מספר חד-ספרתי במספר תלת-ספרתי: ניתן לחשב במהירות ובעל-פה על-ידי שימוש בחוק הפילוג והבנת משמעות הכפל כ"פעמים".
11	משוואת חילוק: ניתן לפתור בעל-פה על-ידי הבנת משמעות החילוק להכלה.
12	משוואה: ניתן לחשב במהירות ובעל-פה על-ידי הבנת תוכנת החיסור: a-a.
15	שאלה מילולית דו-שלבית: ניתן לחשב בעל-פה על בסיס ידע של עבודות בנוגע למספרים קטנים.
17	שאלת חקר בנושא כפולות: כל סעיפי השאלה ניתנים לפתורן ללא חישובים, אלא על בסיס תובנה.
23	שאלה בגאומטריה העוסקת בחישוב היקפים: ניתן לחשב בעל-פה על בסיס ידע של עבודות בנוגע למספרים קטנים.
25	שאלה בגאומטריה העוסקת בחישובי נפח, בשטח ובשטח פנים: ניתנו לחשב בעל-פה על בסיס ידע של עבודות בנוגע למספרים קטנים.
28א	תרגיל חיבור שברים שנייתן לחשב אותו במהירות על בסיס ידע אוטומטי של ייצוג שלם כמספר.
28ב	תרגיל חיבור מספרים מעורבים שנייתן לחשב בעל-פה על בסיס ידע אוטומטי של עבודות.
29	משוואת כפל בשברים: ניתנת לפתורן על בסיס הבנת מהות השבר.
30	שאלת השוואת כפלית בשברים: ניתנת לפתורן על בסיס הבנת מהות השבר.
32	שאלה העוסקת בהשוואת שברים: ניתנת לענות באמצעות שימוש בנקודות אחיזה להשוואה.
33	שאלה מילולית בשברים: ניתנת לפתורן על בסיס הבנת מהות השבר.
34	שאלה מילולית בשברים: ניתנת לפתורן על בסיס הבנת מהות השבר.
35	תרגיל חיסור שבר עשרוני מסוים: ניתן לפתורן על בסיס הבנת מהות השבר העשרוני.
36	ביטוי שבר עשרוני כמספר פשוט: ניתן לפתורן על בסיס הבנה וידע של מהות השבר העשרוני.
37	משוואת חיבור בשברים עשרוניים: ניתנת לפתורן על-ידי השוואת מרכיבים בשווין.
38	שאלה מילולית בשברים: ניתן לחשב בעל-פה על בסיס ידע אוטומטי של עבודות.

ערה: חשוב לזכור שבחירה האסטרטגיה לפתרון תליה גם בהעדפה אישית, וכן חשוב לדודן באפשרויות השונות לפתרון

וביתרונות ובחסרונות של כל אסטרטגיה, אולם יש להשאיר את הבחירה לתלמיד. עצם החשיבות והפעלת שיקול הדעת

בחירת האסטרטגיה הן התוכנה החשבונית המוצופה מהתלמיד.

ה. שאלות מילוליות (סיטואציות הדורשות תרגום של התרחשות למודל מתמטי כלשהו)
 (יש לשים לב שלא כל שאלה "עתירת מלל" היא שאלה מילולית)

מספר השאלה	פירוט הנושא או המונמות
2	תרגום הסיטואציה לפעולות כפל.
3	תרגום הסיטואציה לפעולות חילוק ב- 4.
5	תרגום הסיטואציה לפעולות כפל ב- 2 וחיבור או לפעולות חיבור וחיבור.
14	תרגום הסיטואציה לתהליך דו-שלבי שיש בו כפל וחיסור.
15	תרגום הסיטואציות לתהליך דו-שלבי שיש בו חילוק ו/או כפל וחיסור.
16	תרגום הסיטואציה לפעולות כפל וחילוק.
18	תרגום הסיטואציה לפעולות כפל וחילוק שיאפשרו השוואת בין התוצאות שיתקבלו.
19	תרגום הסיטואציה לחישוב ממוצע.
20	תרגום הסיטואציה להשווה כפליית לאחר המרת יחידות.
33	תרגום הסיטואציה לייצוג החלקים באמצעות שברים.
34	תרגום הסיטואציה לשאלת הכללה של שבר בשלים.
38	תרגום הסיטואציה בשלב אי' לפעולות חיבור או כפל (מצב התאמה), ובשלב ב' לייצוג החלק שהתקבל.
39	תרגום הסיטואציה לייצוג השלמים על-פי החלקים הנתוניים.

ו. שאלות שנדרישות בהן קריית נתוניים או הצגתם בייצוגים שונים שאינם מספריים

מספר השאלה	פירוט הנושא או המונמות
6	זיהוי נתונים מסרטוט.
7	זיהוי נתונים מסרטוט וסרטוט צורות גאומטריות.
8	זיהוי נתונים מסרטוט.
21	זיהוי נתונים מסרטוט.
22	זיהוי נתונים מסרטוט, חישוב על בסיס נתונים אלה וסרטוט צורות גאומטריות.
23	זיהוי נתונים מסרטוט וחישוב על בסיס נתונים אלה.
24	זיהוי נתונים מסרטוט וחישוב על בסיס נתונים אלה.
25	זיהוי נתונים מסרטוט וחישוב על בסיס נתונים אלה.
26	זיהוי נתונים מסרטוט וסרטוט צורות גאומטריות.
27	ייצוג מספריים על ישר-המספרים.

ג. שאלות שנדרשת בהן שליטה באלגוריתמים מסווגים שונים
(חלק מהשאלות ניתן לפטור באסטרטגיות שאינן אלגוריתמיות)

מספר השאלה	פירוט הנושא או המומנות
1א	אלגוריתם לחבר מספרים שלמים.
1ב	אלגוריתם לחילוק מספרים שלמים.
2	אלגוריתם לכפל מספרים שהם עשרות ומאות שלמות.
5	אלגוריתם לחבר מספרים עשרוניים.
10א	אלגוריתם לחבר מספרים שלמים.
10ב	אלגוריתם לכפל מספר חד-ספרתי במספר רב-ספרתי.
10ג	אלגוריתם לכפל מספר דו-ספרתי במספר דו-ספרתי.
13	אלגוריתם לפירוק מספר לגורמים ראשוניים.
19	אלגוריתם לחישוב ממוצע.
23	אלגוריתם לחישוב היקף.
24	אלגוריתמים לחישוב שטח של מלבן ושל משולש.
25	אלגוריתם לחישוב נפח, שטח ושטח פנים.
22ב	אלגוריתם לחבר מספרים מעורבים בעלי אותו מכנה.
22ג	אלגוריתם לחישור שברים בעלי מכנים זרים זה לזה.
31	אלגוריתם להרחבה ולמציאת מכנה משותף.

ח. שאלות שנדרשות בהן ראייה חזותית ויכולת דימוי מושג בгиומטריה

מספר השאלה	פירוט המושג או המומנות
6	זיהוי אלכסונים ברטוטו.
7	סרטוט קו מאונך לקו נתון.
8	הדמיית מלבן ו/או התנסות ברטוט מרובעים ובחירת מלבן מבין הרטוטים.
21	דימוי צורה בתוך צורה.
22	דימוי טרנספורמציה של צורות לצורך חישוב שטח של צורה וסרטוט מלבן על-פי שטחו.
24	פירוק והרכבה של צורה.
25	דימוי חלקים בלתי נראים בגוף תלת-ממדי.
26	דימוי מקבילות ומשולשים ישרא-חזותית וסרטוט.

ט. שאלות שנדרשים בהן תיאור דרך הפתרון או נימוק

מספר השאלה	פירוט הנושא
17-ד	כפלות ותכונותיהן.
18	כדיות של קנייה (כפל וחילוק).
24	חישוב שטח של צורה מורכבת.
39	השוואת שלמים בהינתן החלקים והכמויות החלקיות.

28/08/11, 09:40



1085

חברות הנחיות 1085 – מיצ"ב פנימי במתמטיקה לכיתה ה', התשע"א