

מדינת ישראל
משרד החינוך

מועד קיץ
מועד صيف

دولة إسرائيل
وزارة التربية والتعليم

סוג הבחינה: בגרות
מועד הבחינה: קיץ תשפ"א, 2021
מספר השאלון: 037381

نوع الامتحان: بچروت
موعد الامتحان: صيف 2021
رقم النموذج: 037381

- נספחים: 1. הטבלה המחזורית
2. טבלת אלקטרושליליות
3. נוסחאות לחישובים
4. קבוצות פונקציונליות
- תרגום לערבית (2)

- מلاحץ: 1. الترتيب الدوري
2. جدول السالبية الكهربية
3. قوانين للحسابات
4. مجموعات وظيفية
- ترجمة إلى العربية (2)

انتبه: في هذا الامتحان توجد تعليمات خاصة.
يجب الإجابة عن الأسئلة حسب التعليمات.

כימיה

الكيمياء

הוראות לנבחן

تعليمات للممتحن

א. משך הבחינה: שלוש שעות.

א. מֵדֵה הַאִמְתָּחַן: שלוש שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:

ב. מִבְנֵי הַנְּמוּדָג וְתוֹזִיעַ הַדְּרָגָת:

בשאלון זה שני פרקים.

في هذا النموذج فصلان.

פרק ראשון — 40 נק'

الفصل الأول — 40 درجة

פרק שני — 60 נק'

الفصل الثاني — 60 درجة

סה"כ — 100 נק'

المجموع — 100 درجة

ג. חומר עזר מותר בשימוש:

ג. מוֹאֵד מְסַעֵדָה יֻסְמַח אִסְתִּמְעָלָהּ:

1. מחשבון (כולל מחשבון גרפי).

1. حاسبة (بما في ذلك الحاسبة البيانية).

2. דפי נוסחאות ונתונים (מצורפים).

2. ملحق قوانين ومعطيات (مرفق).

ד. הוראות מיוחדות:

ד. תִּעֲלִימָתַי כַּסֵּת:

1. בפרק הראשון יש תשע שאלות.

1. في الفصل الأول يوجد تسعة أسئلة.

בכל אחת מן השאלות 1-8 מוצגות ארבע

في كلّ واحد من الأسئلة 1-8 معروضة أربع

תשובות, ומהן עליך לבחור בתשובה הנכונה.

إجابات، عليك أن تختار الإجابة الصحيحة.

את התשובות הנכונות עליך לסמן

عليك الإشارة إلى الإجابات الصحيحة في

בתשובון שבסוף מחברת הבחינה

ورقة الإجابات التي في آخر دفتر الامتحان

(עמוד 19).

(صفحة 19).

בשאלה 9 יש לענות על הסעיפים

في السؤال 9 عليك الإجابة عن البنود

לפי ההנחיות.

حسب التعليمات.

2. בפרק השני יש חמש שאלות.

2. في الفصل الثاني يوجد خمسة أسئلة.

עליך לענות על שלוש מהן לפי ההנחיות

عليك الإجابة عن ثلاثة منها حسب

בכל שאלה.

التعليمات في كلّ سؤال.

اكتب في دفتر الامتحان فقط. اكتب "مسودة" في بداية كلّ صفحة تستعملها مسودة.

كتابة أية مسودة على أوراق خارج دفتر الامتحان قد تسبب إلغاء الامتحان.

التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة المذكر وموجهة للممتحنات وللممتحنين على حد سواء.

نتمنى لك النجاح!

בהצלחה!

الأسئلة

الفصل الأول (40 درجة)

أجب عن جميع الأسئلة 1-8.

إذا أُجِبَتْ صحيحًا عن ستّة أسئلة على الأقلّ، فإنّك ستحصل على الـ 20 درجة بأكملها (لكلّ سؤال – $3\frac{1}{3}$ درجات).
قبل أن تجيب، اقرأ جميع الإجابات المقترحة.

لكلّ سؤال مقترحة أربع إجابات. اختر الإجابة الصحيحة.

- * أشر إلى الإجابة التي اخترتها في ورقة الإجابات التي في الغلاف الداخلي في آخر دفتر الامتحان (صفحة 19).
- * في كلّ سؤال، أشر بقلم حبر بـ X في المربع الذي تحت الحرف (أ-د) الذي يدلّ على الإجابة التي اخترتها.
- * في كلّ سؤال يجب الإشارة بـ X واحد فقط.
- * لمحو إشارة يجب ملء كلّ المربع على النحو التالي: ■.
- * يُمنع المحو بالتيكس.
- * انتبه: يُحذّر الامتناع قدر الإمكان عن المحو في ورقة الإجابات، لذلك يوصى أولاً بالإشارة إلى الإجابات الصحيحة في نموذج الامتحان نفسه، وبعد ذلك فقط الإشارة إليها في ورقة الإجابات.

1. ما هو تنظّم الإلكترونات للأيون $^{2+}_{12}\text{Mg}$ ؟

أ. 2، 8

ب. 2، 6

ج. 2، 8، 2

د. 2، 8، 4

2. نرمز إلى عنصر بالرمز الاعتياديّ A .

عدد كتلة إحدى ذرات العنصر A هو 87 .

عدد النيوترونات في هذه الذرة هو 49 .

ما هو الأيون الملائم لذرة العنصر A ؟

أ. A^{2+}

ب. A^{2-}

ج. A^{+}

د. A^{3+}

3. الجدول الذي أمامك يعرض معلومات عن المبنى الفراغي لأربعة جزيئات .

HCN	C ₂ F ₂	CH ₂ Cl ₂	CF ₄	الجزيء
خطّي	خطّي	رباعيّ السطوح	رباعيّ السطوح	المبنى الفراغيّ للجزيء

أمامك أربعة أزواج جزيئات . في أيّ زوج الجزيئات المعطيان هما قطبيّان؟

أ. HCN و C₂F₂

ب. HCN و CH₂Cl₂

ج. CF₄ و C₂F₂

د. CF₄ و CH₂Cl₂

4. الحرفان X و Y هما رمزان اعتباطيّان يمثّلان عنصريّن موجودين في السطر الثاني (الدورة الثانية)

أو في السطر الثالث في الترتيب الدوريّ .

العنصر X موجود في العمود 1 (المجموعة 1) في الترتيب الدوريّ .

العنصر Y موجود في العمود 6 (المجموعة 6) في الترتيب الدوريّ .

في التفاعل بين العنصرين X و Y نتج مركّب يذوب في الماء .

من بين الأقوال "أ-د"، ما هو القول الصحيح بالنسبة لهذا المركّب؟




أ. حالة المادّة للمركّب في درجة حرارة الغرفة هي غاز .

ب. صيغة المركّب هي XY_{2(s)} .

ج. المحلول المائيّ للمركّب موصل للكهرباء .

د. في درجة حرارة الغرفة، المركّب مركّب من جزيئات صيغتها الجزيئية هي X₂Y .

5. أمامك جدول فيه معطيات عن ثلاث مواد.

اسم المادة	حالة المادة في درجة حرارة الغرفة	التمثيل الكامل للصيغة البنائية للجزيء
2 - پروپانول	سائلة	
أستون	سائلة	
أوكتان	سائلة	

أمامك أربعة أقوال IV-I تصف ظواهر. جميع الأقوال صحيحة.

I. درجة حرارة غليان 2 - پروپانول أعلى من درجة حرارة غليان الأستون.

II. درجة حرارة غليان الأوكتان أعلى من درجة حرارة غليان 2 - پروپانول.

III. 2 - پروپانول يذوب في الأوكتان.

IV. الأستون يذوب في الماء.

أيّ قولين من الأقوال يصفان ظواهر يمكن تفسيرها بواسطة التأثيرات المتبادلة فان در فالس فقط؟

أ. القولان I و III .

ب. القولان II و III .

ج. القولان I و IV .

د. القولان II و IV .

6. الأقال "أ-د" تصف عيّنات مختلفة لموادّ.

أيّة عيّنة من العينات الموصوفة تحوي أكبر عدد كليّ للذرات؟

أ. 2.56 غرام كبريت، $S_{8(s)}$.

ب. 0.2 مول جزيئات ثاني أكسيد الكربون، $CO_{2(g)}$.

ج. 1.6 غرام ميثان، $CH_{4(g)}$.

د. 0.1 مول جزيئات هكسان، $C_6H_{14(l)}$.

7. في أربع تجارب منفردة، أضافوا محلول $NaOH_{(aq)}$ بتركيز 0.1M إلى أربعة محاليل لحوامض مختلفة.

إلى أيّ محلول من المحاليل "أ-د" يجب إضافة أكبر حجم من محلول $NaOH_{(aq)}$ كي نصل إلى معايرة كاملة لمحلول الحامض؟

أ. 10 ملل من محلول $HCl_{(aq)}$ بتركيز 0.1M.

ب. 10 ملل من محلول $HNO_{3(aq)}$ بتركيز 0.2M.

ج. 10 ملل من محلول $H_2SO_{4(aq)}$ بتركيز 0.2M.

د. 10 ملل من محلول $HBr_{(aq)}$ بتركيز 0.3M.

8. المركّبات "أ-د" تحوي ذرات كلور.

في أيّ مركّب تستطيع ذرات الكلور أن تمرّ بعملية اختزال فقط؟

أ. $HCl_{(g)}$

ب. $HClO_{(g)}$

ج. $HClO_{4(g)}$

د. $ClF_{(g)}$

تحليل قطعة من مقال علمي - إلزامي

9. اقرأ القطعة التي أمامك، وأجب عن البنود "أ - ح" التي تليها حسب التعليمات (سؤال إلزامي - 20 درجة).

مواد تنظيف منزلية: التنظيف واجب، والخلط ممنوع!

أدى انتشار جائحة الكورونا في العالم إلى ارتفاع في استعمال مواد التنظيف والتعقيم لمنع عيش الفيروس على الأسطح. توجد في السوق عدة أنواع لمنتجات التنظيف والتعقيم المعدة للاستعمال المنزلي:

إيكونوميكا - اسم تجاري للمحلول المائي لهيپوكلوريت الصوديوم، $\text{NaOCl}_{(aq)}$. يحوي هذا المحلول أيضاً $\text{HOCl}_{(aq)}$ الذي ينتج أثناء إذابة هيپوكلوريت الصوديوم الصلب في الماء.

محلول أمونيا - ينتج بواسطة إذابة غاز الأمونيا، $\text{NH}_3(g)$ ، في الماء. يُستعمل هذا المحلول عادةً لتنظيف الزجاج والخرف (الخرسينا) والنيروستا، ولإزالة الطبقات الدهنية في الأفران.

الصودا الكاوية - اسم تجاري لهيدروكسيد الصوديوم الصلب، $\text{NaOH}_{(s)}$. يُستعمل المحلول المائي لهيدروكسيد الصوديوم، من ضمن استعمالات أخرى، لإزالة الطبقات الدهنية في الأفران.

محلول حامض الكلوريدريك - ينتج من إذابة الغاز كلوريد الهيدروجين، $\text{HCl}_{(g)}$ ، في الماء. يُستعمل هذا المحلول لتنظيف الحمامات.


المحاليل التي تحوي كحول الإيثانول، $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(aq)}$ ، بتراكيز مختلفة تُستعمل لتنظيف الأسطح، خاصةً الأسطح الزجاجية. بعد تنظيف السطح، يتطاير الكحول بسرعة وبشكل متجانس بدون أن يُبقي علامات على السطح.

إذا استعملنا كل واحدة من هذه المواد على حدة وحسب التعليمات، فإنها يمكن أن تكون ناجعة (حتى وإن كانت هي نفسها سامة). لكن إذا خلطنا مواد التنظيف مع بعضها البعض، فستنتج مادة غير ناجعة، بل وأكثر من ذلك، يمكن أن يُسبب الخلط انطلاق مواد خطيرة.

مثال:

• خلط محلول الإيكونوميكا مع بخاخ لتنظيف الحمامات، يؤدي إلى تكوّن الغاز السامّ كلور، $\text{Cl}_2(g)$ ،

حسب التفاعل (1):



• خلط الإيكونوميكا مع محلول الأمونيا يمكن أن يؤدي إلى تكوّن كلور أمين، $\text{NH}_2\text{Cl}_{(g)}$ ، الذي يؤدي إلى إصابة العينين وجهاز التنفّس.

• خلط الإيكونوميكا مع الإيثانول يمكن أن يؤدي إلى تكوّن المادة السامة كلوروفورم، $\text{CHCl}_3(l)$.

• خلط البخاخ لتنظيف الحمامات مع الصودا الكاوية لا يؤدي إلى تكوّن مواد خطيرة، لكن تنطلق طاقة في هذا التفاعل. إذا تواجدت مواد سامة (من خلط مواد تنظيف أخرى) في الخليط الذي حدث فيه التفاعل، فإن الطاقة المنطلقة تؤدي إلى حركة متزايدة لجزيئات هذه المواد السامة وإلى انتشارها على شكل غاز في الهواء.

ما الذي يجب فعله إذا خلطنا خطأ مواد تنظيف مع بعضها البعض؟

يجب فوراً تخفيف الخليط بواسطة إضافة كمية كبيرة من الماء في درجة حرارة الغرفة، وتهوئة الغرفة، والخروج منها.

يُمنع محاولة معادلة الخليط بواسطة إضافة مواد أخرى.

أجب عن البنود "أ"، "ب"، "ج"، "د"، "ز"، "ح"، وعن أحد البندين "هـ" أو "و".

أ. في الإیکونومیکا التي يُنتجها أحد المنتجين في البلاد يوجد 30 غرام هيبوكلوريت الصوديوم، $\text{NaOCl}_{(s)}$ ، في 1 لتر من المحلول.


ما هو التركيز المولاري لهيبوكلوريت الصوديوم في محلول الإیکونومیکا؟ فصل حساباتك.

جميع مواد التعقيم المذكورة في القطعة التي قرأتها تذوب في الماء.

ب. اكتب معادلات عملیات الإذابة في الماء للأمونيا، $\text{NH}_3(g)$ ، ولهيدروكسيد الصوديوم، $\text{NaOH}_{(s)}$ ، ولكلوريد الهيدروجين، $\text{HCl}_{(g)}$.

ج. اذكر هل pH كل واحد من المحاليل التي تنتج في البند "ب" سيكون أصغر أم أكبر أم يساوي 7.

د. التفاعل الذي يحدث بين محلول الإیکونومیکا وبين البخاخ لتنظيف الحمامات، التفاعل (1)، هو تفاعل أكسدة – اختزال.



حدّد ما هو المؤكسد وما هو المختزل في التفاعل (1).

البند "هـ" هو بند اختياري. إذا اخترت الإجابة عنه، لا تُجب عن البند "و".

هـ. i. درجة حرارة غليان الإيثانول، $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(l)}$ ، هي 78°C ، بينما درجة حرارة غليان الأمونيا، $\text{NH}_3(l)$ ، هي 33°C -.

لماذا درجة حرارة غليان الإيثانول أعلى من درجة حرارة غليان الأمونيا؟ تطرّق في إجابتك إلى جميع أنواع القوى التي تعمل بين الجزيئات في كل واحد من المركّبين.

ii. كلوروفورم، $\text{CHCl}_3(l)$ ، يذوب جيّداً في الإيثانول.

اكتب معادلة عملیة إذابة الكلوروفورم في الإيثانول.

البند "و" هو بند اختياري. إذا اخترت الإجابة عنه، لا تُجب عن البند "هـ".

و. اعتمد على القطعة، وأجب عن البندين الفرعيين ii-i :

i. اكتب معادلة صافية للتفاعل الذي يحدث أثناء خلط البخاخ لتنظيف الحمامات مع محلول الصودا الكاوية.

ii. حدّد ما هي إشارة ΔH^0 التفاعل الذي كتبت معادلته في البند الفرعي i. علّل تحديّدك حسب القطعة.

ز. أمامك اقتباس من القطعة: "المحاليل التي تحوي كحول الإيثانول، $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}_{(aq)}$ ، بتركيزات مختلفة تُستعمل لتنظيف الأسطح، خاصّةً الأسطح الزجاجيّة. بعد تنظيف السطح، يتطاير الكحول بسرعة وبشكل متجانس بدون أن يَبقى علامات على السطح".

اكتب معادلة العملیة الموصوفة في الاقتباس الذي من القطعة.

ح. فسّر لماذا بعد خلط موادّ التنظيف خطأً، يجب تخفيف المحلول بالماء في درجة حرارة الغرفة وعدم تخفيفه بالماء الساخن.

الفصل الثاني (60 درجة)



أجب عن ثلاثة من الأسئلة 10-14، حسب التعليمات في كل سؤال (لكل سؤال – 20 درجة).

כימיה الغذاء

10. أجب عن البنود "أ"، "ب"، "ج"، "د"، "و"، "ز"، وعن أحد البندين "هـ" أو "ح".

زيت الهوهوبا يُنتج من بذور نبتة الهوهوبا ويُستعمل أساساً لتحضير منتجات التجميل. زيت الهوهوبا لا يحوي تريغليسيريدات. الأحماض الدهنية في زيت الهوهوبا تظهر في مبنى خاص، كما هو موصوف في التمثيل المختصر للصيغة البنائية للجزيء (1).

أمامك تمثيل مختصر للصيغتين البنائيتين لجزيئين موجودين في زيوت مختلفة:



أ. اكتب المجموعات الوظيفية في كل واحد من الجزيئين (1) و (2).

تركيب الزيت في بذرة الهوهوبا تتعلق بمنطقة تنميتها. الجدول الذي أمامك يعرض الأحماض الدهنية الأساسية التي تُركب زيت الهوهوبا الذي يُنتج من بذور الهوهوبا من منطقة معينة في المكسيك.

النسبة المئوية من مجمّل الأحماض الدهنية	كتابة مختصرة للحامض الدهني	الحامض الدهني
8.1%	C16:0	حامض البالاميتيك
19.7%	C18: 1ω9cis	حامض الأوليك
60.6%	C20: 1ω9cis	حامض الجوندويك
10.1%	C22: 1ω9cis	حامض الإيروسيك
1.5%		أحماض دهنية أخرى

ب. اكتب تمثيلاً مختصراً للصيغة البنائية لجزيء حامض الجوندويك وتمثيلاً مختصراً للصيغة البنائية لجزيء حامض البالاميتيك.

جـ. كم مول من حامض الجوندويك، $C_{19}H_{37}COOH(l)$ ، يمكن إنتاجها من 100 غرام من أحماض دهنية في زيت الهوهوبا؟ استعن بمعطيات الجدول.

زيت هوهوبا من نوع آخر يحوي حامض الإليديك. حامض الإليديك هو حامض دهني أوميغا 9 وهو إيزومير لحامض الأوليك.


د. اكتب تمثيلاً مختصراً للصيغة البنائية لجزيء حامض الإليديك.

البند "هـ" هو بند اختياري. إذا اخترت الإجابة عنه، لا تُجيب عن البند "ح".

هـ. درجة حرارة انصهار حامض الإليديك أعلى من درجة حرارة انصهار حامض الأوليك. فسّر لماذا.

الزيت الذي يُنتج من بذور نبتة الهوهوبا التي تنمو في النقب، يحوي نسبة مئوية أعلى من الأحماض الدهنية المشبعة. أحدها هو حامض الأراكيدونيك.

معطى تمثيل مختصر للصيغة البنائية لحامض الأراكيدونيك:



و. اكتب كتابة مختصرة لحامض الأراكيدونيك.

ز. يمكن الحصول على حامض الأراكيدونيك من أحد الأحماض المعروضة في الجدول في عملية هدرجة.

حدّد أيّ حامض يلائم الحصول على حامض الأراكيدونيك. فسّر تحديده.

البند "حـ" هو بند اختياري. إذا اخترت الإجابة عنه، لا تُجيب عن البند "هـ".

حـ. إحدى طرق إنتاج زيت الهوهوبا هي إضافة هكسان، $C_6H_{14}(l)$ ، إلى بذور مكسّرة ومن ثمّ هزّها.

زيت الهوهوبا يذوب جيّداً في الهكسان، $C_6H_{14}(l)$. فسّر لماذا.



11. أجب عن البنود "أ"، "ج"، "هـ"، وعن أحد البندين "ب" أو "د".

الخلّ هو سائل منزليّ شائع، نجده في كلّ مطبخ.


هذا السائل ذو الرائحة الخاصّة، لا يُستعمل فقط لتحضير الصلصات بل ولتنظيف أيضًا.

الخلّ هو محلول لحامض الأسيتيك، $\text{CH}_3\text{COOH}_{(l)}$ ، في الماء.

أ. على زجاجة خلّ منزليّ مسجّل "خلّ 5%" — أي في 100 ملل محلول يوجد 5 غرام من حامض الأسيتيك.

i. احسب التركيز المولاريّ لحامض الأسيتيك في زجاجة الخلّ. فصّل حساباتك.

حامض الأسيتيك يتفاعل مع الماء حسب التفاعل (1):



ii. حدّد هل pH محلول الخلّ هو أصغر من 7 أم أكبر من 7 أم يساوي 7. علّل تحديّدك.

البند "ب" هو بند اختياريّ. إذا اخترت الإجابة عنه، لا تُجب عن البند "د".

ب. كي يكون استعمال الخلّ المنزليّ آمنًا للتنظيف، يوصى بتخفيفه في الماء: يُضيفون 400 ملل من الماء

(حوالي كأسين) إلى 100 ملل من الخلّ (نصف كأس تقريبًا).

i. احسب التركيز المولاريّ لحامض الأسيتيك في محلول الخلّ الذي ينتج بعد التخفيف.


فصّل حساباتك.

ii. حدّد هل pH محلول الخلّ بعد التخفيف سيكون أعلى أم أقلّ أم مساويًا لـ pH محلول الخلّ


قبل التخفيف. فسّر تحديّدك.

עندما تكون حالة المادة لحمض الأسيتيك غازية، جزء من جزيئات حامض الأسيتيك تُكوّن مزدوجات (ثنائيات / ديمرات). في كلّ مزدوج أربطة هيدروجينية تربط بين الجزيئات الفردية. ج. حدّد في أيّ رسم توضيحيّ من الرسوم التوضيحية (1)-(3) التي أمامك، الأربطة الهيدروجينية التي تتكوّن في المزدوج بين جزيئات حامض الأسيتيك موصوفة بشكل صحيح. علّل تحديدك.


الرسم التوضيحي (1)



الرسم التوضيحي (2)




الرسم التوضيحي (3)



البند "د" هو بند اختياري. إذا اخترت الإجابة عنه، لا تُجب عن البند "ب".

د. من المعتاد استعمال الخل المنزلي لإزالة الكلس الذي يتجمّع في إبريق التسخين الكهربائي. معطى التفاعل (2) الذي يحدث بين حامض وبين كربونات الكالسيوم، $\text{CaCO}_3(\text{s})$ ، الذي هو المركّب الأساسي في الكلس:



نفس هذا التفاعل يحدث عندما ينقطون محلول $\text{HCl}(\text{aq})$ على صخور تحوي حجر الجير $\text{CaCO}_3(\text{aq})$. بهذه الطريقة يشخّصون وجود حجر الجير في الصخور.

i. إلى محلول $\text{HCl}(\text{aq})$ حجمه 10 ملل وتركيزه 0.5M أضافوا $\text{CaCO}_3(\text{s})$. جميع المواد المتفاعلة تفاعلت بالكامل حسب التفاعل (2).

احسب ما هي كتلة كربونات الكالسيوم التي تفاعلت في هذا التفاعل. فصل حساباتك.

ii. حدّد هل pH محلول $\text{HCl}(\text{aq})$ خلال حدوث التفاعل (2) ينخفض أم يرتفع أم لا يتغيّر. علّل تحديدك.

ה. إلى محلول $\text{HCl}_{(aq)}$ حجمه 12 ملل وتركيزه 0.5M أضافوا 0.25 غرام من كربونات الكالسيوم، $\text{CaCO}_{3(s)}$ ،
الذي تفاعل بالكامل .

هل pH المحلول بعد انتهاء التفاعل أكبر من 7 أم أصغر من 7 أم يساوي 7 ؟
فصل حساباتك أو علل بالكلمات .

12. أجب عن البنود "أ"، "ب"، "د"، "و"، "ز"، وعن أحد البندين "ج" أو "ه".

يتناول السؤال المركب الأيوني نترات الأمونيوم، $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$.


نترات الأمونيوم الصلب، $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$ ، الممتص في خليط سائلي لهيدروكربونات، هو مادة متفجرة تستعمل لتفجير الصخور من أجل شق الطرق في المناطق الجبلية. نترات الأمونيوم يتحلل أثناء الانفجار.

معطى تفاعل التحليل الكامل لنترات الأمونيوم، $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$:



أ. حدّد هل التفاعل (1) هو تفاعل أكسدة-اختزال. علّل تحديداً.

الرسم البياني الذي أمامك يصف تركيبة الهواء في درجة حرارة 25°C وفي رطوبة 60% في ضغط 1 أتموسفير.



ب. نواتج التحليل الكامل لنترات الأمونيوم لا تُسبب تلوثاً للهواء. فسّر هذه الحقيقة.

البند "ج" هو بند اختياري. إذا اخترت الإجابة عنه، لا تُجب عن البند "ه".

ج. فيما يلي معطيات ΔH^0 للتفاعلين (2) و (3).



احسب ΔH_1^0 للتفاعل (1)، الذي هو تفاعل التحليل الكامل لنترات الأمونيوم.

- ד. في تحليل جزئيّ لنترات الأمونيوم، $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$ ، تنتج مرّكّبات مختلفة، مثل $\text{N}_2\text{O}(\text{g})$ و $\text{NO}_2(\text{g})$.
 احسب درجة أكسدة ذرات النيتروجين في كلّ واحد من أنواع الأيونات التي ترّكّب $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$ ، وفي
 مرّكّبي النيتروجين المعطيين.

البند "ה" هو بند اختياريّ. إذا اخترت الإجابة عنه، لا تُجيب عن البند "ג".

- ה. المرّكّب نترات الأمونيوم، $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$ ، يُستعمل أساساً سماداً للمزروعات.
 ينتج نترات الأمونيوم، $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$ ، في تفاعل حامض النيتريك، $\text{HNO}_3(\text{l})$ ، مع الأمونيا الغازيّة، $\text{NH}_3(\text{g})$.
 معادلة التفاعل هي:
- $$(4) \text{NH}_3(\text{g}) + \text{HNO}_3(\text{l}) \longrightarrow \text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$$

احسب كتلة الأمونيا، $\text{NH}_3(\text{g})$ ، اللازمة لتحضير 1.0 كغم من نترات الأمونيوم، $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$ ،
 حسب التفاعل (4).
 معطى أنّ: 1 كغم = 1000 غرام.




- ו. للتسميد في فصل الصيف، يُسوّق سماد نترات الأمونيوم، $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$ ، في محلول مائيّ بتركيز 9.5M.
 اكتب معادلة تفاعل إذابة نترات الأمونيوم، $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$ ، في الماء.

- ז. للتسميد في فصل الشتاء يستعملون محلولاً بتركيز مختلف — 7.9M.
 أيّ من الأعمال c-a التي أمامك يجب القيام به في محلول التسميد في فصل الصيف كي يلائم التسميد
 في فصل الشتاء؟ فسّر اختيارك.

- a. تصغير حجم المحلول بواسطة تبخير الماء.
 b. تكبير حجم المحلول بواسطة إضافة الماء.
 c. إضافة نترات الأمونيوم الصلب، $\text{NH}_4\text{NO}_3(\text{s})$ ، إلى المحلول.

13. אָב ען בניוד "א", "ב", "ג", "ד", וען אַחַד הבנידין "ה" או "ו".

אלקوجיל هو مادة تُستعمل لتعقيم وتنظيف اليدين عند عدم توفر الماء والصابون.
 الألكوجيل هو خليط سائلي لأنواع كحول مختلفة مذابة في الماء.
 أمامك جدول فيه معطيات عن كحولات يمكن إيجادها في الألكوجيل.

اسم الكحول	درجة حرارة الغليان (°C)	تمثيل مختصر للصيغة البنائية لجزيئات الكحول
1 إيثانول	78	
2 1 - پروپانول	97	
3 2 - پروپانول	82	
4 جليسيرول		

- א. i. אכתב סיג עמשייל אלקטרוניע לکل ואחד מן גזיئات הכחול המסיגלה פי الجدول.
 ii. איי כחולין מן بين الكحولات المعطاة في الجدول هما إيزوميران؟ علل.

ב. פسر لماذا درجة حرارة غليان 1 - پروپانول أعلى من درجة حرارة غليان الإيثانول.

ג. איי قول מן الأقوال (1)-(3) التي أمامك يفسر الفرق بين درجة حرارة غليان 1 - پروپانول ودرجة حرارة غليان 2 - پروپانول؟ علل.

- (1) مساحة السطح الخارجي لجزيء 1 - پروپانول أكبر من مساحة السطح الخارجي لجزيء 2 - پروپانول.
 (2) جزيء 1 - پروپانول هو قطبي، بينما جزيء 2 - پروپانول ليس قطبيًا.
 (3) كبر السحابة الإلكترونية لجزيء 1 - پروپانول يختلف عن كبر السحابة الإلكترونية لجزيء 2 - پروپانول.



ד. حدّد هل درجة حرارة غليان الجليسيرول أعلى من درجة حرارة غليان 2 - پروپانول أم أقلّ منها. علل تحديّدك.
 تطرّق في إجابتك إلى جميع أنواع القوى التي تعمل بين الجزيئات في كلّ واحد من المركّبين.

البند "هـ" هو بند اختياري. إذا اخترت الإجابة عنه، لا تُجيب عن البند "و".

هـ. إذا بللنا كُفّي يدينا بالماء، وسكبنا عليهما الكوجيل يحوي 70% إيثانول، $C_2H_5OH_{(l)}$ ، وفررنا قليلاً إحداهما بالأخرى، نشعر بأنّ يدينا قد سَخَنَتَا.

i. هل في العمليّة الموصوفة تستوعب اليدان طاقة أم تُطلقان طاقة؟ علّل.

ii. حدّد أيّ تفاعل من التفاعلين (1) أم (2) هو التفاعل الذي يُسبّب الشعور بتسخّن اليدين. علّل تحديداً.



iii. ما هو التغيّر الذي يمرّ به الإيثانول حسب التفاعل الذي اخترته في البند الفرعيّ ii: تبخير أم إذابة في

الماء أم تكثيف أم تحليل؟


البند "و" هو بند اختياري. إذا اخترت الإجابة عنه، لا تُجيب عن البند "هـ".

و. يجب الامتناع عن استعمال الألكوجيل بالقرب من مصدر نار، لأنّ هذه المادّة قابلة للاشتعال ويمكنها أن تؤدّي إلى حريق.


معطاة أربعة مخطّطات لتغيّر إنتالبيا.

ما هو المخطّط الذي يصف صحيحاً تغيّر الإنتالبيا في تفاعل حرق الإيثانول؟


علّل اختيارك، وفسّر لماذا دحضت كلّ واحد من المخطّطات الأخرى.




المخطّط 2



المخطّط 1



المخطّط 4



المخطّط 3

مواد أيونية، حسابات

14. أجب عن البنود "ج"، "د"، "هـ"، "و"، وعن أحد البندين "أ" أو "ب".

يتناول السؤال مواد أيونية وصفاتها.





البند "أ" هو بند اختياري. إذا اخترت الإجابة عنه، لا تُجب عن البند "ب".

أ. جميع المواد الأيونية هي صلبة في درجة حرارة الغرفة.
فسّر هذا التحديد في المستوى الميكروسكوبي.

البند "ب" هو بند اختياري. إذا اخترت الإجابة عنه، لا تُجب عن البند "أ".

ب. المادة الأيونية لا توصل كهرباء في درجة حرارة الغرفة.
فسّر هذا التحديد في المستوى الميكروسكوبي.

ج. أملك أربع معادلات (1)-(4).



i. حدّد أيّة معادلة من المعادلات (1)-(4) تمثل عملية انصهار يوديد البوتاسيوم، $\text{KI}_{(\text{s})}$.

ii. حدّد أيّة معادلة من المعادلات (1)-(4) تمثل عملية إذابة يوديد البوتاسيوم، $\text{KI}_{(\text{s})}$ في الماء.


د. أذابوا 16.6 غرام $\text{KI}_{(\text{s})}$ في الماء ونتاج محلول حجمه 1 لتر.

ما هو عدد المولات الكلّي للأيونات في المحلول؟ فصل حساباتك.

ה. כבירייד האלומניום הו מאדֶּה סלבה תִּסְתַּעַמַלַל פי الصنعة الكيميائية لإنتاج كبريتيد الهيدروجين، $H_2S(g)$.

i. اكتب الصيغة الأميريّة لكبريتيد الألومنيوم.

ii. كبريتيد الألومنيوم يتفاعل مع الماء ويُنتج هيدروكسيد الألومنيوم، $Al(OH)_3(s)$ ، وكبريتيد الهيدروجين،



اكتب معادلة موازنة للتفاعل.

iii. ما هي كتلة هيدروكسيد الألومنيوم، $Al(OH)_3(s)$ ، الذي ينتج عندما يتفاعل 30 كغم كبريتيد الألومنيوم

مع الماء؟ فصل حساباتك.

معطى أنّ: 1 كغم = 1000 غرام.

و. كبريتات المغنيسيوم، $MgSO_4(s)$ ، الذي يُسمّى "ملح إنجليزى"، يُستعمل أيضاً ملح حوض حمام للتهديّة.

ملأوا حوض حمام وأذابوا كبريتات المغنيسيوم في الماء. حجم المحلول في حوض الحمام كان 220 لتراً

وتركيز أيونات المغنيسيوم، $Mg^{2+}_{(aq)}$ ، في حوض الحمام كان 0.022M.

ما هي كتلة كبريتات المغنيسيوم، $MgSO_4(s)$ ، التي أُذيبت في الماء؟ فصل حساباتك.

בהצלחה!

נַתְמְנִי לַךְ הַנִּיָּח!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

חقوق الطبع محفوظة לדولة إسرائيل.

النسخ أو النشر ممنوعان إلا بإذن من وزارة التربية والتعليم.