

מדינת ישראל משרד החינוך

סוג הבחינה: בגרות
מועד הבחינה: קיץ תשפ"ו, 2026, מועד ב
מספר השאלון: 35581
נספח: דפי נוסחאות ל-5 יח"ל
תרגום לערבית (2)

דولة إسرائيل وزارة التربية والتعليم

نوع الامتحان: بچروت
موعد الامتحان: صيف 2026، الموعد "ب"
رقم النموذج: 35581
ملحق: لوائح قوانين لـ 5 وحدات تعليمية
ترجمة إلى العربية (2)

מתמטיקה

5 יחידות לימוד — שאלון ראשון

הוראות

- משך הבחינה: ארבע שעות.
- מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
בשאלון זה שלושה פרקים, ובהם שמונה שאלות.
פרק ראשון: אלגברה והסתברות
פרק שני: גאומטריה וטריגונומטריה במישור
פרק שלישי: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פולינומים, של פונקציות שורש, של פונקציות רציונליות ושל פונקציות טריגונומטריות
יש לענות על חמש שאלות לבחירתכם – לכל שאלה 22 נקודות.
סך הנקודות שתוכלו לצבור לא יעלה על 100.
- חומר עזר מותר בשימוש:
 - מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון שיש בו אפשרות תכנות. שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
 - דפי נוסחאות (מצורפים).

ד. הוראות מיוחדות:

- אין להעתיק את השאלה; יש לסמן את מספרה בלבד.
- יש להתחיל כל שאלה בעמוד חדש. יש לרשום במחברת את שלבי הפתרון, גם כאשר החישובים מתבצעים בעזרת מחשבון.
יש להסביר את כל הפעולות, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.

الرياضيات

5 وحدات تعليمية – النموذج الأول

تعليمات

- مدة الامتحان: أربع ساعات.
- مبنى النموذج وتوزيع الدرجات:
في هذا النموذج ثلاثة فصول، فيها ثمانية أسئلة.
الفصل الأول: الجبر والاحتمال
الفصل الثاني: الهندسة وحساب المثلثات في المستوى
الفصل الثالث: حساب التفاضل والتكامل للبولينومات وللدوال الجذر والدوال النسبية وللدوال المثلثية
يجب الإجابة عن خمسة أسئلة، حسب اختياركم – لكل سؤال 22 درجة.
مجموع الدرجات التي يمكنكم تجميعها لن يزيد عن 100.
- مواد مساعدة يُسمح استعمالها:
 - حاسبة غير بيانية. لا يُسمح استعمال إمكانيات البرمجة في الحاسبة التي توجد فيها إمكانيات برمجة. استعمال الحاسبة البيانية أو إمكانيات البرمجة في الحاسبة قد يؤدي إلى إلغاء الامتحان.
 - لوائح قوانين (مرفقة).

د. تعليمات خاصة:

- لا تنسخوا السؤال؛ يجب كتابة رقمه فقط.
- يجب بدء كل سؤال في صفحة جديدة. يجب كتابة مراحل الحل في الدفتر، حتى إذا أُجريت الحسابات بواسطة حاسبة.
يجب تفسير جميع الخطوات، بما في ذلك الحسابات، بالتفصيل وبوضوح وبترتيب.
عدم التفصيل قد يؤدي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء الامتحان.

يجب الكتابة في دفتر الامتحان فقط. يجب كتابة "مسودة" في بداية كل صفحة تُستعمل مسودة.
كتابة أية مسودة على أوراق خارج دفتر الامتحان قد تسبب إلغاء الامتحان.

الأسئلة في هذا النموذج ترد بصيغة الجمع، ورغم ذلك يجب على كل طالبة وطالب الإجابة عنها بشكل فردي.

نتمنى لكم النجاح!

בהצלחה!

/ يتبع في الصفحة التالية /

الأسئلة

أجيبوا عن خمسة من الأسئلة 1-8. (لكل سؤال – 22 درجة.)
 انتبهوا: إذا أجبتكم عن أكثر من خمسة أسئلة، تُفحص فقط الإجابات الخمس الأولى التي في دفتركم.

الفصل الأول: الجبر والاحتمال

1. يوم الأحد، خرجت سيارتان، السيارة "أ" والسيارة "ب"، من المدينة A وسافرتا إلى المدينة B في نفس الشارع. خرجت السيارة "أ" في الساعة 8:00 وسافرت بسرعة v كم/الساعة، وخرجت السيارة "ب" في الساعة 8:27 وسافرت بسرعة mv كم/الساعة. وصلت السيارتان إلى المدينة B في نفس الساعة. أ. حددوا أي تعبير من التعبيرات III-I التي أمامكم يُمثل طول الشارع بين المدينة A والمدينة B. عللوا تحديدكم.

$$\text{I. } \frac{0.45mv}{m-1}$$

$$\text{II. } \frac{1.45mv}{m+1}$$

$$\text{III. } \frac{0.55mv}{m-1}$$

- يوم الإثنين، في الساعة 8:00 خرجت السيارة "أ" من المدينة B وسافرت إلى المدينة A، وخرجت السيارة "ب" من المدينة A وسافرت إلى المدينة B. كل واحدة من السيارتين سافرت في نفس الشارع وبنفس السرعة التي سافرت بها يوم الأحد. بعد 45 دقيقة من خروج السيارتين إلى طريقهما، كان البعد بينهما 36 كم. التقت السيارتان في الساعة 9:00. ب. (1) جدوا قيمة m .

- (2) جدوا طول الشارع بين المدينة A والمدينة B.

- فوراً بعد أن التقت السيارتان، توقفت السيارة "أ" لمدة ساعة ونصف، وبعد ذلك واصلت سفرها إلى المدينة A بنفس السرعة التي سافرت بها من قبل. السيارة "ب" واصلت سفرها بدون توقف، وفوراً بعد أن وصلت إلى المدينة B سافرت عائدة إلى المدينة A. ج. جدوا في أية ساعة التقت السيارتان في المرة الثانية.

2. a_n هي متوالية هندسية لانهائية تنازلية، جميع حدودها موجبة وأساسها هو q .
أ. أمامكم ثلاثة ادعاءات III-I. حددوا أي ادعاء من الادعاءات صحيح، وعلّلوا تحديدكم.

I. $-1 < q < 0$

II. $0 < q < 1$

III. $1 < q$

b_n هي متوالية لانهائية، حدودها تُحقق $b_n = a_n + a_{n+1} + a_{n+2}$ لكل n طبيعي.

ب. برهنوا أنّ المتوالية b_n هي هندسية، وأساسها هو q .

معطى أنّ مجموع المتوالية b_n هو 1.96 أضعاف مجموع المتوالية a_n .

ج. جدوا قيمة q .

c_n هي متوالية حدودها تُحقق $c_n = \frac{b_n}{4 \cdot a_n}$ لكل n طبيعي.

معطى أنّ مجموع k الحدود الأولى في المتوالية هو 34.79.

د. (1) برهنوا أنّ المتوالية c_n هي ثابتة.

(2) جدوا قيمة k .

بدّلوا إشارة كل واحد من الحدود التي تقع في الأماكن الزوجية في المتوالية c_n .

هـ. جدوا مجموع k الحدود الأولى في المتوالية c_n بعد تبديل الإشارات. علّلوا إجابتكم.

3. من أجل القبول للعمل في شركة معينة، يجب على المرشحين النجاح في ثلاث مراحل قبول، الواحدة تلو الأخرى:

الامتحان "أ" والامتحان "ب" ومقابلة شخصية.

فقط المرشح الذي ينجح في الامتحان "أ" يتقدّم للامتحان "ب"، وفقط المرشح الذي ينجح في الامتحان "ب" يتقدّم للمقابلة.

المرشح الذي ينجح في جميع المراحل الثلاث يُقبّل للعمل.

الاحتمال بأن ينجح المرشح في الامتحان "أ" هو p ($0 < p < 1$).

الاحتمال بأن المرشح الذي نجح في الامتحان "أ" ينجح في الامتحان "ب" هو ضعف الاحتمال بأن ينجح المرشح في

الامتحان "أ".

الاحتمال بأن يُقبّل المرشح للعمل هو 3 أضعاف الاحتمال بأن ينجح المرشح في الامتحانين ولا ينجح في المقابلة.

أ. جدوا الاحتمال بأن المرشح الذي نجح في الامتحانين ينجح في المقابلة.

94% من المرشحين لا يُقبّلون للعمل.


ب. جدوا قيمة p .

ج. معلوم أنّ مرشحاً لم يُقبّل للعمل. ما هو الاحتمال بأن هذا المرشح نجح في الامتحان "أ"؟


من بين جميع المرشحين الذين لم يُقبّلوا للعمل، يختارون بشكل عشوائي 5 مرشحين.

د. ما هو الاحتمال بأن اثنين منهم على الأقل نجحوا في الامتحان "أ"؟

الفصل الثاني: الهندسة وحساب المثلثات في المستوى



4. ABC هو مثلث متساوي الأضلاع، محصور في دائرة.
 النقطة D تقع على امتداد الضلع BC، كما هو موصوف في الرسم.
 القطعة AD تقطع الدائرة في النقطة E.
 أ. برهنوا أن: $\angle AEB = \angle BEC = \angle CED = 60^\circ$.
 ب. برهنوا أن: $\triangle AEB \sim \triangle CED$.
 ج. برهنوا أن: $\frac{AE}{CE} = \frac{BC}{CD}$.
 معطى أن مساحة المثلث AEB هي 2.25 أضعاف مساحة المثلث CED.
 د. جدوا بكم ضعفًا مساحة المثلث ABD هي أكبر من مساحة المثلث CED.



5. في الرسم الذي أمامكم المثلث المتساوي الساقين ABC ($AB = AC$).
 النقطة E تقع على القاعدة BC بحيث $BE = 3 \cdot EC$.
 النقطة D تقع على الضلع AC بحيث ED يعامد AC.
 النقطة M تقع على الضلع AB بحيث EM يعامد AB.
 نرمز: $EC = k$ ، $\angle ABC = \alpha$ ، $30^\circ < \alpha < 90^\circ$.
 أ. عبّروا بدلالة k و α عن طولي القطعتين DE و ME.
 معطى أن مجموع مساحتي المثلثين CED و BEM هو $1.6k^2$.
 ب. جدوا قيمة α .
 معطى أن طول نصف قطر الدائرة التي تحصر المثلث AED هو 29.
 ج. جدوا قيمة k.

الفصل الثالث: حساب التفاضل والتكامل للبولينومات ولدوال الجذر ولدوال النسبية ولدوال المثلثية

6. معطاة الدالة $f(x) = \frac{6(x-1)^2}{x^2 + a}$.

a هو پارامتر موجب .

أ. (1) جدوا مجال تعريف الدالة $f(x)$.

(2) جدوا معادلات خطوط التقارب المعامدة للمحورين، للدالة $f(x)$ (إذا وُجدت مثل هذه الخطوط).

ب. جدوا إحداثيات النقاط القصوى للدالة $f(x)$ ، وحددوا نوع هذه النقاط. عبّروا عن إجاباتكم بدلالة a، إذا دعت الحاجة.

معطى أنّ الإحداثي y لنقطة النهاية العظمى للدالة $f(x)$ هو 7.5 .

ج. جدوا قيمة a .

بالنسبة لقيمة a التي وجدتموها، أجبوا عن البندين "د - هـ" .

د. ارسموا رسماً بيانياً تقريبياً للدالة $f(x)$.

$f'(x)$ هي دالة مشتقة الدالة $f(x)$.

$g(x) = \frac{-f'(x)}{(f(x))^2}$ هي دالة تُحقّق

هـ. (1) جدوا مجال تعريف الدالة $g(x)$.

(2) جدوا مجالات موجبية وسالبة الدالة $g(x)$.

(3) احسبوا المساحة المحصورة بين الرسم البياني للدالة $g(x)$ والمحور x في المجال $-a \leq x \leq 0$.

7. معطاة الدالة $f(x) = (\sin x)^2 \cdot \cos(2x)$ ، المعرّفة في المجال $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$.

أ. برهنوا أنّ الدالة $f(x)$ هي زوجية .

ب. جدوا إحداثيات جميع النقاط القصوى للدالة $f(x)$ ، وحددوا نوع هذه النقاط.

ج. ارسموا رسماً بيانياً تقريبياً للدالة $f(x)$.

دالة المشتقة $f'(x)$ معرّفة في المجال $-\frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{4}$.

معطاة الدالة $g(x) = \sqrt{a \cdot f'(x)}$.


a هو پارامتر سالب .

د. (1) جدوا مجال تعريف الدالة $g(x)$.

(2) جدوا إحداثيات نقاط تقاطع الرسم البياني للدالة $g(x)$ مع المحور x .

معطى أنّه توجد للدالة $f(x)$ نقطة التواء واحدة فقط في مجال تعريف الدالة $g(x)$.

هـ. ارسموا رسماً بيانياً تقريبياً للدالة $g(x)$.



8. الرسم الذي أمامكم يصف الرسم البياني للدالة $f(x) = (4x - 2)^3$

والمستقيم $y = 3x + b$.

b هو پارامتر موجب.

النقطة A تقع على الرسم البياني للدالة $f(x)$ بحيث إحداثيها x أصغر من الإحداثي x لنقطة تقاطع الرسم البياني للدالة $f(x)$ مع المستقيم المعطى.

النقطة B تقع على المستقيم المعطى بحيث القطعة AB توازي المحور x .

نرمز t إلى الإحداثي x للنقطة A .

معطى أن: $0 \leq t \leq 0.7$.

أ. عبّروا بدلالة b و t عن الإحداثي x للنقطة B .

ب. (1) جدوا قيمة t التي بالنسبة لها طول القطعة AB هو أصغر ما يمكن.

(2) جدوا قيمة t التي بالنسبة لها طول القطعة AB هو أكبر ما يمكن.

בהצלחה!

נשמתי לכם התאב!

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.

אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.

חقوق الطبع محفوظة לדولة إسرائيل.

النسخ أو النشر ممنوعان إلا بإذن من وزارة التربية والتعليم.