



משרד החינוך

דגשים בנוגע לפרסום הצעה לפתרון בחינת הבגרות במתמטיקה

1. בהצעה לפתרון שאלוני בחינת הבגרות במתמטיקה **מובאת התוצאה הסופית בלבד**, בלי פירוט דרכי הפתרון או בלי הסבר לפתרון.
2. אם יתברר שנפלה טעות בהצעת הפתרון, תפורסם בתוך זמן סביר הצעה מתוקנת, והצעת הפתרון המתוקנת תהיה המחייבת. **טל"ח** (טעות לעולם חוזר) – בהצעת הפתרון עלולות ליפול טעויות, ואין בה כדי לחייב את מעריכי הבחינה לקבל תשובה שגויה.
3. על פי חוזר מנכ"ל טוהר הבחינות – תשע"ה/9, נבחנים בבחינת בגרות מחויבים לפעול על פי נוהלי טוהר הבחינות כדי להבטיח הליך בחינות אמין, הוגן ושוויוני.
הנבחנים נדרשים לכתוב במחברת הבחינה פתרון מלא, מפורט ומנומק.
אם נבחן יכתוב תשובות סופיות נכונות במחברת הבחינה בלי פירוט של שלבי הפתרון או בלי הסבר מפורט או אם יתעורר חשד שנבחן הפר את טוהר הבחינות, יחל הליך של החשדת הבחינה כמפורט בחוזר.

[קישור לחוזר המנכ"ל](#)

בהצלחה לנבחנים ולנבחנות!

توضيحات بالنسبة لنشر اقتراح حل لامتحان البجروت في الرياضيات

1. في اقتراح حل نماذج أسئلة امتحان البجروت في الرياضيات **ترد نتيجة نهائية فقط**، دون تفصيل طرق هذا الحل أو شرحه.
2. إذا اتضح أنه وقع خطأ في اقتراح الحل، سوف يُنشر في غضون وقت معقول اقتراح مصحح، ويكون اقتراح الحل المصحح هو الاقتراح الملزم.
(**الخطأ وارد دائماً، حلّ من لا يسهو**) – يمكن أن تقع أخطاء في اقتراح الحل، إلا أن ذلك لا يعني وجوب قبول مصححي الامتحان إجابة خاطئة.
3. ننوه أنه بموجب منشور المدير العام: نزاهة الامتحانات – 9/2015 د، يتوجب على الممتحنين في امتحان البجروت أن يعملوا وفقاً لأنظمة نزاهة الامتحانات لضمان إجراءات امتحانات موثوق بها ونزيهة ومتكافئة.
يجب على الممتحنين أن يكتبوا في دفتر الامتحان حلاً كاملاً ومفصلاً ومعلّلاً.
إذا كتب ممتحن إجابات نهائية صحيحة في دفتر الامتحان بدون تفصيل مراحل الحل أو بدون شرح مفصل أو إذا ثار شك بإخلال طالب بنزاهة الامتحانات، تسري إجراءات تشكيك بالامتحان كما هو مفصّل في المنشور.


[رابط لمنشور المدير العام](#)

نتمنى النجاح للممتحنين وللممتحنات!



משרד החינוך


פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה, 4 יחידות לימוד – שאלון ראשון, מס' 35471, גרסה א, קיץ תשפ"ה, מועד ב, 2025
حلّ لامتحان البجروت في الرياضيات، 4 وحدات تعليمية – النموذج الأول، رقم 35471، الصيغة "أ"، صيف 2025، المועד "ب"

الإجابة الصحيحة	رقم السؤال	الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
5. أ. (1) تفسير ب. (2) برهان ב. (2) ברهان ג. A(0, 12) ד. B(-12, 6) $(x + 6)^2 + (y - 9)^2 = 45$ ה. (1) 6 ו. (2) ~ 20.562		1. א. 82 ב. نعم ג. 33.4% ד. 6,500 ה. 6	
6. א. (1) $x \neq -3$ ב. (2) $x = -3$ ג. (3) $y = 0$ ד. (4) (0, 0) ה. $\max\left(3, \frac{3}{4}\right)$ ו.  ז. $k = \frac{3}{4}$ ח. (1) $x = -3$ ט. (2) $y = 1$ י. (2) נקטתן مشترכתן		2. א. $\bar{x} = 6$ ב. تبیین ג. 10 كم/الساعة ד. -0.86 ה. (1) $y = -0.68x + 14.08$ ו. (2) 11.36 كم/الساعة ז. II	
		3. א. $\frac{37}{80}$ ב. (1) $\frac{47}{80}$ ג. (2) $\frac{10}{47}$ ד. $x = 8$	
		4. א. (1) E(-7, 9) ב. (2) 2 ג. (1) $y = -\frac{1}{2}x + 5\frac{1}{2}$ ד. (2) B(5, 3) ה. $\sim 33.69^\circ$ ו. $GE \approx 7.69$	



משרד החינוך


פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה, מס' 35471, גרסה א, קיץ תשפ"ה, מועד ב, 2025
 حل لامتحان البجروت في الرياضيات، رقم 35471، الصيغة "أ"، صيف 2025، المועד "ب"

رقم السؤال	الإجابة الصحيحة
7.	الرسم البياني (3) أ. $(0, \sqrt{3})$ ب. $(1.5, 0)$ ج. (1) $\min(0.2, 1.68)$ د. (2) $\max(1, 2)$ هـ. $\min(1.5, 0)$ مجال تصاعد: $0.2 < x < 1$ مجالا تنازلاً: $x < 0.2$ $1 < x < 1.5$  ~ 0.323
8.	أ. (1) $OC = 1.5t$ ب. (2) $\frac{3}{4} \cdot \frac{t^2 - 3t}{t - 4}$ ت. $t = 6$



משרד החינוך


פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה, 4 יחידות לימוד – שאלון ראשון, מס' 35471, גרסה ב, קיץ תשפ"ה, מועד ב, 2025
حل لامتحان البجروت في الرياضيات، 4 وحدات تعليمية – النموذج الأول، رقم 35471، الصيغة "ب"، صيف 2025، الموعد "ب"

الإجابة الصحيحة	رقم السؤال	الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
5. أ. (1) تفسير ب. (2) برهان ج. (3) برهان ד. (4) $A(0, 20)$ ה. (5) $B(-20, 10)$ ו. (6) $(x + 10)^2 + (y - 15)^2 = 125$ ז. (7) 10 ח. (8) ~ 34.271	5.	1. א. 80 ב. نعم ג. 33.4% ד. 7,000 ה. 9	1.
6. א. (1) $x \neq -4$ ב. (2) $x = -4$ ג. (3) $y = 0$ ד. (4) $(0, 0)$ ה. (5) $\max\left(4, \frac{3}{4}\right)$ ו. (6)  ז. (7) $k = \frac{3}{4}$ ח. (8) $x = -4$ ט. (9) $y = 1$ י. (10) נקטתן مشترכתן	6.	2. א. $\bar{x} = 6$ ב. تبين ג. 11 كم/الساعة ד. -0.86 ה. (1) $y = -0.68x + 15.08$ ו. (2) 12.36 كم/الساعة ז. II	2.
		3. א. $\frac{43}{90}$ ב. (1) $\frac{19}{30}$ ג. (2) $\frac{14}{57}$ ד. $x = 7$	3.
		4. א. (1) $E(-7, 10)$ ב. (2) 2 ג. (1) $y = -\frac{1}{2}x + 6\frac{1}{2}$ ד. (2) $B(5, 4)$ ה. $\sim 33.69^\circ$ ו. $GE \approx 7.69$	4.



משרד החינוך


פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה, מס' 35471, גרסה ב, קיץ תשפ"ה, מועד ב, 2025
حلّ لامتحان البجروت في الرياضيات، رقم 35471، الصيغة "ب"، صيف 2025، الموعد "ب"

رقم السؤال	الإجابة الصحيحة
7.	
أ.	الرسم البياني (3)
ب.	$(0, \sqrt{3})$ $(1.5, 0)$
ج. (1)	$\min(0.2, 1.68)$ $\max(1, 2)$ $\min(1.5, 0)$
(2)	مجال تصاعدي: $0.2 < x < 1$ مجالاً تنازلاً: $x < 0.2$ $1 < x < 1.5$
د.	
هـ.	~ 0.323
8.	
أ. (1)	$OC = 1.5t$
(2)	$\frac{3}{4} \cdot \frac{t^2 - 6t}{t - 8}$
ب.	$t = 12$



משרד החינוך


פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה, 4 יחידות לימוד – שאלון ראשון, מס' 35471, גרסה ג, קיץ תשפ"ה, מועד ב, 2025
حلّ لامتحان البجروت في الرياضيات، 4 وحدات تعليمية – النموذج الأول، رقم 35471، الصيغة "ج"، صيف 2025، الموعد "ب"

الإجابة الصحيحة	رقم السؤال	الإجابة الصحيحة	رقم السؤال
5. أ. (1) تفسير ب. (2) برهان ج. (3) برهان ד. (4) $A(0, 28)$ $B(-28, 14)$ $(x + 14)^2 + (y - 21)^2 = 245$ ה. (1) 14 ו. (2) ~ 47.98		1. א. 78 ב. نعم ג. 33.4% ד. 7,500 ה. 7	
6. א. (1) $x \neq -2$ ב. (2) $x = -2$ ג. (3) $y = 0$ ד. (4) $(0, 0)$ ה. (5) $\max\left(2, \frac{3}{4}\right)$ ו. (6)  ז. (7) $k = \frac{3}{4}$ ח. (8) $x = -2$ ט. (9) $y = 1$ י. (10) نقطتان مشترکتان		2. א. $\bar{x} = 6$ ב. تبیین ג. 12 كم/الساعة ד. -0.86 ה. (1) $y = -0.68x + 16.08$ ו. (2) 13.36 كم/الساعة ז. II	
		3. א. $\frac{38}{75}$ ב. (1) $\frac{18}{25}$ ג. (2) $\frac{8}{27}$ ד. $x = 8$	
		4. א. (1) $E(-7, 11)$ ב. (2) 2 ג. (1) $y = -\frac{1}{2}x + 7\frac{1}{2}$ ד. (2) $B(5, 5)$ ה. $\sim 33.69^\circ$ ו. $GE \approx 7.69$	



משרד החינוך

פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה, מס' 35471, גרסה ג, קיץ תשפ"ה, מועד ב, 2025
حل لامتحان البجروت في الرياضيات، رقم 35471، الصيغة "ج"، صيف 2025، الموعد "ب"

رقم السؤال	الإجابة الصحيحة
7.	أ. الرسم البياني (3) ب. $(0, \sqrt{3})$ $(1.5, 0)$ ج. (1) $\min(0.2, 1.68)$ $\max(1, 2)$ $\min(1.5, 0)$ (2) مجال تصاعد: $0.2 < x < 1$ مجال تنازل: $x < 0.2$ $1 < x < 1.5$ د.  ه. ~ 0.323
8.	أ. (1) $OC = 1.5t$ (2) $\frac{3}{4} \cdot \frac{t^2 - 5t}{t - 9}$ ب. $t = 15$