التكاثر في الطبيعة



© جميع الحقوق محفوظة لوزارة التربية صدر بتمويل مركز تخطيط وتطوير المناهج التعليمية في وزارة التربية وإدارة مركز التربية العلمية - التكنولوجية على اسم عاموس دي شليط



الجامعة العبرية في القدس، مركز تدريس العلوم وزارة التربية، السكرتارية التربوية، مركز تخطيط وتطوير المناهج التعليمية إدارة مركز التربية العلمية - التكنولوجية على اسم عاموس دي شليط



■ طاقم إعادة الكتابة والكتابة من جديد:

د. روت أمير ديدة فرنكل د. داية كافي باتيا جلعاد راحيل نوسينبوس

■ استشارة علمية:

بروفسور عودد كانر، كلية هداسا القدس (الفصول أ- ه)
د. أوريت برجمن - سفير، حديقة النباتات، القدس (الفصل و، الفصل ز (النباتات))
بروفسور شنئان هاربز، معهد فولكني (الفصل ز (الحيوانات)).

- **اعداد تربوی (بیداغوغی):** سمدار کوهن
 - مراجعة لغوية: مهند شيخ يوسف
 - إعداد جنسوى: إيريس تسور
- **رسومات، تصميم وإنتاج:** يوليا اغرونوفيش، جدعون دان ستوديو دان
 - بحث الصور: شيلي دور حاييم، رونيت نئمان نعمان
 - معالجة حقوق الطبع: رونيت نئمان نعمان، شوشنا هارئيل
 - أعد الكتاب للطباعة: شوشنا هارئيل

باقة شكر

لجميع الذين قرأوا، قدموا ملاحظات وأضاءوا الكتابة في المراحل المختلفة:

د. نوعا أبو العافية، مركز تخطيط وتطوير المناهج التعليمية، وزارة التربية

د. نطاع عورفي، مركز تخطيط وتطوير المناهج التعليمية، وزارة التربية

د. يهوديت عتيدية (الفصل أ)

للمصورين الذين صورهم تزين صفحات الكتاب (تفصيل الأسماء في نهاية الكتاب) صور الغلاف:

بادرة أفوكادو (Dontworry [wiki comm]), فراخ في العش (benjamint 444 [Wikipedia),

طفل في المهد (ر. أمير), اقحوان وملقح (ش. الحرار)

© جميع الحقوق على المواد التي أُدخلت في هذا الكتاب محفوظة لأصحابها. منوع طباعة، نسخ، تصوير، ترجمة أو تخزين في مجنَّع معلومات بكل طريقة أو وسيلة أخرى أي قسم أو مادة من هذا الكتاب.

إلى القراء الكرام

يتناول الكتاب "التكاثر في الطبيعة: في النباتات والحيوانات" عملية التكاثر التي تعتبر إحدى مميزات الحياة. أهمية عملية التكاثر ليست لبقاء الفرد ذاته الذي يستطيع أن يُكمل دورة حياته دون تكاثر، بل لاستمرارية بقاء النوع وللنشوء والارتقاء.

نُبرز على طول فصول الكتاب جانبين: التجانس في المبادئ التي تعتمد عليها عمليات التكاثر ومن ضمنها الملاءمة بين مبنى الأعضاء التناسلية وأدائها في النباتات والحيوانات والتباين الكبير الذي يتم التعبير عنه في تنوع طرق تكاثر الأنواع المختلفة وبأشكال الأعضاء التناسلية. التجانس من ناحية واحدة والتباين من ناحية أخرى هما ناتحا عمليات نشوء وارتقاء كثيرة السنوات.

يبدأ الكتاب من خلال عرض التكاثر كمميز حياة يضمن استمرارية بقاء النوع وفي عرض المبادئ المشتركة لتكاثر جميع الكائنات الحية. في وقت لاحق في الكتاب، ستجدون فصول منفردة لتكاثر الإنسان، حيوانات أخرى وتكاثر النباتات. يعتمد هذا التدخُّل على تقدم البحث والتكنولوجيا في مجالات الطب والزراعة، لكن إلى جانب الفائدة، يُثير هذا التدخُّل صراعات أخلاقية.

الفصل الذي يغلق الكتاب يتناول استراتيجيات تكاثر كائنات حية مختلفة، ويعرض نظرة تُجمل عملية التكاثر في مستويات التنظيم البيولوجية المختلفة ابتداءً من الخلايا، عبر الأعضاء والكائن الحي الكامل وحتى العمليات التي تحدث في مستوى النظام البيئي.

دُمجت في فصول الكتاب أقسام ثابتة فيها قطع توسُّع ومضامين متعلقة بشكل مباشر بالمنهج التعليمي، وهي تعرض أهمية وصلة المواضيع التي نتعلمها:



" جدير بالمعرفة" - قصص تربط بين الموضوع الذي يتم تعلُّمه والحياة اليومية.



"نافذة البحث" - قطع أبحاث محتلنة كثيرة، ترافقها أسئلة لتحليل نتائجها.



"توسُّع" - مضامين أكثر من المطلوب في المنهج التعليمي.



"أسئلة" - بتنوع واسع من مستويات التفكير التي تُتيح استعمال تنوع مهارات التفكير.



وصراع ذهني" - قضايا أخلاقية تنشأ من المضامين التي يتعلمها التلاميذ وتحتاج إلى اتخاذ قرار قيمي.

أبرزت المصطلحات المهمة في الفصل بلون في النص.

للمساعدة في الربط بين المواضيع المختلفة التي يتعلمها التلاميذ، نعرض المستطيلات الآتية إلى جانب النص.



توجيه التلاميذ إلى مواضيع يتم التوسُّع فيها فيها بعد. الفكرة المركزية

ربط المادة التي يتعلمها التلاميذ بأفكار مركزية في البيولوجيا.

> قراءة ممتعة وتعلم مثمر! طاقم التطوير

محتويات الكتاب

التكاثر أحد مميزات الحياة

<mark>1.</mark> التكاثر يُتيح استمرارية النوع	10
<mark>1.</mark> طرق التكاثر في الطبيعة	12
أ3. الأساس الخلوي للتكاثر	13
أ1.3 الميتوزا- الأساس الخلوي للتكاثر غير التزاوجي والنمو	14
أ2.3 الميوزا- الأساس الخلوي للتكاثر التزاوجي	15
أ3.3 ما هو الفرق بين الميوزا والميتوزا؟	18
<mark>أ4.</mark> تباين وراثي وطفرات	20
المواضيع الأساسية في هذا الفصل	21
المصطلحات المهمة في هذا الفصل	21
مبادئ التكاثر التزاوجي	23
ب1. تتميَّز أفراد التكاثر التزاوجي في التباين الوراثي	24
ب2. في التكاثر التزاوجي تتحد خليتيْ تكاثر مختلفتين	25
ب3. يتم التكاثر التزاوجي بين أفراد من نفس النوع (species) البيولوجي	26
ب4. البيئة المحيطة المائية أو الرطبة ضرورية للاخصاب	27
ب5. تحتاج الأجنة إلى غذاء وبيئة محيطة محمية لتطورها	27
ب6. يتم تنظيم جهاز التناسل (التكاثر) بواسطة آليات مراقبة	28
ب7. نظرة من منطلق النشوء والارتقاء: تكاثر تزاوجي وتباين وراثي	29
المواضيع الأساسية في هذا الفصل	31
المصطلحات المهمة في هذا الفصل	31
تكاثر الإنسان*	34
ج1. مبنى جهاز التكاثر	34
ج1.1 جهاز التكاثر عند المرأة	35
ج2.1 جهاز التكاثر عند الرجل	36

ج2. من الطفولة حتى البلوغ	37
ج1.2 التغيُّرات الجسمانية في سن البلوغ	37
ج2.2 الخلايا المنوية: إنتاج، تطور ومبنى	40
ج3.2 خلية البويضة:تطور ومبنى	41
ج3. دورة الحيض	44
ج4. إلتقاء الخلايا التناسلية والاخصاب	48
ج1.4 مسار خلايا التكاثر في طريقها إلى الإخصاب	48
ج2.4 الإخصاب - إتحاد الخلايا التناسلية	49
ج5. من الزيجوت إلى الوليد	50
ج1.5 تطور الجنين	51
ج 2.5 الولادة	57
ج.6 تنمية عشائر بنو البشر (النمو السكاني للإنسان)	60
المواضيع الأساسية في هذا الفصل	61
المصطلحات المهمة في هذا الفصل	62
تدخُّل في عمليات تكاثر الإنسان	63
 إحصاب خارج الجسم: حل لحالات كثيرة تعاني من الخصوبة 	65
1.13 مراحل عمل عملية الإخصاب خارج الجسم	65
2.13 تطبيق الإخصاب خارج الجسم	67
23. التكنولوجيا تساعدنا لكنها تخلق صراعات أيضًا	72
د 3. تنظيم تعداد العائلة	74
المواضيع الأساسية في هذا الفصل	76
المصطلحات المهمة في هذا الفصل	77
تكاثر الحيوانات	80
تكاثر تزاوجي عند الحيوانات	80
۔ ھ1. صوب التکاثر	80
د . ه1.1 البلوغ الجنسي	80
ه 2.1 موسم التكاثر	81
هـ3.1 علامات جنسية ثانوية	82
هـ4.1 اتصال بين الذكور والإناث	83

```
عاثر الحيوانات في الماء
                                                                       85
                                       هـ1.2 تكاثر الأسماك
                                                                       85
                                     هـ2.2 تكاثر البرمائيات
                                                                       86
                                  ه.3. تكاثر الحيوانات في اليابسة
                                                                       88
                                        ه.1.3 تكاثر الطيور
                                                                       90
                                      ه.2.3 تكاثر الثدىيات
                                                                       96
هه. جوانب النشوء والارتقاء للتكاثر التزاوجي (الجنسي) عند الحيوانات
                                                                      101
                 تكاثر لا جنسي في أحادية الخلية والحيوانات
                                                                      102
                     ه5. تكاثر لا جنسي بواسطة الإنقسام أو التبرعم
                                             ه6. التكاثر العذري
                                                                      103
              ه.7. تكاثر غير تزاوجي (لا جنسي) بطرق بيوتكنولوجية.
                                                                      105
                                   المواضيع الأساسية في هذا الفصل
                                                                      106
                                  المصطلحات المهمة في هذا الفصل
                                                                     108
                                          تكاثر النباتات
                                                                    111
                                ح1. تكاثر غير تزاوجي (لا جنسي)
                                                                      111
                                             ح2. تكاثر تزاوجي
                                                                      113
                                             ح1.2 الإزهار
                                                                      115
                        ح2.2 مبنة الزهرة والأعضاء التناسلية
                                                                      118
                                              ح3.2 تلقيح
                                                                      122
                                             ح4.2 إخصاب
                                                                      127
                                     ح3. من الزيجوت إلى الجنين
                                                                      129
                  ح 1.3 تطور الجنين: جنين، إندوسبيرم وفلقات
                                                                      129
                  ح 2.3 البذور: حماية الأجنة وملاءمة الانتشار
                                                                      131
     ح 3.3 الثمار: حماية البذور وأيضًا انتشارها إلى أماكن بعيدة
                                                                      131
                                        ح4. من البذرة إلى النبتة
                                                                      136
                                             ح1.4 الإنبات
                                                                      136
                                  ح2.4 من البادرة إلى النبتة
                                                                      139
           ح5. جوانب النشوء والارتقاء للاكاثر التزاوجي عند النباتات
                                                                     140
                                   المواضيع الأساسية في هذا الفصل
                                                                     141
                                  المصطلحات المهمة في هذا الفصل
                                                                     143
```

•	
ح	
\sim	


تدخُّل الإنسان في عمليات تكاثر الحيوانات والنباتات 145 خ1. تدخُّل الإنسان في عمليات تكاثر الحيوانات والنباتات 146 خ1.1 تنظيم نظام الإضاءة وتأثيره على تكاثر الحيوانات 147 خ2.1 التخصيب (الزرع) الإصطناعي وتزامن الشبق عند الأبقار 148 خ3.1 حث الشبق عند الأبقار 150 خ2. تدخُّل الإنسان في عمليات تكاثر النباتات 151 خ1.2 تكاثر غير تزاوجي (خضري) للنباتات 151 خ2.2 تدخُّل المزارعون في دورة الحياة والتكاثر التزاوجي في النباتات 158 خ3.2 تلخيص: تدخُّل المزارعون في مراحل مختلفة في دورة حياة النبات 164 المواضيع الأساسية في هذا الفصل 166 المصطلحات المهمة في هذا الفصل 166


نظرة تلخيص علوية على تكاثر النباتات والحيوانات

- 13. جوانب النشوء والارتقاء لعمليات التكاثر 170
- 22. هل أفراد قليلة أم كثيرة؟ إستراتيجيات التكاثر 171
 - د3. مبادئ مشتركة في مستويات التنظيم 175
 - المواضيع الأساسية في هذا الفصل 177
 - المصطلحات المهمة في هذا الفصل 177

قاموس المصطلحات 178 دليل المصطلحات 189 مصادر الصور 197

169





الفصل الأول: التّكاثر أحد مميزات الحياة

التّكاثر ظاهرة معروفة، شائعة ومفهومة ضمنًا. لو لم تتكاثر الكائنات الحيّة، لا تكون استمرارية للحياة

على سطح الكرة الأرضيّة! تتم عملية التكاثر في جميع ممالك الكائنات الحيّة: البكتيريا، أُحادية الخلية،

والجماد. على الرغم من أنّ التكاثر مميِّز أساسي للكائنات الحيّة إلا أنّ التكاثر غير ضروري لحياة الفرد ذاته (بالمقارنة مع وظائف ضروريّة أخرى، مثل: التّغذية، التّنفس والإفراز)، لأن الفرد يستطيع أنْ يعيش فترات زمنيّة طويلة دون أن يتكاثر، وحتى دون أن يتكاثر بتاتًا طيلة حياته! على الرغم من ذلك، التّكاثر

ضروري لاستمرار بقاء العشيرة والنّوع (species) كله. بفضل عملية التّكاثر، يستمر النّوع في البقاء

أجيال كثيرة، على الرغم من أنّ الأفراد تموت. تنتقل المعلومات الوراثية الخاصة للنوع البيولوجي من

فطريات، نباتات وحيوانات. هناك من يعتبر أن قدرة التّكاثر هي المميِّز الأساسي للفرق بين الحي

أ1. التّكاثر يُتيح استمرارية النّوع

جيل إلى آخر بواسطة عملية التّكاثر.

الفكرة المركزية

استمرارية وراثية وتكاثر، نقل معلومات من جيل إلى آخر.

مستويات التنظيم: فرد، عشيرة ونوع.



تكاثر حيوانات ونباتات على اليمين: بادراتٍ بعد هطول المطر الأول. على اليسار: أنثى ماعز وجدى.



مصطلحات

النوع والجنس

- 1. المصطلح نوع عبارة عن وحدة تصنيف نوع بيولوجي (species) النُّوع البيولوجي، هو مجموعة أفراد تتكاثر فيما بينها في الطبيعة وتُنجِب أفرادًا خصبة. مثلا: نوعا صابونة الرّاعي هما: صابونة الرّاعي فارسي وصابونة الرّاعي أسمر. نوعا الحوت هما: حوت أزرق وحوت زعنفي.
- 2. المصطلح جنس هو وحدة تصنيف أعم من النّوع. والجنس عبارة عن مجموعة أفراد تكون خصائصهم الحيوية ثابتة وتحتفظ بها السلالة على مر الأجيال.

مثال على ذلك: الحمار وأنثى الحصان، مكن أنْ تكون لهما سلالة، لكنها لا تنتمى لنفس النّوع، لأن البغل عقيم. أما المصطلح جنس في حياتنا اليوميّة فإنّه يدل على ذكر أو أنثى. لكي لا يلخبط التّلاميذ بين المصطلحين، عندما نستعمل مصطلح جنس في هذا الكتاب، فإننا نقصد الذكر أو الأنثى (sex). ولا نقصد وحدة التّصنيف.



نظرة إلى الماضي — الحي ينشأ من الحي

في يومنا هذا، لا يوجد أي شك عندنا أنَّ جميع الكائنات الحيّة نشأت من تكاثر كائنات حيّة سبقتها. لكن حتّي القرن ال 19، اعتقد بعض النّاس أنّه بالإضافة إلى طريقة تكاثر الكائنات الحيّة، هناك نشوء تلقل أيضًا، وهذا يعني نشوء كائنات حيّة من مادّة الجماد. اعتقد كثيرون ومن بينهم علماء أنّ الذّباب ينشأ من لحوم متعفنة وأنّ الأسماك والسلاحف نشأت من الوحل الموجود في أرضيّة البحر، والضّفادع نشأت من تربة رطبة، والفئران من العرق، والنّباتات والسّرطانات نشأت من طبقة الطّحالب التي تغطى سطح المياه أحيانًا.

في سنة 1862، حُسم النّقاش بين الذين يؤمنون في النّشوء التّلقائي وبين الذين ينكرونه، وقد حسم هذا النقاش العالم الكيميائي الفرنسي **لويس باستور (Lou**is Pasteur, 1822-1895).

كان باستور متأكد أنّه في الهواء من حولنا، يوجد كائنات حيّة صغيرة جدًا، لا نراها بالعين المجردة - كائنات حية دقيقة - وهي التي تتطور على أوساط غذائيّة مختلفة وتؤدي إلى تلف الغذاء والأمراض. أجرى باستور تجارب تدعم فرضيته وهكذا نُفي التّصور الفكري أنّ هناك نشوء تلقائي.

التّصور الفكري الذي أصبح مقبولًا في نهاية القرن الـ 19 أنّ كل كائن حي ينشأ من كائن حي سبقه وتكاثر.

علاقة موضوع

الخلية - مبنى ونشاط: كل خلية تنشأ من خلية حيّة سادة أن

نافذة البحث

في سنة 1862، أجرى باستور التّجربة الموصوفة في الرسمة أ - 1. صبَّ باستور وسطًا غذائيًا داخل قناني زجاجيّة لها "رقبة" ضيقة وطويلة. قام باستور بثني "رقبة" قسم من القناني بواسطة التّسخين، أما "رقبة" القناني الأخرى فقد تركها مستقيمة. ترك فوهة القناني مفتوحة وسمح بدخول الهواء. تسمح "الرقبة" المثنية بدخول الهواء، لكنها لا تُتيح للكائنات الحيّة الدقيقة أنْ تصل الوسط الغذائي، لأنها ترسب في منطقة الثني وتبقى هناك.


بعد ذلك، قام باستور بتسخين الوسط الغذائي الموجود في القناني حتّى درجة حرارة الغليان، ثمَّ كشف جميع القناني للهواء الطلق.

بعد مرور عدة أسابيع، أصبح الوسط الغذائي، الموجود في القناني ذات "الرقبة" المستقيمة، عكرًا وغنيًا بالكائنات الحيّة الدقيقة، أما الوسط الغذائي الذي كان في القناني ذات "الرقبة" المثنية، فبقي صافيًا كما كان في بداية

التحرية.



لويس باستور



إذا لا يوجد نشوء تلقائي، فكيف بدأت الحياة؟ ۖ الْ

ما زال هذا السّؤال قيد البحث، ولا توجد حتى الآن إجابة علميّة واحدة لهذا السّؤال. على الرغم من ذلك، هناك اتفاق على أنّه في الماضي البعيد جدا، قبل مئات ملايين السّنين، كانت سائدة ظروف خاصة تختلف عن الظّروف الموجودة اليوم. في تلك الظّروف، بدأت تنشأ الحياة من مادّة جماد معيّنة انتظمت في مبنى تتم فيه عمليات الحياة، مثل: العمليات الأيضية (تبادل المواد) واستغلال الطّاقة، وبالإضافة إلى ذلك، توفرت لديه القدرة أنْ يضاعف مادّته الوراثيّة، وهذا يعنى أنْ يتكاثر.

أ2. طرق التّكاثر في الطّبيعة

في عالَم الأحياء، نعرف طريقتيْ تكاثر: تكاثر غير تزاوجي (لا جنسي) وتكاثر تزاوجي (جنسي). التّكاثر غير التزاوجي أقدم من التّكاثر التّزاوجي من ناحية النشوء والارتقاء ويتم التّكاثر غير التّزاوجي في البكتيريا، الفطريات، النباتات وفي أنواع حيوانات بسيطة. تطور التّكاثر التّزاوجي فيما بعد وهو معقد أكثر من التّطور غير التّزاوجي، ويتم الأول في جميع الأنواع التي في خلاياها نواة (حقيقية النّواة). تتكاثر أنواع معيّنة بطريقتيْ تكاثر: تزاوجي وغير تزاوجي.

التّكاثر غير التّزاوجي في الحيوانات، أنظِروا الفصل

الحيوانات، اعترو، اعتسا الخامس في الصّفحات -106 102. التكاثر غير التّزاوِجي في

ِ النّباتات وتطبيقه في الزّراعَة، أ

أُنظروا الفصل السّادَّس في الصّفحات 111-113, وفي

الفصل السّابع في الصّفحاتّ


.158-151


ما هي الفروق بين طريقتي التّكاثر؟ 🔽

تعرض الرّسمة 2- أ الفروق الأساسيّة بين طريقتي التّكاثر. في التّكاثر غير التّزاوجي، مصدر المادّة الوراثية في النّسل هو والد واحد، لذا جميع الأفراد متماثلة وتشبه الوالد الذي نشأت منه (باستثناء بعض الحالات الشّاذة التي سنتعرف عليها فيما بعد في هذا الكتاب). يعتمد التّكاثر غير التزاوجي على عملية الميتوزا في الخلية. يعتبر تجانس وتماثل الأفراد بالتكاثر غير التزاوجي أفضلية للعشيرة التي تعيش في بيئة محيطة ظروفها ثابتة (لا تتغيّر). جميع الأفراد ملائمة لهذه البيئة المحيطة وتُحفظ هذه الملاءمة من جيل إلى آخر.

في التّكاثر التّزاوجي، نحصل على المادّة الوراثية في الأفراد نتيجةً للاتحاد الذي يحدث خلال الإخصاب بين خليتيْ تكاثر (جاميتات) مختلفتين، حيث تَنتُج هاتين الخليتين في عملية الميوزا، وكل واحدة منهما تحمل معلومات وراثية خاصة. مصدر خليتي التّكاثر والد واحد (مثل نباتات كثيرة فيها تلقيح ذاتي) أو والدين. نتعرف فيما بعد على عمليات تساهم في إنتاج أفراد غير مماثلة لبعضها وغير مماثلة للوالدين،

هذه العمليات هي: إنتاج خلايا تناسلية (خلايا تكاثر) في عملية الميوزا واتحاد خليتين مختلفتين في الإخصاب وأحداث أخرى. يحمل كل فرد تراكيب جديدة خاصة من المعلومات الوراثية في خلاياه. لذا التباين الوراثي ميز نسل التكاثر التزاوجي. التباين الوراثي له أفضلية في ظروف بيئة محيطة متغيرة، لأنه لأفراد قليلة يوجد احتمال بقاء على قيد الحياة، إذا طرأت تغيرات في البيئة المحيطة.





الرّسمة أ-2: طرق تكاثر — والدين، عمليات وأفراد

أ3. الأساس الخلوي للتكاثر

لفهم الظُواهر المتعلقة بتكاثر الكائنات الحيّة، نبحث في البداية عمليات تحدث في مستوى الخلية: انقسام النواة - ميتوزا وميوزا. يوجد كروموسومات في نواة خلايا كائنات حية حقيقية النّواة. كل كروموسوم مبني من جزيء DNA طويل وبروتينات. يشكِّل الـ DNA المادّة الوراثية وفيه مشفرة معلومات عن مبان وعمليات، في الخلية، تكسبه الصّفات الوراثية. لذا النقل الدّقيق لصفات الخلية من جيل إلى آخر مشروط بقدر كبير جدًا بالنّسخ الدّقيق للـ DNA.

علاقة موضوع

الخلية — مبنى ونشاط: مضاعفة ال DNA بشكل دقيق قبل انقسام الخلية. في مرحلة معينة في حياة الخلية، قبل الانقسام، يتضاعف الـ DNA بشكل دقيق. نتيجة لذلك، قبل الانقسام، كل كروموسوم مبنى من كرومتيدتن متماثلتن نسمِّيهما كرومتيدتن أختن.



📫 سؤال أ - 1

بَعد مضاعفة الـ DNA ، كلّ كروموسوم مبنى من كرومتيدتين أختين. كم جديلة DNA يوجد في كلُّ كروموسوم مرَّ مضاعفة؟ اعرضوا إجابتكم بالكتابة ومساعدة الرَّسم.

أ1.3 الميتوزا — الأساس الخلوى للتكاثر غير التّزاوجي والنمو

هناك عمليتان أساسيتان في حياة الكائنات الحيّة المتعددة الخلايا، اللتان تعتمدان على عملية الميتوزا: النمو — إضافة خلايا إلى الجسم وتكاثر غير تزاوجي — إضافة أفراد إلى العشيرة. في الكائنات الحيّة أحادية الخلية، انقسام الخلية معناه تكاثر، لأنّ كلّ خلّية كائن حي مستقل.

علاقة بموضوع

. دورة الخلبة

انقسام الخُلية — ميتوزا

خلال الميتوزا، النّواة التي تحتوى على ضعفيْ كمية المادّة الوراثية، تنقسم بشكل دقيق إلى نواتين، كل واحدة منهما مماثلة للنواة التي كانت قبل أنْ تُضاعف مادّتها الوراثية. ينقسم السيتوبلازم مع العضيات الموجودة فيه إلى خليتين جديدتين (ابنتين)، لكن انقسام العضيات ليس بالضّرورة دقيق، إذن الميتوزا عبارة عن انقسام النواة الذي في أعقابه نحصل من خلية واحدة على خليتين جديدتين متماثلتين من ناحية وراثية وهما مماثلتان لخلية الأم التي نتَجت منها.


تصف الرّسمة أ- 3 العمليات التي تحدث خلال الميتوزا في خلية حيوانية فيها 4 كروموسومات.

أ. الكروموسومات التي تضاعفت قبل الانقسام تنضغط وتصبح قصيرة لدرجة أنّه يمكن تمييز كل واحد منهما (بالميكروسكوب) ككرومتيدتين مرتبطتين ببعضهما -كرومتيدتان أختان (في معظم الوقت، الكروموسومات موزعة في الخلية كخيوط دقيقة ملتويّة، ولا مكن التّمييز بينها).

ب. تنتظم الكروموسومات بجانب بعضها في المستوى المركزي للخلية (خط الإستواء)، وبتحلل غشاء النّواة.

ت. تنفصل الكرومتيدتان الأختان في كلّ كروموسوم، وتنتقل إلى الأقطاب المتضادة في الخلية. كلّ كروماتيدة نسمِّيها الآن كروموسوم.

ث. تنقسم الخلية إلى خليتين جديدتين (ابنتين). في كلِّ خلية، تَنْتُج نواة محاطة بغشاء وفيها عدد كامل (هيئة) من الكروموسومات كما هو الأمر في خلية الأم. ينقسم السيتوبلازم مع جميع محتوياته على الخليتين الجديدتين (الابنتين).



الرّسمة أ-3: رسم تخطيطي للميتوزا، نتيجة لانقسام خلية واحدة فيها 4 كروموسومات، نحصل على خليتين، في كل واحدة منهما 4 كروموسومات. مراحل الميتوزا في النّباتات، الفطريات والحيوانات تكون متجانسة من ناحية مبدئية. هذا التّجانس دلالة إضافيّة تدعم نظرية الأصل المشترك لنشوء وارتقاء الكائنات الحيّة.

أ 2.3 الميوزا - الأساس الخلوى للتكاثر التزاوجي

يعتمد التّكاثر التّزاوجي على اتحاد خليتيْ تكاثر (نسمِّيها خلايا تناسلية، أو جنسية أو جاميتات أيضًا). تَنتُج خلايا التّكاثر في أعقاب انقسام نواة الخلية التي نسمِّيها ميوزا. انتبهوا! تَنتُج خلايا التّكاثر خلال عملية الميوزا، لكن تطور الزّيجوت إلى كائن حي بالغ متعلق بتكاثر الخلايا (بواسطة انقسام ميتوزا)، بالنمو والتّمايز.

في جميع خلايا الكائنات الحيّة المتعددة الخلايا (باستثناء الخلايا التناسلية)، توجد هيئة كروموسومات مزدوجة نسميها ديبلوئيدات أو ثنائية الكروموسومات (eidos=مزدوج أو ضعف، eidos=شكل أو هيئة). أما الخلايا التناسلية فإنّها تحتوي على هيئة كروموسومات واحدة نسميها هيبلوئيدات أو أُحادية الكروموسومات (haploos=بسيطة).

نرمز عادةً في اللغة العلمية إلى هيئة الكروموسومات المزدوجة الموجودة في خلايا الأجسام الديبلوئيدية بالرمز n، في خلايا جسم الإنسان، بالرمز c، في خلايا جسم الإنسان، يوجد 23 زوجًا من الكروموسومات 20=46.

في هيئة الكروموسومات المزدوجة، يوجد لكلّ كروموسوم قرين يشبهه في المبنى ونوع المعلومات التي يحملها (باستثناء الكروموسومات التناسلية التي سنتوسع فيها فيما بعد). مصدر أحد الكروموسومان من الأب والثّاني من الأم. الكروموسومان اللذان يكوّنان زوج من الكروموسومات نسمّيهما كروموسومان متماثلان

في الكروموسومين المتماثلين، توجد نفس المعلومات الوراثية، لكن طابع المعلومات، يمكن أن يكون مختلف. مثال: في أحد أزواج الكروموسومات المتماثلة في خلايا الإنسان، توجد معلومات عن نوع الدم. هذه المعلومات موجودة في هذا الزوج من الكرموسومات فقط. لكن أحد الكروموسومين، يمكن أن يشمل معلومات عن نوع الدم A، والكروموسوم المماثل يمكن أن يشمل معلومات عن نوع الدم B.

Γ کیف نحصل علی خلایا تناسلیة هیبلوئدیة ذات n کروموسومات

نحصل على الخلايا التناسلية في أعقاب انقسام نواة الخلية بطريقة نسميها الميوزا. هذا الانقسام خاص للكائنات الحيّة التي تتكاثر بطريقة تزاوجية. انقسام الميوزا نسميه انقسام اختزالي أيضًا، لأنّه في نهاية الانقسام، وبعد انقسامين متتالين، نحصل من خلية ديبلوئيدية واحدة على أربع خلايا هيبلوئيدية، في كل واحدة منها نصف عدد الكرموسومات التي كانت في الخلية التي انقسمت. في كل خلية، يوجد ممثّل واحد من كل ووج كروموسومات متماثلة كانت في خلية الأم، وهذا يعني أنّه في كل خلية هيبلوئيدية، توجد معلومات لكلّ أنواع صفات الكائن الحي الذي يتطور من الزيجوت.


تعرض الرّسمة أ - 4 مراحل الميوزا والعمليات التي تحدث في الخلية خلال الميوزا. قبل الميوزا، كما هو الأمر قبل الميتوزا، يتضاعف الـ DNA بشكل دقيق وكلّ كروموسوم مبني في هذه المرحلة من كرومتيدتين أختين. انقسام الميوزا مكوَّن من عمليتيْ انقسام.

للمزيد عن

النّمو والتّمايز، أنظروا الفصل الثّالث، صفحة 53.

ِ للمزيد عن

تطور الخلايا التّناسلية في أعقاب الميوزا، أنظروا القصل الثّالث، صفحات 40, 43-43 وفي الفصل السّادس صفحات 120-119.



الرّسمة أ-4: رسم تخطيطي للميوزا. من انقسام خلية فيها 4 كروموسومات (زوجان من الكروموسومات المتماثلة، 2n=2)، نحصل على أربع خلايا تحتوي كل منها على كروموسومين (مُمثُل واحد من كل زوج كروموسومات متماثلة).

الانقسام الأول للميوزا:

- أ. الكروموسومات التي تضاعفت قبل الانقسام تنضغط، تصبح قصيرة ويمكن أنْ نشاهد بالميكروسكوب أنّ كلّ واحد منها مكوَّن من كرومتيدتين مرتبطتين ببعضهما (كروماتيدات أخوية).
 - ب. تنتظم أزواج الكروموسومات المتماثلة الواحد مقابل الآخر بشكل عشوائي في مركز الخلية المنقسمة.
- ت. تنفصل أزواج الكرموسومات المتماثلة، وينتقل كل كروموسوم من الكروموسومات المتماثلة إلى أحد القطبين.
- ث. في نهاية الانقسام الأول، نحصل على خليتين جديدتين (ابنتين)، في كل واحدة منهما ممثّل واحد من كل زوج من الكروموسومات المتماثلة (كل كروموسوم مكوَّن من كرومتيدتين).

الانقسام الثّاني للميوزا:

ج. تنتظم الكرموسومات (مرةً أخرى) في خط الأستواء.

- ح. تنفصل كلّ كرومتيدي كروموسوم، كلّ كرومتيد إلى خلية جديدة (الابنة). يتحول كلّ كرومتيد إلى كروموسوم كما هو الأمر في الميتوزا.
- خ. نحصل على 4 خلايا هيبلوئيدية، في كل واحدة منها "مُمثِّل" واحد من الكرومتيدات الأربعة التي كانت في كلَّ زوج كروموسومات متماثلة في بداية الميوزا. في الخلايا الأربع التي نتَجت في أعقاب الميوزا يوجد نفس عدد الكروموسومات (n) ، لكن المعلومات الوراثية في كلِّ منها مختلفة ومنها تتطور الخلايا التناسلية (حاميتات).

و الله أ - 2 سؤال أ

- في نهاية الميوزا تَنْتُج 4 خلايا هيبلوئيدية. ماذا يمكن الاستنتاج من ذلك عن كمية المادّة الوراثية (الـ DNA) الموجودة في الخلية، في بداية الميوزا؟ هل الكمية:
 - 1. مماثلة للكمية الموجودة في كلّ خلية من الخلايا النّاتجة في نهاية الانقسام الثّاني؟
 - 2. ضعفي الكمية الموجودة في كلّ خلية من الخلايا النّاتجة في نهاية الانقسام الثّاني؟
- 3. أكبر 4 أضعاف من الكمية الموجودة في كلّ خلية من الخلايا النّاتجة في نهاية الانقسام الثاّني؟ اختاروا الإجابة الصّحيحة وعلّلوا.

الميوزا والتباين الوراثي

تتم عمليتان مهمتان خُلال الميوزا وهما تساهمان في التّباين الوراثي لدى أفراد التّكاثر التّزاوجي:


أ . انفصال عشوائي بين الكروموسومات (غير متعلق)

بعد أنْ تنتظم الكروموسومات المتماثلة بأزواج في مركز الخلية التي تنقسم، يتحرك أحد الكرموسومين إلى أحد قطبى الخلية والكروموسوم الآخر ينتقل إلى القطب الآخر (المضاد).

الطريقة التي ينتظم فيها زوج معين من الكروموسومات المتماثلة في مركز الخلية، والتي وفقًا لها يتم تحديد الكروموسوم (الذي مصدره من الأب أو الأم) الذي ينتقل إلى القطب في الخلية، هي طريقة عشوائيّة، وهذا يعني أنَّ ذلك غير متعلق بطريقة تنظيم أزواج الكروموسومات الأخرى. من هنا، نجد في كلّ قطب من قطبي الخلية مجموعة متنوعة من الكروموسومات، قسم منها من الأم والقسم الآخر من الأب.

مثال: في الخلية التي فيها n=2 (2n=4)، مكن أنْ تنتظم الأزواج المتماثلة بطريقتين (الرسمة أ - 5). في كل طريقة، مكن أنْ تَنْتُج خليتين جديدتين (ابنتين) مختلفتين عن بعضهما بتراكيب كروموسومات مختلفة.

> كلما كان عدد الكروموسومات أكبر، فإنَّ عدد التراكيب بينها يزداد أيضًا، وبالطبع نحصل على تنّوع كبير من الخلايا الجديدة (الاينة).



الرسمة أ-5: يؤدي الترتيب المختلف لأزواج الكروموسومات المتماثلة إلى تنّوع تراكيب كروموسومات الخلايا الجديدة (الابنة).

ا سؤال أ - 3

- أ. كم يكون عدد الكرموسومات في خلايا الجنين، لو لم يحدث انخفاض في عدد الكروموسومات أثناء انتاج الخلايا التناسلية؟
 - ب. ما هي أهمية انخفاض عدد الكروموسومات خلال انتاج الخلايا التناسلية، لاستمرارية الأجيال؟ اشرحوا.
 - ت. ماذا تكونَ مكوِّنات كروموسومات خلايا التّكاثر، إذا لم تتم عملية انفصال كروموسومات بشكل غير متعلق؟ اشرحوا.

ب. عبور مادة وراثية

في الانقسام الأول للميوزا، عندما تنتظم الكروموسومات المتماثلة بأزواج، الواحد مقابل الآخر، فإنها تقترب من بعضها وتصبح متجاورة. تقترب كرومتيدة كروموسوم واحد من كرومتيدة كروموسوم متماثل، وخلال عملية الاقتراب تتبادل قسم من الكرومتيدات فيما بينها بقطع من المواد الوراثية. هذه العملية التي يتم فيها تبادل مقاطع نسميها عبور مادة وراثية (crossing over) (الرسمة أ - 6).



الرّسمة أ -6: عبور واحد بين زوج من الكروموسومات المتماثلة

عملية تبادل المقاطع دقيقة: يتبادل قسم من كروموسوم واحد (بنفس الطول وبنوع المعلومات التي يحملها) مع قسم مماثل له من الكروموسوم المماثل. في أعقاب العبور، تَنْتُج كروموسومات فيها مقاطع مصدرها من "الأم" ومقاطع مصدرها من "الأب".

اتضح أنَّ العبور يحدث بتكرارية عالية جدًا، وهذا يعني في عدة أماكن على طول الكروموسوم. تعرض الرّسمة أ- 7 زوج من الكروموسومات المتماثلة بعد حدوث 3 مرات عبور.

. الأماكن في الكروماتيدات التي يتم فيها العبور، وأيضًا عدد مرات العبور للكروموسوم أو الخلية، يمكن أنْ تكون مختلفة في الخلايا المختلفة التي تحدث فيها المبوزا.




الرّسمة أ -7: زوج من الكروموسات المتماثلة بعد ثلاث مرات عبور.

نتيجة لعمليتي انفصال الكروموسومات بشكل عشوائي (بطريقة غير متعلقة) وعبور المادة الوراثية يَنتُج ما يلي: كلّ خلية تناسلية (هيبلوئيدية) تَنتُج في فرد معين، تحتوي على هيئة كاملة من المعلومات الوراثية، لكن هذا التّركيب الوراثي يختلف عن خلايا تناسلية أخرى تَنتُج في نفس الفرد أو في فرد آخر. ويختلف أيضًا عن التّركيب الوراثي الذي كان في الخلايا التّناسلية، للفرد ذاته، التي نتَحت منها الخلايا الجديدة (الابنة).

أ3.3 ما هو الفرق بين الميوزا والميتوزا؟

تختلف عمليتي الميوزا والميتوزا بجوانب معينة، لكن يوجد تشابه بين العمليتين كما نرى ذلك في الرّسمة أ - 8. تبدأ العمليتان بعد المضاعفة الدّقيقة للمادّة الوراثية، وبعد أنْ يصبح كلّ كروموسوم مكوَّن من كرومتيدتين. قبل الانقسام إلى خليتين، تنتظم الكروموسومات في مركز الخلية، في الميتوزا تنتظم الكروموسومات في سطر واحد، أما في الميوزا فإنّها تنتظم بأزواج: كلّ كروموسوم مقابل الكرموسوم المماثل



الرسمة أ-8: مقارنة بين الميتوزا (على يمينكم) والميوزا (على يساركم)

ترتيب الكروموسومات المتماثلة بأزواج، الواحد مقابل الآخر، هو الذي يُتيح الانفصال العشوائي والعبور اللذان يساهمان في تباين الخلايا الجديدة (الابنة) في الميوزا. وهكذا يَنْتُج أنّه في كلّ خلية من الخلايا الابنة في الميوزا، توجد تراكيب أخرى للكرموسومات (قسم منها من أحد الوالدين والقسم الآخر من الوالد الآخر)، والكروموسومات ذاتها غير مماثلة لكروموسومات الوالدين، لأنّه في أعقاب العبور، تم تبديل مقاطع من الكروموسومات.



省 سؤال أ- 4

أ. قارنوا بن المبوزا والمبتوزا بواسطة الجدول الآتى:

الميتوزا	الميوزا		المعيار
	II الانقسام		
			مضاعفة ال DNA قبل الانقسام
			انفصال كروموسومات متماثلة
			انفصال كروماتيدات أخوية
			عدد خلايا الابنة
			عدد الكروموسومات في الخلايا الابنة
			عبور
			النّتيجة النّهائية للعملية

ب. لخصوا التّشابه بين الميتوزا والانقسام الأول للميوزا، وجاذا تتشابه الميتوزا مع الانقسام الثّاني؟



و الله أ - 5 سؤال

انقسام الميوزا والميتوزا دقيقان لدرجة أنّنا نحصل على خلايا فيها معلومات لجميع صفات الخلية. ما الذي يُتيح الدّقة في انقسام الخلايا خلال الميوزا والميتوزا؟ إشرحوا.

أ4. تباين وراثي وطفرات

رأينا أنّ الميوزا والاخصاب يساهمان في التّباين الوراڤي بين أفراد التّكاثر التزاوجي. لكن يجب التذكر أنّ الطُّفرات التي تحدث في الخلايا تساهم في التّباين أيضًا.

الطَّفرة هي تغيير في تسلسل القواعد النيتروجينية في الـ DNA ومصدر إضافيّ لتنوع المادّة الوراثية التي هي شرط ضروري لتطور النَّشوء والارتقاء. مكن أنْ تحدث الطَّفرة بسبب خطأ في مضاعفة الـ DNA ، مثل: استبدال نوكلوئتيد واحد بآخر، نقص نوكلوئتيد أو إضافة نوكلوئتيد. يحدث نوع آخر من الطُّفرات بسبب انكسار في الكروموسوم. لا يعرف العلماء جميع الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الطَّفرات، لكن من المعروف أنّ الأشعة (مثل: أشعة UV، أشعة رنتجن والأشعة الرادبواكتيفية) مكن أنْ تؤدي إلى طفرات. يعتقد الباحثون أنّ عوامل إضافيّة، مثل: مواد معيّنة وفيروسات أيضًا، قد تؤدي إلى حدوث طفرات. في الكائنات الحيّة التي تتكاثر بطريقة تزاوجية، تؤثر الطّفرة على الأفراد، إذا حدثت في خلايا التكاثر فقط. الطّفرة التي تحدّث في خلايا الجسم التي ليست خلايا تكاثر، لا تؤثر على النّسل (الأفراد). في الكائنات الحيّة التي تتكاثر بطريقة غير تزاوجية، يَنْتُج تباين في الأفراد في أعقاب طفرات فقط، لكن هذا الحدث نادر جدًا. إذا حدثت الطُّفرة في الخلايا التي تنقسم بشكل مستمر وتشترك في إنتاج الفرد، عندئذِ نحصل على أفراد تختلف عن الوالدين بهذه الصّفة أو بغيرها. في الكائنات الحيّة أحادية الخلية، تنتقل الطَّفرة إلى الأفراد في التَّكاثر التِّزاوجي أو غير التِّزاوجي أيضًا.


الخلية - مبنى ونشاط: قبل انقسام الخلية، يتضاعف ال DNA بطريقة دقيقةٍ، لكن تحدث طفرات أحيانًا.

ِالتّباين الوراثي وصراع البقاء، انظروا الفصلّ الثّاني، صفحة

🚮 سؤال أ - 6

أَدُّتُ أَشعة إلى طفرة في المادّة الوراثية، في خلايا الجلد. هل تنتقل، حسب رأيكم، هذه الطّفرة بالوراثة إلى أفراد نفس الكائن الحيّ الذي يتكاثر بطريقة تزاوجيّة؟ اشرحوا.





				-	•
.~					
مساعدة الجدول الآتي:	مغير التعام	- 11 - 11	: *IS ::II ::.	الذ مقيد	اخما
مساعدة العندون الألي.	وعاو التواوعي	اللواوحني	ى اسمار	انسروق د	تحتصوا
<u> </u>	0.00	O . J .	J		_

تكاثر تزاوجي	تكاثر غير تزاوجي	مميزات
		عدد الوالدين/مصادر المادّة الوراثية
		العملية الخلوية التي تعتمد عليها عملية التّكاثر
		مدى تباين الأفراد
		مصدر تباين الأفراد
		حسنات استمرارية بقاء النّوع
		سيئات استمرارية بقاء النّوع



المواضيع الأساسيّة في هذا الفصل

التّكاثر ضروري لاستمرارية العشيرة والنّوع.

في نهاية القرنُ الـ 19، تمَّ قبول النّظرية أنَّ الكائن الحي يَنْتُج من كائن حي آخر مرَّ بعملية تكاثر.

في عالم الأحياء، نعرف طريقتيْ تكاثر: تكاثر تزاوجي وتكاثر غير تزاوجي. العملية الخلوية التي يعتمد عليها التّكاثر غير التّزاوجي هي الميتوزا والعملية الخلوية التي يعتمد

عليها التّكاثر التّزاوجي هي الميوزا.

الميتوزا هي أيضًا العملية التي يعتمد عليها النّمو والتّطور.

العمليات التي تحدث في الميوزا، مثل: انفصال الكروموسومات بشكل غير متعلق وعبور المادّة الوراثية (العبور)، تساهم في التّباين الوراثي لأفراد التّكاثر التّزاوجي.

أفراد التّكاثر غير التّزاوجي تكون مماثلة لبعضها وللوالديّن، أما التّباين الوراثي فهو مِيِّز أفراد التّكاثر

تباين وراثي

تساهم الطفرات العشوائيّة في التّباين الوراثي.

المصطلحات المهمة في هذا الفصل

جنس (ذكر أو أنثى) تكاثر غير تزاوجي

تكاثر تزاوجي طفرة


معلومات وراثية (مادّة وراثية)


ميوزا (انقسام اختزالي)

ميتوزا

خلايا تكاثر (تناسلية أو جاميتات)

نوع (species)





الفكرة المركزية

التّجانس والتّباين: تتم عملية التّكاثر في جميع الكائنات الحيّة، لكن يوجد تباين في تفاصيل العملية والأعضاء التي تشترك بها.

الفصل الثّاني: مبادئ التّكاثر التّزاوجي

تتكاثر معظم أنواع الكائنات الحيّة المتعددة الخلايا بواسطة التّكاثر التّزاوجي الذي يعتبر مُعقد ومركّب بالمقارنة مع التّكاثر غير التّزاوجي. في هذا الفصل، نعرض المبادئ المشتركة لجميع الكائنات الحيّة التي تتكاثر بتكاثر تزواجي ومن بينها الإنسان.


في هذه المبادئ، نكتشف التجانس الكبير الموجود في العمليات التي تحدث في الكائنات الحيّة. هناك فروق في تفاصيل عملية التّكاثر التّزاوجي في الأنواع المختلفة (سنعرض بعض الأمثلة على ذلك في الفصلين الخامس والسّادس)، لكن الأشياء المشتركة أكبر بكثير من الفروق. تعرَّفنا في الفصل السّابق على عملية الميوزا التي تعتبر مرحلة ضروريّة في انتاج خلايا التّكاثر في جميع الكائنات الحيّة التي تتكاثر بطريقة تزاوجية. في هذا الفصل، نعرض مبادئ مشتركة أخرى.

ب1. تتميَّز أفراد التّكاثر التّزاوجي في التّباين الوراثي

تتميَّز أفراد التّكاثر التّزاوجي في التّباين الوراثي (الجيني). هناك حدثان مهمان في عملية التّكاثر التّزاوجي في الكائنات الحيّة المتعددة الخلايا وهما يساهمان في التّباين الوراثي عند الأفراد:

1. انتاج خلايا تكاثر في عملية الميوزا.

2. الاخصاب: اتحاد خليتي تكاثر مختلفتين إلى خلية واحدة نسمِّيها الزّيجوت الذي يتطور منه الفرد.



الرّسمة ب - 1: العمليات التي تساهم في التّباين الوراثي عند نسل التّكاثر التزاوجي.

خلال الميوزا، تحدث عمليات عبور وانفصال غير متعلق للكروموسومات، تؤدي هذه العمليات إلى انتاج خلايا تكاثر ذات مبنى وراثي خاص. في عملية الاخصاب، يتم التقاء عشوائي بين خلايا تناسلية مختلفة.

نتيجة لذلك، المكوِّنات الوراثية في كلِّ زيجوت وفي كلِّ فرد يتطور منها تختلف عن الوالدين وعن الأفراد الأخرى لنفس الوالدين. كلَّ فرد يَنْتُج في التّكاثر التّزاوجي، يوجد فيه مكوِّنات وراثية خاصة به. فكروا في ذلك، كلِّ واحد وواحدة منا، إذا لا يوجد له توأم مماثل، فإنه وحيد وخاص. تلخص الرسمة ب - 1 العمليات التي تساهم في التّباين الوراثي.



ب2. في التّكاثر التّزاوجي تتحد خليتيْ تكاثر مختلفتين

معظم الأنواع التي تتكاثر بطريقة تزاوجية، يوجد لديها نوعين من الخلايا التناسلية التي تختلف عن بعضها بالكبر والشّكل. الخلايا التناسلية الذكرية نسمّيها خلايا منوية. تستطيع هذه الخلايا أنْ تتحرك بشكل مستقل وهي صغيرة نسبيًا. الخلايا التناسلية الأنثوية نسميها بويضات. لا تستطيع هذه الخلايا التّحرك بشكل مستقل وتكون عادةً كبيرة بالمقارنة مع الخلايا المنوية. عدد الميتوكوندريا في الجينا المنوية أكبر من عدد الميتوكوندريا في البويضات.

في الحيوانات التي تختلف عن بعضها بالذكور والإناث، يستطيع كل فرد أنْ يُنْتِج نوع واحد من الخلايا التناسلية: الإناث تُنْتِج البويضات والذكور يُنْتِجون الخلايا المنوية. يوجد أنواع (species)، يستطيع فيها نفس الفرد أن يُنْتِج نوعي الخلايا التناسلية، مثل: الحلزونات، دودة الأرض وأنواع السّرطانات. النّوع الذي أفراده تُنْتِج نوعي الخلايا التناسلية نسمِّيه خُنثى.

للمزيد عن أزهار أحادية الجنس وأزهار ثنائية الجنس. انظروا الفصل السّادس، صفحة 121.

معظم أنواع النباتات خنثاء. أزهارها ثنائية الجنس، هذا يعني أنّها تحتوي على عضو تناسلي أنثوي (مبيض) وعلى عضو تناسلي ذكري (أسدية) (الرسمة ب - 2). على الرّغم من ذلك، يوجد أنواع نباتات،

مثل: النّخيل والخروب التي أزهارها أحادية الجنس والخلايا التّناسلية المختلفة تَنتُج في أفراد مختلفة. .




الرّسمة ب -2: زهرة ثنائية الجنس من عائلة السّوسنيات انتبهوا إلى المبيض الأسود والأسدية من حولها.

ما هو الأساس الوراثي لتحديد الجنس؟

القدرة على انتاج خلايا تناسلية ذكرية أو خلايا تناسلية أنثوية متعلقة بالمعلومات الوراثية الموجودة في خلايا الفرد. في الثّدييات، على سبيل المثال، يختلف زوج واحد من جميع أزواج الكروموسومات المتماثلة في الخلايا عن أزواج الكروموسومات الأخرى، هذا زوج من الكروموسومات التّزاوجية (هناك

من يسمِّيها كروموسومات جنسية). في كروموسومي التزاوج (أو في واحد منهما)، يوجد قسم من الجينات التي لها علاقة بالتزاوج. في خلايا الأُنثى عند الإنسان (وفي الثّدييات بشكل عام)، يوجد كروموسوميْ تزاوج متماثلين نسمِّيهما كرموسوميْ X. أما في خلايا الذكر، يوجد كروموسوميْ تزاوج مختلفين: كروموسوم X كما هو الأمر في الأُنثى وكروموسوم إضافي نسميه كروموسوم Y. نجد كروموسومات التّزواج في كلّ خلية من خلايا أجسامنا كما هو الأمر مع سائر الكروموسومات (الرّسمة ب – 3).



الرِّسمة ب -3: كروموسومات في خلايا الجسم، خلايا التّكاثر وفي الأفراد عند الإنسان. إذا تمعًنا عبر الميكروسكوب في إحدى خلايا الإنسان، يمكن أنْ نعرف ما إذا هو ذكر أو أُنثى حسب كرموسومات التّزاوج. يمكن أنْ نفحص ذلك إذا كانت الخلايا في حالة انقسام فقط، لأنّ المادّة الوراثية تنضغط إلى مبان من السّهل أنْ نميِّزها.

في الطيور، الفراش والعث، يتم تحديد الجنس بشكل عكسي بالمقارنة مع الإنسان: في الذكور يوجد كروموسوميْ تزاوج متماثلين، وفي الإناث يوجد كروموسوميْ تزاوج مختلفين. في عدة أنواع من الجنادب، يوجد كروموسوم تزاوجي واحد، هذا الكروموسوم موجود في خلايا الإناث فقط وغير موجود في خلايا الإناث فقط وغير موجود في خلايا النّكور. في أنواع النّباتات التي فيها أفراد ذكرية وأفراد أنثوية منفردة، مثل: الخروب والنّخيل، يتم تحديد الجنس بطريقة تشبه الطّريقة التي تتم في النّدييات.



أفراد أنثوية تحمل ثمار شجر النخيل

🗲 توسُّع

المزيد عن تحديد الجنس

في الأنواع الخنثى التي يستطيع فيها كلّ فرد أنْ يُنتج نوعي الخلايا التّناسلية، لا يوجد كروموسومات تزاوج. هكذا الأمر في دودة الأرض، الحلزونات وفي معظم أنواع النّباتات. عند السّلاحف، تحديد الجنس (ذكر أو أنثى) متعلق بدرجة الحرارة التي كانت فيها البيضة حتّى فقصت. تتغيَّر درجة الحرارة في الحفرة التي وُضع فيها البيض وفقًا للعمق: بالقرب من سطح التّربة، تكون درجة الحرارة أعلى من عُمق الحفرة. في درجات حرارة أعلى من ℃30، تخرج من البيض إناث، أما في درجات حرارة أقل، مثلاً: ℃24-℃27، يخرج من البيض ذكور أكثر من الإناث. في أسماك معيّنة وفي الضّفادع، يتم تحديد الجنس بواسطة كروموسومات التّزاوج، لكن تأثيرات من البيئة المحيطة مثل درجة الحرارة، تستطيع أنْ تغيِّر اتجاه تطور النّسل حديث السن وأن تحوِّل إناث إلى ذكور وبالعكس.

ب3. يتم التّكاثر التّزاوجي بين أفراد من نفس النّوع البيولوجي (species)

يمكن أنْ يتم الاخصاب فقط بين خليتين تناسليتين مصدرهما من فردين ينتميان إلى نفس النّوع البيولوجي (species). خلايا التّناسل التي تستطيع أنْ تتعد إلى زيجوت، تستطيع أنْ تتعرف على بعضها بطرق بيوكيميائيّة، حيث يتم ذلك من خلال قدرة الاتصال بين مبانٍ في غشاء الخلية المنوية ومواقع ارتباط خاصة (مستقبلات) في غشاء خلية البويضة. يتم هذا الاتصال بين خلية منوية وخلية بويضة من نفس النّوع البيولوجي فقط. أحد الأمثلة الشّاذة هو انتاج زيجوت من خلايا تناسلية لحمار وحصان. يتطور من هذا الزيجوت فرد (بغل)، لكنه عاقر ولا يستطيع التّكاثر.

ب4. البيئة المحيطة المائية أو الرطبة ضرورية للاخصاب

مكن أنْ تتم عمليتي الاخصاب وتطور الجنين في بيئة محيطة مائية أو رطبة فقط.

يحتاج الاخصاب إلى بيئة محيطة مائية أو رطبة، لأنّ الخلايا بشكل عام والخلايا التّناسلية بشكل خاص، لا تستطيع أنْ تعيش في هواء جاف تتعرض فيه إلى خطر الجفاف والموت. الكائنات الحيّة التي تعيش في الماء، مثل: الطّحالب والأسماك، تعتبر البيئة المحيطة المائية مكانًا طبيعيًا لإلتقاء الخلايا التناسلية. يتم الاخصاب ذاته في البيئة المحيطة المائية الخارجية للجسم ونسمّيه اخصابًا خارجيًّا.

في الكائنات الحيّة التي تعيش في اليابسة، تنتقل الخلايا التّناسلية بطرق مختلفة من الذّكر إلى جسم الأُنثى دون أنْ تتعرض إلى خطر الجفاف المتعلق مكوثها في الهواء، حيث يتم الاخصاب داخل جسم الأُنثى. هذا الاخصاب نسمِّيه اخصابًا داخليًّا. الاخصاب في الإنسان هو مثال واضح لاخصاب داخلي، لكن في النّباتات كاسيات البذور الاخصاب داخليّ أيضًا!

في الكائنات الحيّة التي يتم فيها اخصاب داّخلي، الأعضاء التّناسلية تشمل الأعضاء التي تَنتُج فيها الخلايا التّناسلية وتساعد على التقائها: توجد في الذّكر وسائل تساعد على نقل الخلايا التّناسلية الذّكرية إلى جسم الأُنثى. يوجد في جسم الأنثى مبانٍ تَنْتُج فيها الخلايا التّناسلية، مبانِ يتم فيها الاخصاب ومبانِ تساعد في حماية الأجنة التي تتطور.

ب5. تحتاج الأجنة إلى غذاء وبيئة محيطة محمية لتطورها

الجنين بداية الجيل القادم، وهو يحتاج إلى مواد غذائية وبيئة محيطة مائية محمية لتطورها. في هذا الأمر، لا يوجد فرق بين كائنات حيّة بسيطة ومعقدة، بين كائنات حيّة تعيش في الماء واليابسة وبين حيوانات ونباتات.

لكن الوسائل التي تزوِّد احتياجات الأجنة والمباني التي تتطور فيها تختلف عن بعضها في الكائنات الحيّة المختلفة (الرِّسمة ب - 4، جدول ب - 1). البيضة التي تضعها الزّواحف والطّيور في البيئة المحيطة، هي مبنى معقد يحتوي على الزّيجوت (البويضة المخصّبة)، مواد يحتاجها الجنين لتطوره (صفار البيض، ماء، بروتين)، غشاء وقشرة. تتطور أجنة التُّدييات في الرِّحم وتحصل على الغذاء والأكسجين من دم الأُم. أجنة النّبات محمية داخل البذرة وتتغذى خلال الانبات من المواد التي تمَّ تخزينها.

علاقة موضوع


علم البيئة: نقل خلايا تناسلية (جاميتات) في بيئة محيطة مائية.

الفكرة المركزية

التّباين والتّجانس: تحتاج الأجنة إلى غذاء، حماية وبيئة محيطة مائية، لكن الوسائل والمباني لذلك مختلفة.

للمزيد عز

البيضة كمكان لتطور الجنين، أنظروا الفصل الخامس ،صفحات 88, 93.





الرّسمة ب-4: تطور الأجنة من اليمين إلى اليسار: بادرة أفوكادو، صوص يخرج من البيضة، طفل في الرحم.

محبطة	ىىئىة	وظروف	أكسحين	غذاء،	ولتزويد	الأحنة	لحماية	ووسائل	1: مىانى	عدول ب -ا	>

كيف نضمن للجنين ظروف بيئة محيطة خارجية ملائمة؟	تزويد الأكسجين	تزويد الجنين بالغذاء	وسائل حماية الجنين	موجود عند	المبنى
وضع البيضة في موسم مناسب	ديفوزيا (انتشار) عبر الأغشية	مواد ادخارية في البيضة	يوجد أغشية، لا يوجد غلاف قاسي	حيوانات تتكاثر في الماء، مثل: الأسماك، البرمائيات	** 11
ركود على البيضة، وضع البيضة في موسم مناسب، أو طمرها في التّربة.	ديفوزيا (انتشار) عبر الأغشية والقشرة	مواد ادخارية في البيضة	يوجد أغشية وغلاف قاسي	حيوانات تتكاثر في اليابسة، مثل: الزّواحف، الطّيور	البيضة
يتطور الجنين في جسم الأُم	بالديفوزيا من دم الأم بواسطة المشيمة	من دم الأُم بواسطة المشيمة والحبل السّري	مبنی عضلي داخل جسم الأُم	ثدييات في اليابسة والماء	الرّحم
وسائل تُعيق الانبات في ظروف بيئة محيطة غير مناسبة	ديفوزيا من البيئة المحيطة	مواد ادخارية في البذرة	قشرة البذرة والثّمرة	نباتات كاسيات البذور	البذرة

ب6. يتم تنظيم نشاط جهاز التناسل (التّكاثر) بواسطة آليات مراقبة

علاقة بموضوع بيولوجيا الإنسان: آليات تنظيم واتصال.

تتكاثر معظم الكائنات الحيّة - نباتات وحيوانات - عندما تصل سن معيّن وفقط في موسم مناسب لنمو الأفراد. الموعد المناسب للتكاثر مهم جدًا لنجاح التّكاثر التّزاوجي. عندما نتمعَّن في الطّبيعة من حولنا، نلاحظ في معظم الحالات أن التّكاثر يتم في موسم ظروفه مناسبة لتطور النّسل: درجة حرارة مناسبة وموارد، مثل: توافر الماء والغذاء.

تُشير هذه الحقيقة إلى وجود آليات تنظيم واتصال بواسطتها تتم مراقبة نشاط جهاز التّكاثر. مصدر معظم المعرفة في هذا الشأن من الأبحاث التي تمَّت على النّباتات، الطّيور والثّدييات، ولدينا معرفة قليلة عن مراقبة التّكاثر في الكائنات الحيّة البسيطة مثل الحشرات.

بما أن التّكاثر موسمي في معظم الكائنات الحيّة، من المعقول الإفتراض أنّ إشارت خارجيّة (من البيئة المحيطة)، مثل: طول النّهار، درجة الحرارة، الأمطار وتوافر الغذاء، هي التي تحرّك العمليات الداخلية وفي أعقاب ذلك، العمليات والسلوكيات، أيضًا، التي تُتيح توقيت دقيق لإلتقاء الخلايا التّناسلية للذكر والأُنثى. إحدى الإشارات المهمة لتوجيه موعد التّكاثر هو الضوء.


أُجريت أبحاث كثيرة حول تأثير الضّوء على إزهار النّباتات، لكن في الحيوانات أيضًا، مثل: الطّيور والخراف فقد وُجد رد فعل للتغيُّرات في عدد ساعات الإضاءة وتأثير على عمليات داخلية مثل إفراز هورمونات.

نبين في الفصل السّابع، كيف يستغل المزارعون هذه المعرفة لتوجيه الإزهار، لزيادة نسبة وضع البيض في الأقنان ولتوجيه تكاثر الحيوانات التي يعتني بها الإنسان (حيوانات المزرعة)؟

في الحيوانات، تستوعب أعضاء حسية الإشارات الخارجية وتنقلها بواسطة جهاز الاتصال العصبي إلى المخ. يفرز المخ هورمونات تؤثر مباشرةً على الأعضاء التناسلية التي تقوم برد فعلها بواسطة إفراز هورمونات أخرى (الرسمة ب - 5). نشرح تفاصيل هذه الأحداث في الفصل الثّالث الذي يبحث تكاثر الإنسان.

للم: بدعة

تأثير الضوء على الإزهار، انظروا الفصل السّادس، صفحات 115-116. تأثير الضّوء على وضع البيض والتّكاثر، انظروا الفصل السّابع، صفحة 147.



الرسمة ب -5: تنظيم واتصال في المراقبة على عمليات تكاثر الحيوانات

تؤثر الإشارات الخارجية بواسطة الهورمونات التي تُفرز من المخ على جميع الظواهر المتعلقة بالاستعداد للتكاثر، مثل: تغيُّرات في المظهر الخارجي، تحفيز وضع البيض وسلوكيات لبناء العش والغزل. في مرحلة الاعتناء بالنسل، تؤثر الهورمونات أيضًا على سلوكيات متعلقة بالاعتناء بالنسل، مثل: الركود، الحماية وافراز الحليب (في التَّدييات). عند الطيور وثدييات معينة، يشكِّل وجود القرين المناسب محفزًا خارجيًّا، حيث يؤثر على المخ ويؤدى إلى إفراز هورمونات.

تتم مراقبة التَّأثيرات المتبادلة بين المخ والأعضاء التّناسلية وافراز الهورمونات بواسطة آليات المردودية (التّغذية المرتدة) السّالبة والموجبة. للتذكير، في المردودية السّالبة، نتيجة العملية تُعيق استمرار العملية ذاتها. في المردودية الموجبة، يحدث العكس: نتيجة العملية تحفز العملية ذاتها. في الفصل الثّالث الذي يتناول عمليات تكاثر الإنسان، سوف تتعرفون على أمثلة لنوعي آليات المردودية (التّغذية المرتدة).

ب7. نظرة من منطلق النّشوء والارتقاء: تكاثر تزاوجي وتباين وراثي

نلاحظ في الطبيعة عادةً أنّ عدد الأفراد في جيل النّسل أكثر بكثير من عدد الأفراد في جيل الوالدين، مثلًا: قسم كبير من الحيوانات التي تضع بيوض كالأسماك والحشرات، تضع مئات وآلاف البيض في المرة الواحدة. ومعظم التّدييات أيضًا، تلد خلال حياتها أكثر من فردين لكلّ زوج من الوالدين. هذه الظاهرة معروفة في النّباتات أيضًا، حيث يُنتج كلّ فرد عددًا كبيرًا جدًا من البذور (في كلّ نبتة بندورة، يوجد ثمار كثيرة، وفي كلّ ثمرة يوجد بذور كثيرة). عندما تكون ظروف البيئة المحيطة ثابتة، يبقى عدد الأفراد في العشيرة ثابتًا تقريبًا مع مرور الأجيال وقسم كبير من الأفراد غير المناسبة، لا يبقى على قيد الحياة.

علاقة موضوع

بيولوجيا الإنسان: يتحقق الاتزان البدني في الجسم بواسطة آليات المراقبة والمردودية. الخلية - مبنى ونشاط: مردودية موجبة وسالبة في مراقبة نشاط الإنزيات.

ماذا يحدث عندما يطرأ تغيير في ظروف البيئة المحيطة؟ 📳

نَصف عشيرة معيَّنة مكوَّنة من أفراد تختلف عن بعضها قليلًا في صفاتها. من المعقول الافتراض أنّه إذا حدث تغيُّر في شروط البيئة المحيطة، نجد في العشيرة أفرادًا ذات صفات تُتيح لها البقاء على الرّغم من التغيُّر. هؤلاء الأفراد الملائمون لبيت التّنمية الذي تغيَّر، يستغلون موارد بيت التّنمية بنجاعة، ولديهم القدرة على الصّمود ومقاومة مسببات الأمراض والمتطفلات، وتستطيع الهروب من مفترساتها.

الأفراد التي بقيت على قيد الحياة، على الرّغم من التغيُّر، تتكاثر وتورث نسلها معلومات وراثية تشمل معلومات التي تساهم في بقائها على قيد الحياة. بعد مرور عدة أجيال، يزداد في العشيرة العدد النسبي للأفراد الذين يحملون تراكيب صفات تمنحهم القدرة على البقاء. بهذه الطريقة، ومع مرور أجيال كثيرة، يمكن أن تَنْتُم عشيرة فيها معظم الأفراد ملائمة للتغيُّر الذي حدث في البيئة المحيطة.

العملية التي وُصفت أعلاه - بقاء أفراد ملائمة للبيئة المحيطة - هي عملية الانتخاب الطّبيعي التي وصفها تشارلس داروين (Charles Darwin, 1809-1882) في كتابه "أصل الأنواع" الذي صَدر في سنة (1859-1859) في فترة داروين، ادعى باحثون في الطّبيعة ورجال دين أنّ الأنواع ثابتة في صفاتها وعددها منذ أن خُلق العالم. أما داروين فقد ادعى أن هناك عملية طويلة ومستمرة من التغيّرات العشوائية التي تنتقل بالوراثة، والكائنات الحيّة تتغيّر وتتطور أنواع جديدة. هذه العملية التي يتم فيها تطور تدريجي نسميها النّشوء والارتقاء. الانتخاب الطّبيعي هو الشّرح للطريقة التي تؤثر فيها البيئة المحيطة على بقاء أفراد معينة، أما الآخرون الذين يختلفون بصفاتهم والأقل ملاءمة للبيئة المحيطة فإنهم ينقرضون.

التّباين الوراثي هو "المادّة الخام" للنشوء والارتقاء. دون وجود تباين، عندما تكون جميع الأفراد متماثلة بجميع معلوماتها الوراثية، لا يحدث انتخاب طبيعي، لأنّ الانتخاب يتم بين الأفراد المختلفة فقط.

تطورت وتغيَّرت نظرية النّشوء والارتقاء، منذ أنْ نُشرت في القرن الـ 19، بفضل تراكم المعرفة وفهم العمليات الوراثية والجزيئية التي تحدث في الخلايا. على الرّغم من ذلك، نظرية النّشوء والارتقاء، هي النّظرية العلمية المقبولة والوحيدة التي تشرح تنوع الكائنات الحيّة وعمليات تغيُّراتها خلال العصور المختلفة.

تطور نظرية النّشوء والارتقاء والتّغيُّرات التي مرَّت بها خلال السّنوات المختلفة، يعرض ماهية العِلم وطريقة تراكم المعرفة العلمية.

لماذا يجب التّكاثر بطريقة التّزاوج؟

التّكاثر التزاوجي شائع جدًا، هذه الحقيقة أثارت سؤالًا حول حسناتها. العملية الخلوية ميوزا معقدة جدًا بالمقارنة مع الميتوزا. يحتاج التّكاثر التّزاوجي إلى أعضاء خاصة، وفي معظم الحالات، يجب أن تُبذل طاقة كثيرة لتطوير الأعضاء التّناسلية (مثل: الأزهار وغدد التّناسل)، للبحث عن قرين مناسب للتكاثر، للصراع بين الأفراد على القرين، لإنتاج خلايا تناسل كثيرة جدًا وللاعتناء بالنسل.

بالإضافة إلى ذلك، يوجد للتكاثر غير التّزاوجي أفضلية بالمقارنة مع التّكاثر التزاوجي: في التّكاثر غير التّزاوجي، من المعروف مسبقًا أنّ الفرد يشبه الوالدين في جميع الصّفات! إذن، ما هي أفضليات التّكاثر التّزاوجي؟ أمامكم إجابتان من بين الإجابات التي يقترحها الباحثون لهذا السؤال:

في التكاثر التّزاوجي يوجد تباين بين الأفراد، وهو يُتيح انتخاب طبيعي، نشوء وارتقاء سريع نسبيًا من خلال الملاءمة لظروف السئة المحمطة المتغرّرة.

علاقة بموضوع

علم البيئة: ملاءمة كائنات حيّة إلى البيئة المحيطة وأهميتها الرقاء

الفكرة المركزية

نظرية النشوء والارتقاء: تتغيَّر أنواع الكائنات الحية المختلفة تدريجيًا خلال الوقت (عصور) بسبب تأثير عوامل البيئة المحيطة الخارجية وعوامل داخلية. بَما أَنّه فِي التّكاثر التّزاوجي يشترك فردين، من المعقول أنْ نفترض أنّه عندما تكون طفرة ضارة عند أحدهما وعند الفرد الآخر يوجد جين سليم، فإنَّ الطفرة الضّارة لا يتم التّعبير عنها عند قسم كبير من الأفراد. بهذه الطّريقة عنع التّكاثر التّزاوجي من التّعبير عن طفرات ضارة (كذلك الأمر يكون مصير طفرة الصّفة التي تساهم في البقاء).

المواضيع الأساسية في هذا الفصل

في التّكاثر التّزاوجي، تَنْتُج أفراد تختلف عن بعضها وتختلف عن الوالدين أيضًا.

تَنْتُج الخلايا التّناسلية في أعقاب الميوزا.

معظم الأنواع التي تتكاثر بطريقة التّكاثر التّزاوجي، يوجد لديها نوعين من الخلايا التّناسلية (جاميتات): خلايا منوية صغيرة ذات قدرة على الحركة وخلايا بويضات كبيرة غير قادرة على الحركة الذاتية.

تتم مراقبة نشاط الجهاز التّناسلي بواسطة آليات تنظيم واتصال بفضلها يتم توقيت عمليات التّكاثر عند أفراد الجنسين، مما يزيد من احتمال الإلتقاء النّاجح بين الخلايا التّناسلية.

تؤثر إشارات خارجية (من البيئة المحيطة)، مثل: طول النَّهار ودرجة الحرارة على نشاط آليات التّنظيم والاتصال.

عِكن أن يتم الإخصاب - اتحاد الخلايا التّناسلية - في بيئة محيطة مائية أو رطبة فقط.

يتم الاخصاب الخارجي خارج الجسم والإخصاب الداخلي داخل الجسم.

يحتاج الجنين الذي يتطور من الزّيجوت إلى مواد تغذية وبيئة محيطة مائية محمية.

التّباين الوراثي بين أُفراد التّكاثر التّزاوجي، توجد له أهمية في بقاء العشيرة، وهو "المادّة الخام" للنشوء والارتقاء.

خُلالُ النِّشوء والارتقاء وتطور الأنواع التي تعيش في اليابسة، تطورت وسائل متنوعة لحماية الخلايا التّناسلية، حيث تمكِّنها من الالتقاء في بيئة محيطة مائية أو رطبة، كما تطورت وسائل تحمي الجنين من الجفاف.

المصطلحات المهمة في هذا الفصل

نشوء وارتقاء جنين

بيضة موسمية (موسم التكاثر)

مراقبة هورمونالية تكاثر تزاوجي

انتخاب طبیعي رحم اخصاب (خارجی، داخلی) تباین وراثی

ريجوت خلية بويضة

حیوان منوی خلیة منویة

بيئة محيطة مائية خلايا تكاثر (جاميتات، خلايا

تناسلية)



الفصل الثالث: التكاثر عند الإنسان

التكاثر جزء لا يتجزأ من حياة جميع الكائنات الحية ومن بينها الإنسان. على الرغم من ذلك، امتنعت ثقافات مختلفة عبر التاريخ من أن تبحث التكاثر عند الإنسان لأسباب دينية ولإتفاقات بين الثقافات. ليس في كل فترة ولا في كل مكان، رأى الإنسان أن هناك حاجة لفهم عملية تكاثرهم كعملية طبيعية وضرورية لاستمرار الحياة.

في انكلترا، في القرن التاسع عشر، منعت الإتفاقات في المجتمع من أن يذكروا، حتى في الرموز، علاقة جنسية بين رجال ونساء. نجد في كتاب ليدي جاوج (Lady Gough) من سنة 1863 الذي يتحدث عن الأخلاق والعادات أن "المضيفة الكاملة، تشدد على أن تفصل بين كُتب المؤلفين وكُتب المؤلفات، حيث تضعها على رفوف منفصلة".

في كتاب الفسيولوجيا الذي صَدَر في سنة 1866. دافع مؤلف الكتاب توماس هكسلي (Thomas) بشجاعة عن نظرية النشوء والارتقاء لداروين، لكنه لم يجرأ أن يتحدث في كتابه عن موضوع التكاثر.

خلال القرن العشرين، تطور الوعي تدريجيًا إلى أنَّ إخفاء عملية التكاثر، لا يخمد رغبة الإنسان في أن يعرف ويفهم، كيف تحدث تحدث هذه العملية في جسمه. بالإضافة إلى ذلك، وُجد أن أضرار الإخفاء كثيرة. لا نستطيع اليوم أنْ نتصور أنَّ هناك كتاب في موضوع بيولوجيا الإنسان، لا يتحدث ولا يصف مبنى وأداء الجهاز التناسلي.

ج1. مبنى جهاز التكاثر (الجهاز التناسلي)

خلال تطور الجنين، تتكون جميع أجهزة الجسم ومن بينها الأجهزة المتعلقة بالتكاثر. يمكن خلال الحمل أن غيز بواسطة الأمواج فوق صوتية (اولتراساوند) ما إذا الجنين فيه جهاز تكاثر ذكري أو أُنثوي. من المهم أن نذكر أنه أثناء الولادة نجد جهازًا كاملاً لأعضاء التكاثر في جسم كل وليد، لكن قسم منها لم تُكمل التطور.


يُتيح مبنى أعضاء التكاثر حدوث أربع عمليات تؤدي إلى عملية التكاثر:

- إنتاج خلايا تناسلبة (تكاثر).
- 2. إنتاج وإفراز هورمونات تُنظَم عمليات التكاثر.
- 3. إلتقاء الخلايا التناسلية للرجل مع الخلايا التناسلية للإمرأة.
 - 4. تطور الجنين في رحم المرأة.

سنتعرف على مبنى جهاز التكاثر عند الرجل والمرأة ونبيِّن كيف يُتيح المبنى حدوث هذه العمليات.

ج1.1 جهاز التكاثر عند المرأة

يقع جهاز تكاثر المرأة في فراغ البطن وهو يشمل أربعة أقسام أساسية: زوج مبيض، زوج أنابيب لنقل خلايا البويضة (فالوب)، الرحم والمهبل. يمكنكم مشاهدة جهاز التكاثر عند المرأة في الرسمة ج - 1.



الرسمة ج -1: جهاز التكاثر عند المرأة على اليمين: نطرة جانبيى، على اليسار: نظرة من الأمام


في المبيض، نجد خلايا تناسلية أولية وخلايا تُنْتِج هورمونات. الخلايا التناسلية الأولية موجودة في الجنين، لكن عند ولادة الطفل لا تكون ناضجة. في المستقبل، ينضج قسم منها ويتطور إلى خلايا بويضات. كل خلية بويضة في المستقبل تكون محاطة بطبقة واحد ةمن الخلايا. خلية البويضة والخلايا التي تُحيطها نسمِّيها جُرَيْب أولي. في كل مبيض جنين (أنثى)، يوجد حوالي ثلاثة ملايين جُرَيْب أولي. لكن معظم الجُريبات تضمر وقوت في الجنين قبل الولادة، وقوت معظم الجوريبات الأولى التي بقيت في السنوات الأولى من حياة الطفلة. وعندما تصل سن البلوغ يكون في مبيض الصبية حوالي 300,000 حتى 400,000 جُرَيْب أولي. فقط حوالي 400 منها تنضج مع خلايا البويضة التي ف يداخلها، أما باقي الجُريْبات الأولية فإنها تضمر وقوت مع مرَّ السنين.

بجانب كل مبيض، توجد فتحة تشبه قُمع لأنبوب ينقل خلايا البويضات. أما الفتحة من الطرف الثاني للأنبوب تكون في فراغ الرحم (الرسمة ج 1-). في الأنبوب الذي ينقل البويضة (الفالوب)، يتم تخصيب البويضة بواسطة الخلايا المنوية. انتبهوا! لا يوجد أي تلامس أو ربط بين المبيض وفتحة الفالوب.

الرحم هو عضو يقع في مركز الحوض، معدل طوله حوالي 7 سم ووزنه حوالي 50 غرامًا. مبنى الرحم ملائم لاستيعاب الجنين، لتغذيته، حمايته ولدعم تطوره. جدار الرحم مبني من طبقة عضلات سميكة وقوية (الرسمة ج - 1 اليسرى). الفراغ الداخلي للرحم مغلَّف بطبقة سميكة من الأنسجة الدقيقة الغنية بالأوعية الدموية والتي نسمِّيها طبقة الرحم الطلائية التي تفرز هورمونات مختلفة. الرحم مناسب لأداء وظيفته، لأنه أثناء الحمل يكبر عدة أضعاف، وبعد الولادة يعود إلى قياساته (حجمه) الأصلية. القسم السفلي للرحم مبني كممر ضيق نسمِّيه عنق الرحم. من عنق الرحم إلى خارج الجسم، يوجد أنبوب نسمِّيه المهبل (vagina) الذي عبره تدخل الخلايا المنوية ويخرج الوليد.

ج 2.1 جهاز التكاثر عند الرجل

يقع جهاز تكاثر الرجل في القسم السفلي من الحوض. يقع قسم منه في فراغ البطن والقسم الآخر خارجه. يشمل الجهاز ثلاثة مكونات أساسية: خصيتان، زوج من الأنابيب التي تنقل الخلايا المنوية، سوائل أخرى والقضيب. يشمل جهاز التكاثر عند الرجل غدد أيضًا، سنتعرف على هذه الغدد لاحقًا. يمكنكم مشاهدة جهاز التكاثر عند الرجل في الرسمة ج - 2.



الرسمة ج - 2: جهاز التكاثر عند الرجل، على اليمين: نظرة جانبية، على اليسار: مقطع طولي في الخصية.

الخصيتان هما عضو تَنْتُج فيهما الخلايا التناسلية الذكرية. تقع الخصيتان في كيس خارج فراغ البطن. عندما يولد الوليد، نجد في خصيتيه خلايا أولية تنقسم وتتمايز إلى خلايا منوية، ابتداءً من سن البلوغ وخلال كل حياته البالغة. خلال الحمل، تتطور خصيتي الجنين في فراغ البطن، لكن تنزل إلى كيس اخصيتان قبل الولادة بقليل، عندما يصل الجنين الذكر إلى نهاية تطوره. درجة الحراة، في كيس الخصيتين الموجود خارج فراغ البطن، أقل من درجة الحرارة داخل الجسم وهي تصل إلى ℃35 فقط، وهذه درجة الحرارة المُثلى لعملية إنتاج الخلايا المنوية في الإنسان (وفي ثدييات أخرى كثيرة). في درات حرارة أعلى من ذكك، مثلًا: في درجة حرارة الجسم بين ℃36.5 إلى ℃36.9، يتضرر إنتاج الخلايا المنوية.

جدير بالمعرفة

الخصوبة والحياة في العصر الحديث

وُجد في الأبحاث أن خصوبة الرجال انخفضت بشكل ملحوظ خلال آخر خمسون سنة. هناك عدة يفترض البحثون عدة عوامل لهذا الانخفاض، قسم منها يخضع لسيطرتنا والقسم الآخر، لا يخضع لسيطرتنا. من بين العوامل التي تخضع لسيطرتنا: الأشعة المنبعثة من الهواتف واحواسيب النقال، لباس ملابس ضيقة تضغط وتقرِّب الخصيتين إلى البطن، حيث تؤي إلى ارتفاع درجة حرارة الخصيتين، تدخين سجائر ومخدرات. لا نعرف حتى الآن ما إذا إصابة الخلايا المنوية بهذه العوامل الخصيتين، تدخين سجائر ومخدرات. لا نعرف الخلايا المنوية تَنتُج كل يوم، قد يعود إنتاج الخلايا المنوية السليمة إلى ما كان إذا أبعدنا العوامل التي تؤدي إلى ضرر في إنتاج الخلايا المنوية، مثل: لباس ملابس غير ضيقة ولا تضغط على الخصيتين والامتناع من تدخين السجائر والمخدرات. من لبين العوامل التي تؤذي الخصوبة والتي لا تخضع لسيطرتنا هي: تلوث الهواء الناجم من انبعاث غازات من وسائل النقل والمصانع، إشعاع أنواع أشعة مختلفة (أشعة أمواج راديو، أشعة كال وأشعة عازات من وسائل النقل والمصانع، إشعاع أنواع أشعة مختلفة (أشعة أمواج راديو، أشعة كال وأشعة وأصباغ طعام تُضاف إلى المواد الغذائية التي تتم معالجتها.

كل خصية مبنية من عدد كبير جدًا من الأنابيب الدقيقة، الطويلة جدًا والملتوية التي تَنْتُج فيها الخلايا المنوية، بين الأنابيب يوجد خلايا تُنْتج هورمونات ذكرية. تتحد الأنابيب في أطرافها إلى أنبوب واحد يخرج من الخصية. المقطع الأول منه، يقع خارج الخصية ونسمِّيه بربخ الخصية. في هذا القسم الطويل (حوالي 5 أمتار!) الملتوى جدًا، تتجمع الخلايا المنوية التي نتَجت في أنابيب الخصية. استمرار هذا الأنبوب نسمِّيه أنبوب ينقل الخلايا المنوية وهو يخرج من كيس الصفن للخصيتن. يتحد الأنبوبان اللذان ينقلان الخلايا المنوية من الخصيتين إلى أنبوب خروج مشترك نسمِّيه القناة البولية التناسلية التي تصل فتحة القضيب. أثناء الممارسة الجنسية، تخرج عبر هذه الفتحة الخلايا المنوية الموجودة داخل السائل المنوى. يتم تصريف جهاز البول إلى القناة البولية التناسلية أيضًا، لكن الخلايا المنوية والبول لا يخرجان في نفس الوقت، لأنه أثناء القذف، يتم تفعيل عضلة تؤدي إلى اغلاق عنق مثانة البول وهكذا منع إفراز البول. يقع القضيب خارج فراغ الجسم فوق الخصيتين وهو مكوَّن من أنسجة اسفنجية غنية بأوعية دموية وفي طرفه يتوسع القضيب، حيث نسمّيه تاج القضيب الغنى بخلايا حساسة للتلامس الجنسي. هذه المنطقة مغلفة بجلد مطوى نسمِّيه الجلدة التي نزيلها أثناء الطهور.



📢 سؤال ج - 1

قارنوا (من الأفضل بواسطة جدول) بين جهازي التكاثر عند الرجل والإمرأة. تطرقوا إلى جهازي التكاثر وإلى وظائفها.

ج2. من الولادة حتى البلوغ

يول كل طفلة وطفلة مع أعضاء تناسلية كاملة نسمِّيها دلالات أو علامات جنسية أولية: في الطفل - خصيتان وقضيب وفي الطفلة مبيض، رحم ومهبل. على الرغم من ذلك، أثناء الولادة لا توجد، في جسم الطفل والطفلة، خلايا تناسلية ناضجة للإخصاب. في مبيض الطفلة (وبعد ذلك عند البنت)، يوجد جُرَيْبات أولية في كل منها بويضة غير جاهزة للإخصاب، وفي خصيتي الطفل (وبعد ذلك عند الولد)، يوجد خلايا تتطور في المستقبل إلى خلايا منوية.

تحدث تغيُّرات كبيرة عند البنين والبنات في سن البلوغ. غير معروف حتى الآن، ما هو الحدث الأول الذي يُثير الانتقال من الطفولة إلى سن البلوغ.

ج1.2 التغيّرات الجسمانية في سن البلوغ

يتم التعبير عن العلامات الأولى لسن البلوغ من خلال ظهور تغييرات جسمانية نسمِّيها علامات جنسية ثانوية. هذه التغيُّرات في شكل الجسم وعلامات خارجية أخرى تُميِّز الجنس (ذكر أو أنثى).


العلامات الجنسية الثانوية عند الشباب: تغيُّر الصوت، حيصتْ يصبح منخفض (نتيجة لإستطالة الأوتار الصوتية)، استطالة عظام الجسم والعضلات، تزداد وتيرة النمو بشكل كبير جدًا وينمو شعر على الوجه، تحت الآباط وعلى الفخذ (عند قسم من الشباب، ينمو الشعر على الصدر، الذراعين والأرجل أيضًا). العلامات الجنسية الثانوية عند الشابات: تطور الثدى ومو الشعر تحت الآباط وعلى الفخذ.

عادة في الأشهر الأولى من بداية البلوغ، يزداد نهو الشابات بوتيرة كبيرة جدًا، لكن بعد ظهور الحيض الأول، تصبح وتيرة النمو بطيئة حتى تتوقف. تتطور عادة عند الشابات، بمقدار مختلف، طبقة دهنية تحت الجلد في مناطق مختلفة في الجسم. يُشير تطور العلامات الجنسية الثانوية إلى عملية داخلية، حيث يتم التعبير عنه بواسطة إفراز هورمونات جنسية وبإنتاج خلايا تناسلية ناضجة تستطيع أن تشترك في الإخصاب. جميع العمليات الداخلية والتغيُّرات الخارجية التى ترافقها نسمِّيها بلوغًا جنسيًّا.

من المهم إبراز الحقيقة أن البلوغ الجنسي وتطور العلامات الجنسية الثانوية مشتركة لجميع بنو البشر-

لكن توجد فروق كبيرة بين الأفراد. السن الذي تظهر فيه العلامات الجنسية يحتلف من فرد إلى آخر، كما أن جميع علامات البلوغ، لا يتم التعبير عنها بنفس الشكل أو أنها تحدث بنفس الوتيرة عند الجميع. إنَّ تطور العلامات الجنسية الثانوية هو تغيير خارجي للتغيُّرات الداخلية، حيث يتم التعبير عنها بالأساس بإزدياد إفراز يتم التعبير عنها بالأساس بإزدياد إفراز هورمونات في المخ من الهيبوثالموس والغدة النخامية (الرسمة ج - 3).

يربط الهيبوثالموس بين المخ والغدة النخامية التي توجد لها وظيفة مركزية في تنظيم ومراقبة إفراز الهورمونات في جهاز الإفراز الخارجي. في سن البلوغ، يبدأ الهيبوثالموس




الرسمة ج-3: مكان الهيبوثالموس والغدة النخامية في المخ

في إفراز هورمون نسمِّيه GnRH (الإختصار بالإنجليزية: Gonadotropin Releasing Hormone). معنى هذا الهورمون أنّه يؤدي إلى إفراز هورومونات نسمِّيها **جونادوتروبينات (هورمونات المنسل):** الجونادوتروبينات هي هورمونات تؤثر على المبيض والخصيتان التي نسميها بالإنجليزية جونادوت (منسل) (الرسمة ج - 4).

يصل الـ GnRH مباشرةً إلى الغدة النخامية وهو يؤثر على القسم الأمامي للغدة النخامية التي تفرز هورموني مورمون يُثير الجُرَيْب - FSH (اختصاره بالإنجليزية: Follicle Stimulating Hormone) وهورمون الإباضة - LH (اختصاره بالإنجليزية: Luteinizing Hormone) والذي يُسمَّى هورمون الإصفرار أيضًا. كرد فعل للهورمونين، تفرز الأعضاء التناسلية هورمونات جنسية عند المرأة، يفرز المبيض بالأساس استروجن وبروجسترون، وعند الرجل، تفرز الخصيتين بالأساس طوسطسطرون.

الهورمونات الجنسية التي يتم إفرازها إلى الدم، تؤثر على الخصيتين والمبيض اللذان في خلاياهما توجد مستقبلات لهذه الهورمونات.

في أعقاب النشاط الهورمونالي، يبدأ إنتاج خلايا تناسلية صالحة




الرسمة ج-4: العوامل التي تؤثر على البلوغ الجنسي

للإخصاب عند الشباب، أما عند الشابات، يبدأ نضوج الجُرَيْب الذي فيه بويضة قبل ظهور دورة الحيض (الدورة الشهرية).

الهورمونات الجنسية التي يتم إفرازها في الدم، تؤثر على خلايا الهيبوثالموس والغدة النخامية أيضًا التي في خلاياها توجد مستقبلات لهذه الهورمونات.

معظم الوقت، تفعل الهورمونات الجنسية تغذية مرتدة (مردودية) سالبة على المخ (الرسمة ج - 5): عندما يرتفع مستواها في الدم، ينخفض إفراز الهورمونات في الهيبوثالموس والغدة النخامية، ونتيجة لذلك، ينخفض مستوى الهورمونات الجنسية في الدم. من هنا ينبع أن إفراز GnRH والهورمونين FSH و LH يتأثر من مستوى الهورمونات الجنسية في الدم.



الرسمة ج-5: تغذية مرتدة سالبة بين المخ والأعضاء التناسلية انتهوا! المردودية السالبة الموصوفة في الرسمة متماثلة عند الشباب والشابات.

علاقة بالموضوع

بيولوجيا الإنسان: تأثير الهورمونات على الأعضاء المستهدفة. الخلية - مبنى ونشاط: مستقبلات في غشاء الخلية. تُفرز نفس الهورمونات من الغدة النخامية عند الرجل والمرأة. على الرغم من أن الهورمونات متماثلة، إلا أنها تؤدي إلى عمليات مختلفة تمامًا عند كل جنس من الجنسين (الذكر والأنثى)! يعتمد الشرح لذلك على الحقيقة أن تأثير الهورمون، لا يتعلق بالهورمون ذاته، بل بالعضو الذي يؤثر عليه أيضًا. يختلف رد فعل أنسجة الخصيتان للهورمونين FSH و H بالمقارنة مع رد فعل المبيض لهذين الهورمونين. عند الشباب، بعد أن يبدأ نشاط الهيبوثالموس، يستمر هذا النشاط بشكل متواصل وثابت خلال حياتهم وهو مراقب بواسطة التغذية المرتدة السالبة. أما عند الشابات، يتم كل من النشاط في الهيبوثالموس وفي أعقابه في الغدة النخامية بشكل دوري وهي توجّه سيرورة دورة الحيض. تتم مراقبة هذه النشاطات بواسطة التغذية المرتدة السالبة والتغذية المرتدة الموجبة.

🐔 جدير بالمعرفة

على الرغم من أن إفراز ونشاط الهورمونين LH وَ FSH يتم عند المرأة والرجل، إلا أن أسماءهما متعلقة بتأثيرهما على جهاز التكاثر عند المرأة. LH هو هورمون يؤدي إلى إنتاج الجُسَيم الأصفر وَ FSH هو هورمون يُثير تطور الجُرَيْب.

🥤 سؤال ج-2

- أ. الغدة النخامية، الخصيتان والمبيض، هي غُدد تفرز هورمونات وهي أعضاؤ مستهدفة أيضًا. الشرحوا.
 - ب. إذا تابعنا مستوى الطوسطسطرون في دم الرجال، فإننا نجد أن مستواه ثابت من سن البلوغ لسنوات طويلة. كيف يمكن شرح ذلك بناءً على المسجَّل أعلاه؟

ج2.2 الخلايا المنوية: إنتاج، تطور ومبنى

إنتاج الخلايا المنوية

الخلية المنوية هي الجاميتا الذكرية. يبدأ إنتاج الخلايا المنوية في خصيتين الذكر في سن البلوغ فقط. إنتاج الخلايا المنوية متواصل وليس دوري. يُنتج الرجل البالغ حوالي 50-70 مليون خلية منوية كل يوم! يستمر الرجل في إنتاج الخلايا المنوية معظم حياته البالغة، لكن تنخفض كميتها وجودتها مع مرَّ السنين.

يتم تنظيم إنتاج الخلايا المنوية ونضوجها بواسطة هورمونات جنسية يفرزها الجسم في سن البلوغ. كما ذكرنا، كرد فعل للهورمونين FSH و LH اللذان يُفرزان من الغدة النخامية، تبدأ الخصيتان في إنتاج وإفرازز هورمونات جنسية ذكرية، المعروف من بينها الطوسطسطرون. يؤثر الطوسطسطرون على ظهور العلامات الجنسية الثانوية عند الشباب ويبدأ إنتاج الخلايا المنوية والسائل المنوى.


إنتاج الخلايا المنوية معقد جدًا وهو يحدث بشكل متواصل كل ساعات اليوم. في جدران أنابيب الخلايا المنوية في الخصيتان، يوجد خلايا غير متمايزة تمر عدة انقسامات ميتوزا متواصلة. الخلايا التي نحصل عليها هي خلايا منوية أولية تمر بعملية انقسام ميوزا، حيث نحصل في نهايتها على خلايا هيبلوئيدية تتطور تدريجيًا إلى خلايا منوية ناضجة (الرسمة ج - 6).

خلال عمليات الإنقسام، يتم دفع الخلايا باتجاه فراغ أنابيب الخلايا المنوية حتى تنفصل من جدران الأنابيب. تتحرك الخلايا الهيبلوئيدية على طول أنابيب الخلايا المنوية وتنتقل إلى بربخ الخصيتين.

عند انتقال الخلايا الهيبلوئيدية على طول بربخ الخصيتين، تمر الخلايا بعمليات نضوج. في نهاية العملية، نحصل على خلايا منوية ناضجة ذات قدرة على الحركة المستقلة. الخلية الديبلوئية التي تبدأ العملية، تتطور إلى خلية منوية (هيبلوئيدية) ناضجة خلال حوالي 70 يومًا.

يتم تخزين الخلايا المنوية الناضجة في بربخ الخصيتين حتى إطلاقها من الجسم عبر فتحة القضيب. تخرج الخلايا المنوية من الجسم داخل سائل يَنْتُج في غدد مساعدة: البروستتا، مثانتي السائل المنوي وغديُّ كاوبر. يتم تصريف إفرازات الغدد المساعدة إلى داخل أنبوب ينقل الخلايا المنوية.

على ما يبدو، وظيفة السائل متعلقة بنضوج الخلايا المنوية، بشطفها في جهاز التكاثر عند الرجل، بتزيتها



الرسمة ج -6: إنتاج خلايا منوية من الخصيتان، مقطع عرضي في أنابيب الخلايا المنوية، حيث من اليمين إلى اليسار: مقطع طولي من الخصيتان، مقطع عرضي في أنابيب الخلايا المنوية، مبنى الخلية المنوية (طولها حوالي 60 ميكرومتراً) تُبِينُ مراحل مختلفة لإنتاج الخلايا المنوية، مبنى الخلية المنوية (طولها حوالي 60 ميكرومتراً)



وفي إنتاج ظروف مناسبة لوجودها في تاجهاز التكاثري عند المرأة. الخلايا المنوية التي لا تُطلق من جسم الرجل، تتحلل ويمتصها الجسم، وخلايا جديدة تحل مكانها.

مبنى الخلية المنوية

تتميَّز الخلية المنوية بمبناها في الرأس والذنب (الرسمة ج-6). مبنى الخلية المنوية مناسب لوظيفته ويُتيج له الوصول إلى خلية البويضة في جسم المرأة لكي يخصبها. يمتلئ معظم حجم رأس الخلية المنوية بنواة الخلية المخزونة فيها المادة الوراثية. في مقدمة الرأس، يوجد حوصلة نسميها أكروزوم وفيها مركزة إنزيات تعمل في مرحلة الإخصاب. يحرك الذنب الخلية المنوية في بيئة محيطة رطبة داخل جسم المرأة. في "الرقبة" - المنطقة التي تقع بين الرأس وبين ذنب الخلية المنوية، مركزة فيها ميتوكندريا كثيرة، لكي تُستخرج فيها طاقة تُستخدم للحركة القوية للذنب. تصل سرعة حركتها حوالي 1-4 مليمتر في الثانية.

الفكرة المركزية

ملاءمة بين المبنى والوظيفة: مبنى الخلية المنوية ملائم للحركة السريعة والإخصاب.

جدير بالمعرفة

الاحتلام


في بداية سن البلوغ، يشعر شباب كثيرون بحدث فيه ارتباك، على الرغم من أنه ظاهرة عادية تمامًا. في الفترة الأولى من إنتاج الخلايا المنوية، عندما يبدأ إفراز سائل من الغدد، يحدث في أعقاب التراكم الزائد للخلايا المنوية في بربخ الخصية أن ينطلق سائل الخلايا المنوية أثناء نوم الشاب دون أن يشعر بذلك. يخاف قسم من الشباب من أنهم يبولون أثناء نومهم، ويعتقد قسم آخر أن لديهم مشكلة بسبب إفراز الخلايا المنوية أثناء نومهم. على الرغم من ذلك، هذه الظاهرة عادية تمامًا وتتوقف مع مرور الوقت، لذا لا داعى للقلق.

ج3.2 خلية البويضة: تطور ومبنى

خلية البويضة هي الجاميتا الأنثوية. هناك من يسمِّي خلية بويضة الإنسان "بويضة". في هذا الكتاب، نستعمل المصطلحين. كما ذكرنا، أثناء الولادة نجد مئات آلاف البويضات غير الناضجة في مبيض الطفلة. توجد طبقة خلايا حول كل بويضة غير ناضجة. هذا المبنى للبويضة التي تحيطها طبقة من الخلايا نسمِّيه جُرِّ نُّ أولى.


ابتداءً من البلوغ الجنسي وبسبب التأثير الهورمونالي الذي يُفرز من الهيبوثالموس (GnRH) والغدة النخامية (LH-1 FSH)، تتطور عدة جُرَيْبات، لكن على الاغلب، في كل شهر، جُرَيْب واحد فقط، يصل نهاية عملية النضوج. أما باقي الجُرَيْبات التي بدأت في النضوج فإنها تضمر. تتطور البويضة الموجودة في الجُرَيْب، يكبر حجمها وتتراكم فيها مواد غذائية إدخارية - الصفار. حول كل بويضة يَنتُج غلاف لا يحتوي على خلايا نسميه غلافاً شفافاً. تنقسم الخلايا الموجودة حول الجُرَيْب وقَنتُج عدة طبقات خلايا، وفي داخل الجُرَيْب الذي يتطور يَنْتُج فراغ ملي، في السائل. في هذه المرحلة، نسميه جُرَيبًا ناضجًا، يزداد ضغط السوائل الموجودة في الجُريب حتى يفتح الجريب.

يصب السائل الذي في داخله إلى فراغ البطن وتخرج البويضة الناضج من المبيض (مع طبقة الخلايا الموجودة حولها). هذه المرحلة نسميها مرحلة الإباضة. من خلايا الجُرَيْب الذي بقي في المبيض، يتطور مبنى نسميه جُسَيم أصفر، نشرح وظيفته فيما بعد. تصف الرسمة ج - 7 مراحل نضوج الجُرَيْب في المبيض والإباضة. من الجدير أنْ نذكر أنّ قسمًا من النساء تُميِّز مرحلة الإباضة بواسطة آلام حادّة وقصيرة أو تشعر بثقل في أسفل البطن.



الرسمة ج -7: نضوج جُرَيْب في المبيض وإباضة التبهوا! الأسهم في الرسم التخطيطي، لا تُشير إلى حركة، بل إلى ترتيب الأحداث.

تعرض الرسمة ج - 8 مراحل تطور خلية البويضة بالموازاة لتطور الجُرَيْب. أثناء الولادة، خلايا البويضات في أخط الأمتواء لا تكون ناضجة. وهي موجودة في مرحلة الإنقسام الأول للميوزا، بعد تنظيم الكروموسومات في خط الأستواء (انظروا الرسمة أ - 4 في صفحة 16). ابتداءً من سن البلوغ، كل شهر، في خلية البويضة لأحد الجُرَيْبات الناضجة، تتجدد عملية الميوزا التي بدأت في الفترة الجينيية. في هذه المرة أيضًا، لا تصل العملية إلى النهاية: ينتهي الإنقسام الئاول لليموزا فقط. في نهاية العملية الأولى للميوزا، نحصل في خلية البويضة على نواتين في كل واحدة منهما نصف عدد الكروموسومات التي كانت في الخلية (n كروموسومات). نجد الخلية التي فيها نواتان في الجُريْب الناضج وهي لا تنقسم إلى خليتين. تبقى إحدى النواتين في الخلية، وهذه الخلية هي خلية البويضة التي تخرج من المبيض أثناء الإباضة. النواة الثانية نسميها جُسيم قُطب وهي تخرج من خلية البويضة من الجُريب في المبيض، تبدأ في خلية البويضة عملية الانقسام الثانية للميوزا، لكن هذه العملية أيضًا، لا تصل إلى النهاية. تصل عملية الانقسام الثانية للميوزا إلى نهايتها، فقط عندما تكون خلية البويضة في الأنبوب الذي ينقل خلايا البويضة (قناة فالوب) وبشرط أن تخترقها خلية منوية. في عملية الإنقسام الثانية للميوزا، ونتيجة لذلك تَنتُج جُسَيْم قُطب أيضًا، وعلى الأغلب، جُسَيم القطب خلية منوية. لكنها تضمر وتهوت.



الرسمة ج -8: مراحل تطور خلية البويضةة في الجُرَيْب. على اليمين: نضوج جُرَيْب في المبيض، على اليسار: مراحل الميوزا في خلية البويضة.

انتبهوا! توجد عدة فروق بين إنتاج خلية تناسلية ناضجة في المرأة وبين إنتاج خلية تناسلية ناضجة عند الرحل:

تلد الطفلة مع خلايا بويضة غير ناضجة، أما الطفل فإنه يلد مع خلايا تنقسم في المستقبل وتتمايز إلى خلايا منوبة.

عند النساء، تبدأ عملية الميوزا في المرحلة الجنينية، وتنتهي مع الإخصاب فقط (قد تتم عملية الميوزا بعد مرور 40 سنة أيضًا). أما عند الرجال، تنضج الخلية المنوية خلال 70 يومًا تقريبًا.

توجد دورية عند النساء: في كل شهر، تبدأ عدة خلايا بويضات فقط في النضوج. وفقط واحدة منها تصل النضوج. عند الرجال، عملية إنتاج الخلايا المنوية مستمرة وتبدأ في سن البلوغ وتستمر حتى الشيخوخة.

عند النساء بالموازة لعملية نضوج كل خلية بويضة واحدة، تَنْتُج جُسَيْمات قُطب أيضًا وتضمر. أما عند الرجال، من كل خلية منوية أولية تمر ميوزا، نحصل على أربع خلايا منوية.

ج3. دورة الحيض

في أعقاب التغيُّرات الهورمونالية التي تبدأ في سن البلوغ، في كل شهر، تبدأ عمليات في المبيض والرحم تهدف إلى استيعاب الجنين. جميع هذه العمليات نسمِّيها دورة الحيض (الدورة الشهرية). في هذه العملية التي معظمها مخفية عن أنظارنا، يشترك المخ، المبيض والرحم. العبير الخارجي لحدوث هذه العمليات هو الظهور الأول لنزيف دم الحيض. منذ هذه اللحظة، تعود عمليات دورة الحيض كل شهر خلال السنوات حتى سن 50 سنة تقريبًا، ومن هنا جاء اسم "الدورة الشهرية".

تشمل الدورة الشهرية عمليتين مركزيتين:

نضوج خلية البويضة في المبيض وخروجها منه - إباضة.

تحضير الرحم لاستيعاب الجنين.

تتم مراقبة دورة الحيض بواسطة نشاط هورمونالي دوري يحدث في الهيبوثالموس، الغدة النخامية، المبيض والرحم. تعرض الرسمة ج - 9 التغيُّرات التي تحدث في المبيض والرحم خلال دورة مدتها 28 يومًا ومستوى الهورمونات في الدم، في هذه الفترة. تمّ الوصف بحسب تسلسل أيام الدورة الشهرية. انظروا إلى الرسوم البيانية والرسومات التوضيحية خلال قراءة الوصف. انتبهوا، رقمنا المراحل في النص والرسمة أيضًا.

الأيام 1-5

اليوم الأول الذي يتم فيه نزيف دم الحيض نحدِّده بشكل عشوائي على أنه اليوم الأول للدورة الشهرية، لأن هذا الحدث يمكن تمييزه بسهولة. لكن كما ذكرنا، نزيف دم الحيض هو تعبير خارجي فقط لعمليات داخلية كثيرة.

في الأيام الأولى من الدورة، أثناء نزيف دم الحيض، يطرأ ارتفاع طفيف في إفراز اله FSH واللهام الأولى من الغدة النخامية (بتأثير GnRH) (1). في هذه الفترة، يكون مستوى الهورمونين الجنسيين إسترجون وبروجسترون (اللذان مصدرهما من المبيض) منخفضًا. في هذه الأيام، تُحفظ مستويات الهورمونات بمستوى منخفض نسبيًا بسبب آليات التغذية المرتدة السالبة التي تُنظّم إفرازها (الرسمة ج - 5).

بَفضل تأثير الـ FSH (الهورمون الذي يُثير الجُريب) والـ LH، تبدأ في أحد المبيضات، عدة جُرَيْبات أولية بالتطور (2)، لكن أحد هذه الجُرَيْبات يستمر في التطور والجُرَيْبات الأخرى تضمر وتموت.

الأيام 6-14

خلال الأيام القادمة، يستمر تطور الجُرَيْب ونضوج خلية البويضة. في اليوم السادس تقريبًا، يبدأ الجُرَيْب بإفراز إستروجن، حيث يرتفع مستواه في الدم (3).

عندما يصل الإستروجن الرحم، فإنّه يحفّز بداية نهو طبقة الرحم الطلائية (4). تصبح الطبقة سميكة جدًا، وتنمو إلى داخلها شعيرات دم كثيرة من جدار الرحم. وهكذا عر الرحم بعملية تحضير لاستيعاب الجنين داخله. يزداد إفراز الإستروجن من الجُرَيْب الذي يتطور. عندما يصل الإستروجن مستوى الذروة في الدم، فإنّ مستواه العالي يؤثر على الغدة النخامية بتغذية مرتدة موجبة، حيث يؤدي ذلك إلى إفراز الهورمونين LH و FSH لفترة زمنية قصيرة (5)، اللذان يحفزان المبيض. هذا الوضع نسميه "الذروة". في اليوم الله البحريب، وإلى نشاط إنزيات التحليل التي تؤدي إلى انفجار غشاء الجُرَيْب، حيث يؤدي ذلك إلى انطلاق خلية البويضة (من المبيض)، التي تحيطها طبقة خلايا. هذه العملية نسميها إباضة (6). تصل خلية البويضة إلى أنبوب ناقل خلايا البويضة المستعدة للإخصاب خلال حوالي 24 ساعة. إذا وصلت، خلال هذه الفترة، خلية منوية إلى خلية البويضة الإنقسام الثاني منوية إلى خلية البويضة، ودخلت عبر غشاء خلية البويضة، ينتهي في خلية البويضة الإنقسام الثاني الميوزا (الرسمة ج - 8) وهكذا يتم الإخصاب.

الأيام 14-28

بعد الإباضة، الجُرَيْب الذي خرج في أعقاب التركيز العالي للهورمون LH يبقى دون خلية البويضة، لكنه يستمر في أداء الوظيفة. يبقى في المبيض، يتم إغلاق الفتحة ويمتلئ بمادة دهنية صفراء. في هذه الحالة، الجُرَيْب الذي خَرَج نسميه جُسيم أصفر (7) (ومن هنا جاء اسم الهورمون LH الذي يُثير الإباضة - مينون الله في ال

مستويات نسبية لهورمونات الغدة LH الْنُخُامِية في الدم **FSH** ىنشَّطِ FSH وَ LH تؤدى ذورة ال تطور الجُرَيْب LH إلى الإباضة التغيُّرات التي تطرأ في المبيض إباظة يفرز الجُسَيْم الأصفر يرتفع مستوى الإستروجن المنطلق من الجُرَيْب بروجسترون وطوسطسطرون بروجسترون مستويات نسبية لهورمونات المبيض في الدم إستروجن يحفز البروجسترون يحفز الإستروجن بداية نمو طبقة والإستروجن استمرار نمو الرحم الطلائية طبقة الرحم الطلائية التغيُّرات التي تحدث في طبقة الرحم الطلائية 15

الرسمة ج -9: مستويات هورمونات في الدم والتغيُّرات في المبيض والرحم خلال دورة الحيض

هورنون الإصفرار"). يُفرز الجُسَيْم الأصفر إلى الدم هورمونين: بروجسترون وإستروجن (8). يحفز البروجسترون نمو إضافي لطبقة الرحم الطلائية كتحضير لاستيعاب خلية البويضة المخصبة. وفي نفس الوقت، يصل مع تيار الدم إلى الغدة النخامية والهيبوثالموس ويفعِّل هناك تغذية مرتدة سالية. تؤدي هذه التغذية المرتدة إلى إعاقة (تثبيط) إفراز FSH وَ LH من الغدة النخامية، وهكذا نمنع، في هذه الأيام، من تطور جُرَيْبات أولية إضافية حتى نهاية الدورة الشهرية. لكن تثبيط الإفراز ليس مطلقا: يىقى مستوى منخفض جدًا لا LH في الدم، وهو ضروري لاستمرار أداء الجُسَيم الأصفر. إذا تمَّ تخصيب خلية البويضة الموجودة في الفالوب بواسطة خلية منوية ويتطور حمل، يستمر الجُسَيم الأصفر في إفراز البروجسترون الذي منع نزيف دم الحيض ويُتيح سيرورة سليمة للحمل في المراحل الأولى. إذا لم يحدث إخصاب، تتحلل خلبة البويضة خلال حوالي 48 حتى 72 ساعة بعد الإباضة، يتقلص الجُسَيم الأصفر، يضمر ويتوقف عن إفراز البروجسترون تدريجيًا. يؤدى انخفاص مسوى البروجسترون في الدم إلى تحليل وتساقط طبقة الرحم الطلائية (9) التي تطورت في جدار الرحم كتحضير لاستيعاب الجنين. تحتوي طبقة الرحم الطلائية المنطلقة على شعيرات دم غنت داخلها خلال الدورة الشهرية. بقايا طبقة الرحم الطلائية وشعيرات الدم هي نزيف دم الحيض.

بالموازة الإضمرار الجُسَيْم الأصفر، وقبل نزيف دم الحيض، يؤدي انخفاض مستوى البروجسارون والأستروجن إلى إبطال التغذية المرتدة السالبة التي تمَّ تفعيلها على المخ ويتجدد إفراز الهورمونن FSH وَ LH من الغدة النخامية. يحفز هذا الإفراز مجموعة جديدة من الجُرَيْبات الأولية التي تبدأ في التطور مع قدوم دورة الحيض.



3- سؤال ج

تَمُّنوا في الرسمة ج - 9 واقترحوا طريقة تمنع الإباضة بواسطة إضافة هورمونات بطريقة اصطناعية. اشرحوا إقتراحاتكم.



4-ھۇال ج

أمامكم عبارات تصف أحداث دورة الحيض.


أ. أكملوا الكلمات الناقصة في العبارات.

ب. رتّبوا العبارات بحسب حدوثها أثناء دورة الحيض.

قائمة العبارات

ارتفاع مستوى _____ وَ ____ في الدم، يُعيق إفراز LH وَ FSH. قبل منتصف الدورة بقليل، يرتفع مستوى _____ في الدم ويؤدي إلى ارتفاع حاد في _____ ____ الذي يُفرز من الهيبوثالموس يحفز الغدة النخامية على إفراز ___ وَ____ الروجسترون والإستروجن اللذان يُفرزان من ال___، يُحفظان على طبقة الرحك الطلائية خلال مدة زمنية معينة. ____ الذي يحدث في منتصف الدورة الدموية، يؤدي إلى ____ وبعد ذلك إلى تكوين جُسَيْم أصفر. يُنشِّط الـ FSH والـ LH كل من الـ_____، الـ____، الـ____ والـ____.

تصف الرسمة ج -10 المراقبة بواسطة إفراز هورمونات بواسطة دوائر تغذية مرتدة موجبة وتغذية مرتدة سالبة التي تفعِّلها الهورمونات ذاتها. من المهم الانتباه إلى تعقيد التظيم الهورمونالي وبالأساس إلى التأثيرات المختلفة للإستروجن.





جدير بالمعرفة

مدة الدورة الشهرية

تستغرق الدورة الشهرية بمعدل حوالي 28 يومًا، لكن عند الفتيات والنساء، يوجد انحراف بارز عن هذا المعدل. في الفترة الأولى من البلوغ، الدورة الشهرية لا تكون منتظمة عادةً. بعد مرور سنتين على ظهور الدورة الشهرية الأولى، يمكن أن تكون أشهر دون إباضة ويمكن أن تكون ذورات شهرية بطول مختلف، من 25 حتى 35 يومًا وجميعها في إطار الحالات السليمة. فيا بعد، يمكن أن تظهر تشويشات في الدورة الشهرية، في حالات مختلفة، في شروط الحياة، مثل: الخدمة العسكرية، الجهد الجسماني أو العاطفي الشاذ، في أعقاب ممارسة الرياضة بشكل مكثف كما هو الأمر عند الفتيات التي تمارس الرياضة بشكل مكثف. الحميات الغذائية المتطرفة التي تهدف إلى النحافة، تشوش على الدورة الشهري وقد تؤدي إلى توقفها. عند النساء الكبيرة في السن، توجد فروق شخصية بمدى انتظام الدورة الشهرية وبالأساس بالمدة الزمنية التي تستغرقها. عند معظم النساء التي حالتها الصحية سليمة، تكون الدورة الشهرية منتظمة للغاية، لكن مدتها الزمنية للدورة قد تتغيّر بشكل كبير جدًا خلال فترات الحياة المختلفة. على الرغم من أن المدة الزمنية للدورة الشهرية تختلف عند النساء وقد تحدث في فترات زمنية مختفلة، فإنَّ الإباضة تبدأ 14 يومًا قبل النهاء الدورة الدموية، مثلاً: إذا استمرت الدورة 11 يومًا، فإنَّ الإباضة تبدأ في اليوم ال 17.

ا سؤال ج-5

أمامكم عدة عبارات متعلقة بموضوع دورة الحيض. انسخوا كل عبارة واذكروا ما إذا صحيحة أو غير صحيحة.

سجِّلوا جملة صحيحة لكل جملة غبير صحيحة.

العبارات

- أ. يؤثر الهورمون FSH على تطور الجُرَيْب، حيث تؤدي خلايا الجُرَيْب إلى إفراز هورمون إستروجن.
- ب. يؤدي الإستروجن أحيانًا إلى إعاقة إفراز هورمونات من الغدة النخامية، وأحيانًا يؤدي إلى إزدياد إفراز الهورمونات من الغدة النخامية. من هنا يمكن القول: إنَّ الإستروجن يؤدي أحيانًا إلى تغذية مرتدة ومجبة وأحيانًا إلى تغذية مرتدة سالبة.
- ج. يتم تنظيم مستوى الإستروجن بواسطة آليات التغذية المرتدة بين المبيض، الغدة النخامية والهيبوثالموس.
 - د. الإباضة معناها تطور إحدى خلايا البويضة داخل المبيض.
- ه. تاتلوث في قناة فالوب المرأة الذي يؤدي إلى انسدادها، قد منع الحمل، لأن الهورمونات لا تصل من المبيض إلى الرحم.
 - و. ترتيب الأحداث في الدورة الشهرية للمرأة هو إفراز FSH، نمو الجُرَيْب، الإباضة.
 - ز. يؤدي هورمون LH إلى الإباضة. بعد ذلك، تتحوَّل خلايا الجُرَيْب إلى جُسَيْم أصفر.
- ح. البروجسترون يُعيق إفراز FSH وَ LH وهكذا يحفَز المبيض للإستعداد إلى نضوج خلية البويضة القادمة.
 - ط. إذا لم يتم الإخصاب، يضمر الجُسَيْم الأصفر ويتوقف إفراز البروجسترون.
 - ي. إذا لم يتم إخصاب خلية البويضة، لا يحدث حمل، تتحلل طبقة الرحم الطلائية الغنية بالأوعية الدموية وتبدأ الدورة من جديد.



المزيد عن التغذية المرتدة الموجبة

التغذية المرتدة الموجبة هي ظاهرة نادرة بالمقارنة مع التغذية المرتدة السالبة، ويوجد في ذلك منطق كبير جدًا. نتيجة عملية المردودية السالبة هي الحفاظ على وضع ثابت (اتزان بدني)، أما نتيجة عملية المردودية الموجبة فهي إزدياد العملية. تتم التغذية المرتدة السالبة في أحداث خاصة، مثل: مرحلة الإباضة في دورة الحيض، الولادة (صفحة 58) وأثناء حدوث جُرح. عندما يُصاب وعاء دم ويبدأ نزيف، تلتصق صفائح الدم في المنطقة المصابة وتُفرز مواد تجذب صفائح دم أخرى إلى هذا المكان. عندما يحدث التخثر، يتوقف النزيف وتتوقف التغذية المرتدة الموجبة. من السهل أن نفهم أنه إذا لم يتوقف التخثر، فإنّ ذلك يؤدي إلى أضرار في أعقاب حدوث التخثر غير المراقب. أثناء تفريغ مثانة البول، تحدث تغذية مرتدة موجبة، لأننا لا نستطيع إيقاف تدفق البول بعد أن بدأت عملية التبول. لا تستمر التغذية المرتدة الموجبة إلى ما لا نهاية وهي تتوقف مع إنتهاء الحدث الخاص، مثل: الإباضة، الولادة، النزيف أو تفريغ مثانة البول.

ج4. إلتقاء خلايا تناسلية وإخصاب

ج1.4 مسار خلايا التكاثر في طريقها إلى الإخصاب

المسار التي تقطعه خلايا البويضة، من المبيض إلى الأنبوب الذي ينقل خلايا البويضة ويتم فيه الإخصاب، ليس طويلًا (الرسمة ج - 1 صفحة 35). خلية البويضة التي تخرج من المبيض خلال عملية الإباضة، تدخل إلى فتحة (تشبه القمع) أنبوب ينقل خلايا البويضة القريبة إلى المبيض الذي خرجت منه. توجِّه حركة أهداب الأنبوب والحركة الموجية لحافة الأنبوب خلية البويضة إلى داخل الأنبوب.

يستمر انتقال خلية البويضة من المبيض إلى أنبوب ناقل خلايا البويضة عدة دقائق فقط. تبقى خلية البويضة حيوية لمدة 24 ساعة فقط منذ الإباضة، وهذا يعني إذا دخلت خلية منوية إلى خلية بويضة في هذه الساعات، فإنَّ البويضة تُخصب. لكن إذا تمَّ هذا الأمر بعد ذلك، فإنَّ البويضة لا تُخصب.

أثناء مهارسة العملية الجنسية، يُطلق الرجل حوالي 350 خلية منوية. تنتقل الخلايا المنوية الموجودة داخل السائل المنوي من الرجل إلى مهبل المرأة، ومن هناك تتقدم الخلايا المنوية عبر الرحم إلى أعلى الأنبوب الذي ينقل خلايا البويضة. فقط إذا وصلت إلى خلية البويضة في الوقت المناسب، فإنَّ الإخصاب قد يتم، لكن الخلايا المنوية تواجهها حواجز كثيرة في طريقها. الحاجز الأول في طريقها هو الحامضية السائدة في المهبل (4-3 pH في معظم أيام الدورة). pH السائل المنوي هو قاعدي قليلا (7.2-7.6)، على ما يبدو، تحمي هذه القاعدية قسم من الخلايا المنوية عندما تمر عبر المهبل الحامضي. بعد المهبل يأتي عُنق الرحم الذي من خلاياه يُفرز مخاط لزج. تتغيَّر مكونات المخاط الذي يُفرز ولزوجته خلال دورة الحيض. عند اقتراب موعد الإباضة، يصبح المخاط الموجود في عُنق الرحم أقل لزوجة (كرد فعل لارتفاع مستوى الإستروجن في الدم في هذه الفترة).



ما هي أفضلية ظروف البيئة المحيطة الخاصة في المهبل وعُنق الرحم أثناء أيام الدورة الشهرية؟ 🚰 المهبل هو منطقة مفتوحة للبيئة المحيطة الخارجية، لذا فهو يتعرض لعوامل خارجية (مثلا: البكتّيريا). حامضية المهبل ولزوجة المخاط في عُنق الرحم، هما جزء من آليات حماية الجسم من العوامل الغريبة. لكن هذا النوع من آليات الحماية، يشكل صعوبة للخلايا المنوية أيضًا في طريقها إلى قناة فالوب: من مئات ملايين الخلايا المنوية التي تصل المهبل أثناء عملية قذف واحدة، تصل عدة ملايين خلايا منوية إلى الرحم، وفقط حوالي 100 خلية منوية تصل قناة الفالوب الموجودة فيه خلية البويضة (وحوالي 100 خلية منوية تصل إلى طرف الفالوب الذي لا تتواجد فيه خلية البويضة).

على ما يبدو، العملية كلها "تبذير" كبير جدًا: تتقدم كمية هائلة من الخلايا المنوية في مسار طويل شاق ومليء بالحواجز، من جميع هذه الملايين، تصل حوالي مائة خلية منوية إلى البيئة المحيطة للبويضة، من بين هذه الـ 100 خلية، فقط خلية واحدة، رما، تُخصب البويضة. لكن العدد الهائل للخلايا المنوية ضروري لحدوث العملية: فهو يزيد من الاحتمال، لأنه على الرغم من وجود جميع الحواجز إلا أنَّ خلية منوية واحدة، على الاقل، تصل خلية البويضة. الخلايا المنوية التي لا تشترك في الإخصاب، تُبعد من جسم المرأة عبر المهبل أو يتم تحليلها.

من المهم أنْ نذكر أنَّ جسم المرأة يفرض حواجز على الخلايا المنوية، لكن يساعد جسم المرأة في نفس الوقت الخلايا المنوية على أن تستمر في طريقها، لأنه أثناء ممارسة العملية الجنسية، تنقبض العضلات على طول الرحم وقناة فالوب، ويساعد هذا الانقباض الخلايا المنوية أن تتقدم على طول الفالوب، لكي تصل خلية البويضة. المادة الكيميائية التي تُفرز من خلايا الجُرَيْب تؤدي إلى جذب الخلايا المنوية إليه. على الأغلب تُحفظ حيوية الخلايا المنوية لمدة 4 أيام تقريبًا وهي قادرة على التخصيب في هذه المدة الزمنية.



6- سؤال ج


- أ. ما هي العلاقة بين كمية الميتوكوندريا ومكانها في الخلايا المنوية وبين سرعة حركة الخلايا المنوية في طريقها إلى خلية البويضة؟
 - ب. ماذا مكن أن تكون العلاقة بين الظروف في مسار الخلايا المنوية وبين مبدأ الإنتخاب الطبيعي؟ اشرحوا.

الخلايا المنوية التي تصل الأنبوب الناقل لخلايا البويضة، لا تكون قادرة على تخصيب خلية البويضة. لهذا الغرض، يجب عليها أن تمر المرحلة الأخيرة من الإخصاب، المرحلة التي نسمِّيها إعداد تتم في جسم المرأة. لا نعرف حتى الآن جميع تفاصيل هذه المرحلة، لكن وُجدَت في هذه العملية تغيُّرت في السطح الخارجي للخلية المنوية، ترتفع فيها العمليات الأيضية وتزداد قُدرة حركة ذنب الخلية. فقط بعد حدوث هذه التغييرات التي تستمر بين 6 إلى 8 ساعات، تستطيع الخلية المنوية أن تَخصب خلية البويضة.

ج2.4 الإخصاب - إتحاد الخلايا التناسلية

العملية الأساسية في عملية الإخصاب هي إتحاد المادة الوراثية الموجودة في الخلية المنوية مع المادة الوراثية الموجودة في البويضة وإنتاج خلية ديبلوئيدية - زيجوت (لاقحة). هذه العملية مشتركة لجميع أنواع الكائنات الحية التي تتكاثر بتكاثر جنسي.

كما ذكرنا، من بين حوالي الـ 100 خلية المنوية التي تبقى على قيد الحياة وتصل الأنبوب الذي ينقل خلايا البويضة التي فيها خلية البويضة، فقط خلية منوية واحدة (إنْ وُجدت) تشترك في عملية الإخصاب! في طريقه إلى الهدف - إخصاب خلية البويضة التي "تنتظر" - تنتظره عدة حواجز أخرى (الرسمة ج-11).



الرسمة ج -11: خلية منوية تُخصب خلية البويضة (الأعداد تُمثِّل مراحل العملية).

حول خلية البويضة، توجد عدة خلايا خرجت معها من الجُرَيْب، كما أنها محاطة بغلاف شفاف (غير مبنى من خلايا). يجب على الخلية المنوية أن تمر عبر خلايا الجُرَيْب (رقم 1 في الرسمة) وأن تصل بقواها الذاتية الغلاف الشفاف.

عندما تصل الخلية المنوية، ترتبط إلى أحد البروتينات الموجودة في الغلاف الشفاف ويَنْتُج تفاعل بين البروتين والأكروزوم الموجود في رأس الخلية المنوية. يساعد هذا التفاعل الخلية المنوية على الدخول عبر الغلاف الشفاف (رقم 2 في الرسمة). يتم تمييز الخلية المنوية، على أنها تنتمى لنفس النوع البيولوجي (species) الذي تنتمى إليه خلية البويضة، في مكان التلامس (الاتصال) بن الخلية المنوية وخلية البويضة. في نفس الوقت، تخرج امتدادات من خلية البويضة إلى الخلية المنوية وتشدها إلى الداخل. تساعد الحركة القوية لذنب الخلية المنوية على دخوله أيضًا. الخلية المنوية تدخل خلية البويضة (رقم 3 في الرسمة). يتحلل ويذوب كل من ذنب ورأس الخلية المنوية.

في أعقاب دخول الخلية المنوية، تبدأ تغيُّرات في غشاء خلية البويضة وفي الغلاف الشفاف، لكي تمنع دخول خلايا منوية إضافية إلى خلية البويضة. يؤدي الدمج مع الخلية المنوية إلى انتهاء الإنقسام الثاني للميوزا في خلية البويضة. يَنْتُج جُسَيْم قَطب (ثاني)، ويتم إخراجه إلى خارج خلية البويضة. تنتهى عملية الإخصاب عند إتحاد نواة الخلية المنوية مع نواة خلية البويضة.



7− سؤال ج

ماذا يحدث لو دخلت خليتين منويتين إلى داخل خلية البويضة؟


ج5. من الزيجوت إلى الوليد

الخلية المخصبة هي زيجوت - خلية ديبلوئيدية (2n)، نواتها تحتوي على n كروموسومات من الأب وعلى n كروموسومات من الأم. الزيجوت هي بداية إنسان جديد: جنين معلوماته الوراثية هي دمج المعلومات الوراثية لوالديه. توجد فروق في تفاصيل عملية الإخصاب والتطور الجنيني بين أنواع حيوانات متعددة خلايا محتلفة. لكن المشترك لجميعها أنه خلال التطور الجنيني، تحدث عملية مدهشة: من خلية الزيجوت الواحدة يتكوُّن كائن حي كامل فيه خلايا متنوعة، أنسجة وأعضاء مختلفة!

يبدأ التطور الجنيني بعد الإخصاب ومع انقسام <mark>الميتوزا</mark> للزيجوت (الرسمة ج - 12). تنقسم كل خلية من خليتي الإبنة، اللتان نحصل عليهما، انقسام ميتوزا، وهكذا يرتفع عدد الخلايا في الجنين الذي يتطور إلى 4، $\hat{8}$ ، 16، 32 خلية وهكذا دواليك حتى نحصل على كتلة خلايا.

في البداية، لا تكبر قياسات الجنين، لأن كبر كل خلية ابنة هو نصف كبر الخلية التي نتجت منها، وكبر كتلة الخلايا مساو لكبر الزيجوت (خلية البويضة المخصبة). انقسام هذه الخلايا سريع بالمقارنة مع وتيرة انقسام الخلايا في مراحل الحياة الأخرى. تتم هذه الإنقسامات بسبب المواد التي تتراكم في خلية البويضة أثناء نضوجها.

فيما بعد تتباطئ وتيرة الإنقسام. يتغيَّر تنظيم الخلايا في الجنين ويَنْتُج مبنى مكوَّن من طبقة خلايا كثيفة تُحيط تجويف (فراغ) مليء بمحلول أملاح وبروتينات. هذا التطور الأولي الذي يبيِّن بداية التمايز، يبدأ من خلال حركة الجنين من أنبوب ناقل خلايا البويضة، الذي تمَّ فيه الإخصاب، باتجاه الرحم: السائل الموجود في أنبوب ناقل خلايا البويضة والجنين الموجود داخله،



الرسمة ج -12: يتطور الزيجوت إلى جنين، ينتقل إلى الرحم ويُستةعب فيه. انتبهوا! في الواقع، الزيجوت صغير جدًا نسبةً لقناة فالوب.

يتم دفعهما باتجاه الرحم بواسطة انقباض العضلات في جدران الأنبوب وبواسطة حركة الأهداب التي تُبطن جدار الأنبوب. بعد مرور حوالي 4 أيام على الإخصاب، يصل الجنين الرحم. في اليومين الأولين، بعد وصول الجنين الرحم، يعوم الجنين في فراغ الرحم، وفقط في اليوم السادس أو السابع بعد الإخصاب، تتم عملية "التثبيت" في الرحم، الذي من خلاله ترتبط امتدادات من القسم الخارجي للجنين إلى مخاط الطبقة الطلائية للرحم التي أُعِدَّت مسبقًا بتأثير هورمونات. يبدأ الحمل عندما يتم استيعاب الجنين في مخاط الطبقة الطلائية للرحم.


ج1.5 تطور الجنين

تكوين المشيمة ووظائفها


بعد أن يتم تثبيت الجنين الصغير في الطبقة المخاطية السميكة في جدار الرحم، يتطور كيسي جنين غشائيين: الداخلي - غشاء السّلي وفي داخله سائل السّلي والخارجي - غشاء كوريون. يكوِّن غشائي الجنين وسائل السّلي بيئة محيطة مائية ثابتة ومحمية للجنين (الرسمة ج - 13).

في الأسبوع الأول من الحمل، يتغذى الجنين بواسطة انتشار (ديفوزيا) المواد التي تَفرز من خلايا الطبقة المخاطية للرحم.

بعد ذلك، يتطور جهاز خاص لتغذية الجنين، لتبادل الغازات ولإبعاد الفضلات التي نسمِّيها مشيمة. المشيمة هي عضو خاص للإناث الحاملة من الثدييات. هذا العضو مشترك للأم والجنين: تشترك الأم في إنتاج المشيمة التي تعتبر النسيج المخاطي في الجدار الداخلي للرحم، أما الجنين فيشترك مع الأم بغشاء كوريون. تخرج من غشاء كوريون بروز (خَمَلات) غنية بالأوعية الدموية، وهي تدخل إلى مخاط الرحم وتتوزع فيه كشبكة متفرعة.



الرسمة ج-13: الجنبن، أغشية الجنبن والمشيمة



الرسمة ج -14: مبنى المشيمة

كشبكة متفرعة (الرسمة ج- 14). أوعية دم الأم مفتوحة في أطرافها، وعلى دم الأم

تصل أوعية دم الأم الطبقة المخاطية للرحم وتتوزع فيها

التجويفات (الفراغات) الموجودة بن الخَمَلات ويكوِّن "بحيرات" صغيرة جدًا تحيط الأوعية الدموية الصغيرة جدًا للجنين من جميع الجهات. من المهم أنْ نذكر أنّ دم الأم ودم الجنن متجاورين جدًا في المشيمة، لكن لا توجد بينهما صلة مباشرة، لأنه تفصل بينهما أغشية الخلابا الموجودة في جدران الأوعبة الدموية الجنينية.

تتم في المشيمة حركة مواد بين أجهزة دم الأم والجنين باتجاهين: ينتقل غذاء وأكسجين من دم الأم إلى دم الجنين، وينتقل ثاني أكسيد الكربون (ناتج التنفس الخلوى) وفضلات الجنين من دم الجنين إلى دم الأم. عند اقتراب نهاية الحمل، تنتقل من دم الأم، إلى دم الجنين، مضادات حيوية تكسبه حماية في بداية حياته. انتقال المواد بين جهازي الدم اختياري ولا تستطيع كل المواد أن تنتقل. بفضل الانتقال الاختياري، منع عادةً انتقال مسببات أمراض من الأم إلى الجنين. على الرغم من ذلك، من المهم أنْ نعرف أنّ هناك مسببات أمراض خطيرة تستطيع أن تنتقل إلى الجنين عبر المشيمة، مثلًا: الفيروس الذي يؤدي إلى الحصبة الإلمانية (Rubella). تستطيع مواد ضارة أيضًا، مثل: المخدرات، السموم، الكحول، الأدوية المختلفة وفضلات تَنْتُج من تدخين السجائر أنْ تدخل عبر المشيمة من الأم إلى الجنين. يتم تصريف الأوعية الدموية الجنينية الموجودة في المشيمة إلى ثلاثة أوعية دموية كبيرة تشكل معًا الحبل السرى الذي يربط بين الجنين والمشيمة. في الحبل السرى، يوجد وعاءان دمويان ينقلان الدم من الجنين إلى المشيمة ووعاء دم واحد ينقل دم من المشيمة إلى

يوجد للمشيمة وظيفة مهمة إضافية، حيث تُفرز منها هورمونات ضرورية لاستمرار حمل سليم.

في بداية الحمل، تفرز المشيمة هورمون hCG (من الإنجليزية: human Chorionic Gonadotropin)

إلى الدم. يتم استيعاب الهورمون في المبيض وهو يمنع من اضمرار الجُسَيْم الأصفر. بفضل ذلك يستمر الجُسَيْم الأصفر في إفراز الإستروجن والبروجسترون. بعد مرور حوالي شهرين على بداية الحمل، ينخفض إفراز hCG من المبيض ويضمر الجُسَيْم الأصفر. فيما بعد وخلال الحمل، المشيمة هي التي تفرز الهورمونين إستروجن وبروجسترون، حيث يرتفع مستواهما خلال الحمل. يخفف البرجسترون من انقباض عضلة الرحم الذي يحدث خلال الحمل وهكذا منع من انطلاق الجنين من الرحم قبل نهاية



تطوره. إذا كان مستوى هذه الهورمونات عال لا تحدث دورة الحيض. الهورمون hCG يكون في دم الأُم ويفرز في البول. تعتمد فحوصات الحمل البيتية على فحص مستوى هورمون hCG في بول المرأة.

جدير بالمعرفة

فحص سائل السلى

عندما يكون خوف من أن تطور الجنين غير سليم، يقترح الأطباء إجراء فحص سائل السلى. يُخرج الطبيب كمية قلية من سائل السلى بواسطة محقن، ويفحص الخلايا التي سقطت من الجنين أثناء الحمل الموجودة في السائل، كما يفحص السائل نفسه. يمكن استعمال طرق مختلفة للحصول على صورة كروموسومات الجنين، ولفحص سلامتها، كما يمكن فحص ما إذا الجنين ذكر أو أنثى. يساعد فحص مكوِّنات السائل على معرفة وجود أمراض معينة في الجنين.

للمزيد عن

فحص سائل السّلي، انظروا الفصل الرابع، صفحات 69-70

> > 👔 سؤال ج - 9

كيف يمكن شرح انقطاع دورة الحيض خلال الحمل؟ اذكروا في إجاباتكم وظائف الهورمونات.

مراحل تطور الجنين

خلال الحمل الذي يستمر بمعدل 270 يومًا تقريبًا (حوالي 40 أسبوعًا)، تَنْتُج مليارات الخلايا من خلية واحدة، حيث تختلف عن بعضها بالشكل والأداء. تحدث ثلاث عمليات تطور في الجنين:

انقسام خلايا (ميتوزا) وغو.

تهايز خلايا.

تنظيم خلايا في مبانِ تُنْتِج أنسجة وأعضاء.

يساعد الإنقسام السريع للخلايا في النمو العام للجنين، لكن ازدياد عدد الخلايا هو فقط جزء واحد وبسيط من عملية التطور. في الجنين الذي فيه ثماني خلايا، جميع الخلايا متماثلة. إذا فصلنا الخلايا عن بعضها دون أن نضرها، يتطور من كل خلية جنين كامل. لكن يتغيَّر الوضع بعد عدة إنقسامات إضافية. على الرغم من أن الكرموسومات متماثلة في جميع الخلايا، وكذلك الأمر المعلومات الورثية، تبدأ كل مجموعة خلايا في التطور بشكل مختلف وخاص. هذه العملية نسميها تمايز خلالها تتغيَّر الخلايا. في كل خلية، يتم التعبير عن جينات معينة وجينات أخرى لا يتم التعبير عنها. لذا كل مجموعة خلايا تكون خاصة في صفاتها ووظائفها. مثلًا: خلية العين تختلف بشكلها وبوظيفتها عن خلية الكبد، خلية الدم خلية العضلة والخلية العصبة.

علاقة عمضه ع

الخلية - مبنى ونشاط: تمايز خلايا.

الطريقة التي يتم فيها تحديد جينات يتم التعبير عنها في الخلايا المختلفة، هي موضوع يبحثه باحثون كثيرون وغير معروف كل شيء عنها. اعتمادًا على مُكتشفات الأبحاث، مكن القول: إنّ ظروف خلايا الجنين وبيئتها المحيطة، هي التي تحدد التعبير عن الجينات بشكل كبير جدًا: مواد في سيتوبلازم الخلية، مواد في البيئة المحيطة الخارجية للخلية وتلامس بن الخلايا المتجاورة. يبدأ التمايز مبكرًا جدًا في تطور الحنن.

خلال تكاثر وتمايز الخلايا، تتم عمليات إضافية: تنتقل خلايا من مكان إلى آخر، تنطوى سطوح خلايا نسبة لبعضها، يَنْتُج تلامس بين خلايا متجاورة وتُفرز مواد من مجموعات خلايا. فيما بعد، تظهر في تكتل الخلايا بروزات وتجويفات (فراغات) تكبر تدريجيًّا. النتيجة أن الجنين يتوقف عن التكتل إلى خلايا وتظهر فيه مبان ذات أشكال مختلفة تعتبر بداية لأعضاء مختلفة في الجسم.

 أ. جنين مكون من خليتين، ر. جبي ممول من حليبين، ناتج عن انقسام الزيجوت بعد مرور حوالي 30 ساعة على الإخصاب، نلاحظ حول الخلايا بقايا خلايا كانت تُصيط خلية

في الرسمة ج - 15، مكنكم رؤية قسم من التغيُّرات التي تبدأ في الجنين.

غشاء السّلي

براعم الأطراف الحبل السرى سائل السّلي

ب. جنين مكوِّن من 16 خلية، وقد

ج. جنين عُمرُه 4-5 أسابيع.
 طوله حوالي 6 ملم. انتبهوا إلى
 القلب وبراعم أطراف الجسم.

 $\frac{1}{6}$ منين عُمرُه $\frac{1}{6}$ أسابيع. الجنين مربوط بالمشيمة بحبل سري، يطفو داخل سأنل السّلى ومحاط بغشاء السّلى. طوله حوالي 4 سم ووزنه أقل من 10 غرامات.

> الرسمة ج -15: تغيُّر الجنين في مراحل مختلفة من التطور. انتيهوا! عرضنا كل مرحلة بتكبير آخر.

يتم التعبير عن تنظيم الخلايا إلى أعضاء من خلال تصميم أجهزة الجسم أيضًا. مَعَّنوا، على سبيل المثال، في جنين عُمره أربعة أسابيع (الرسمة ج - 15): في هذه المرحلة، نسمِّي اليدين والرجلين "براعم الأطراف" وهي تبدو بروزات لا شكل لها. بين الأسبوع السادس إلى السابع من الحمل، تبدأ الأصابع بالظهور في كف اليد، وفي هذه المرحلة تظهر وكأنها "نُحتت" من البرزة الأولى. يتم تنظيم مبنى كف البد من خلال دمج عدة عمليات: تكاثر خلايا، انتقال خلايا

من مكان إلى آخر وموت خلايا كثيرة. الخلايا التي تقع بين الأصابع تموت وتتحلل. وهكذا يَنْتُج المبنى الدقيق الطويل للإصبع مع الفراغات بينها. تنظيم الخلايا إلى أعضاء متعلق بتكاثر وتمايز الخلايا وموت خلايا بأعداد هائلة. تصف الرسمة ج - 16 بشكل تخطيطي عملية تصميم مبنى كف اليد خلال تطور الجنن.

الرسمة ج -16: عملية تصميم مبنى كف اليد خلال تطور الجنين

تطور أعضاء الجنين

الشهر الأول، هو فترة النمو الأكثر نشاطًا في تطور الجنين. المشيمة تزوِّد الجنين بجميع المواد المطلوبة، لكي ينمو بسرعة كبيرة جدًا. عندما يكون عُمْر الجنين حوالي أربعة أسابيع، يمكن أن نلاحظ الرأس الذي يتطور فيه المخ، "براعم" اليدين والرجلين، "براعم" الأوعية الدموية ونبضات القلب. في هذه المرحلة، لا يبدو الجنين كإنسان فهو يشبه أجنة فقريات أخرى، على الرغم من وجود جميع براعم أعضاء الجسم في نفس الوتيرة. يتطور الرأس والمخ أسرع من سائر أعضاء الجسم.

في نهاية الأسبوع الثامن منذ بداية الحمل، نجد جميع أعضاء الجسم- على الرغم من أن طول الجنين في هذه المرحلة حوالي 4 سم ووزنه أقل من 10 غرامات! غيز ملامح وجهه وأعضاء جسمه المختلفة: عينان، أذنان، مخ، جهاز هضم، كليتان، يدان ورجلان فيهما أصابع. من المثير للاهتمام أن نعرف أنه في الأسبوع الثامن، توجد للجنين بصمات أصابع واضحة. المخ يُشرف على نشاط الأعضاء. تفرز الكليتان الفضلات. في الأسبوع الـ 12 يصبح الجنين فعًالًا. فهو يستطيع أن يحرك أطرافه جسمه، رأسه وأن يغير ملامح وجهه. في الأسبوع الـ 16 يصبح شكل الجنين كشكل الطفل الصغير، وهكن تمييز الأعضاء التناسلية الخارجية. حتى الولادة، يتطور الجنين وينمو بشكل ملحوظ. على الرغم من وجود جميع الأعضاء، إلا أنه في نهاية الثلث الأول من الحمل، يتطور نشاط أجهزة الأعضاء تدريجيًّا. ينضج جهاز تبادل الغازات في الرئتين متأخرًا وينتهي في معظم الحالات فقط في الأسبوع الـ 34. الخُدج الذين يولدون في مرحلة متأخرة، قد متأخرًا وينتهي في معظم الحالات فقط في الأسبوع الـ 34. الخُدج الذين يولدون في مرحلة متأخرة، قد الغازات بعد الولادة فقط. كبر ووزن الوليد مهمان لبقاؤه. تستمر معظم حالات الحمل بين 260 إلى الغازات بعد الولادة فقط. كبر ووزن الوليد مهمان لبقاؤه. تستمر معظم حالات الحمل بين 260 إلى 280 أسبوعًا)، وفي نهاية الحمل يخرج وليد سليم وكامل التطور.

جدير بالمعرفة

الكبر والكتلة

كتلة خلية البويضة المخصبة للإنسان حوالي 2 على مليون من الغرام، أما معدل كتلة الجنين عند ولادته حوالي 3,400 غرام. خلال الحمل تكبر الكتلة حوالي مليارد ضعف!


جدار الرحم مكوَّن من عضلات قوية ومرنة بشكل خاص، وهكذا يستطيع الرحم أن يكبر من عضو كبره 7 سم وكتلته حوالي 50 غرامًا إلى كيس يحتوي على جنين وزنه حوالي 3.4 كغم، مشيمة ولتران من سائل السَّلى، وكتلته الكلية حوالي 7 كغم.



التوأم

في كلُ دورة حيض، تخرج عادةً خلية بويضة واحدة فقط من إحدى المبيضين. في المبيض الثاني، لا ينضج جُرَيْب في نفس الوقت. لذا في معظم الحالات، يتم تخصيب خلية بويضة واحدة فقط. لكننا نعرف أن هناك حالات يولد فيها توأم، وأحيانًا أكثر من ولدين في الولادة الواحدة.

هناك إمكانيتان تؤديان إلى ولادة توأم بشكل طبيعي.



الرسمة ج -17: تطور توأم

إنّ ولادة توأم متماثل أو غير متماثل هو حدث غير شائع، وهو يحدث بنسبة مقدارها حوالي %0.3-4% من الولادات. التوأم المتماثل هو التوأم الذي يتطور من خلية بويضة واحدة تم تخصيبها بواسطة خلية منوية واحدة. يحدث الوضع الشائع لتطور توأم متماثل في الإنسان (85% من حالات التوأم المتماثلة) في المرحلة التي تكون فيها خليتان مباشرة بعد الإخصاب. تنفصل الخليتان وكل واحدة منهما تشكّل بداية جنين جديد. في هذه الحالة، يتم الانفصال بين الخلايا في قناة فالوب. الغلاف الشفاف الموجود حول خلية البويضة يحتوي في داخله على الجنينين معًا، وعندما يصل الجينينان المتطوران الرحم، ينهدم الغلاف، وهر الجنينان بالموازة عملية التثبيت. عادة تكون للجنينين مشيمة واحدة، لكن الغشائين الخارجين للجنينين (السّلى وكوريون) يتطور كل منهما بشكل منفصل لكل جنين.

يَنتُج توأمان غير متماثلان عندما تحدث إباضة مزدوجة. لأسباب غير معروفة، تنضج خليتان بويضتان في نفس الوقت - خلية بويضة واحدة في كل مبيض أو خليتان بويضتان في نفس المبيض. تخرج البويضتان في نفس الوقت إلى قناة فالوب وتُخصب كل واحدة منهما. تحدث هذه الإمكانية بشكل طبيعي في 18-%2 من الولادات.

حمل متعدد الأجنة، في الفصل الرابع، صفحات .73 ,65

في هذه الحالة، يلد توأم مختلفان عن بعضهما في المعلومات الوراثية، والتشابه بينهما مثل التشابه بين أخوين عاديين، هذا يعني أنهما مكن أن يكونا مختلفان عن بعضهما اختلاف كبير. هذا النوع من التوأم، نسمِّيه توأم أخوة (الرسمة ج 17-).

الهورمونات التي تُعطى للنساء أثناء معاجة خصوبتها تؤدي إلى إخراج عدد كبير من خلايا البويضات في نفس الوقت، لذا يتطور أحيانًا حملًا متعدد الاجنة في أعقاب هذا العلاج.



📆 سؤال ج - 10

وُلد توأم أطفال، ذكر وأنثى. هل مصدرهما من من خلية بويضة واحدة أم من خليتين؟

ج 2.5 الولادة

لا نعرف المحفز الذي يثير بداية الولادة، لكن يعتقد باحثون أن هذه الإثارة تحدث بواسطة هورمون تفرزه الغدة الكظرية للجنين. بحسب هذه الفرضية التي لم تُثبت نهائيًا كرد فعل لإفراز الهورمون الذي ينتُج في الجنين، يبدأ إفراز هورمون أوكسيتونين من الغدة النخامية للأم وهو الهورمون المعروف الذي ينشِّط الولادة. هذه الفرضية مثيرة للاهتمام، إذا كانت صحية، فمعنى ذلك أن العامل الذي يُثير عملية الولادة هو الجنين ذاته وليس جسم الأم. عندما يصل رأس الجنين عُنق الرحم، يَنْتُج ضغط على جدران عُنق الرحم الذي يستوعبه الجهاز العصبي للأم.

تصل المعلومات من الهيبوثالموس إلى الغدة النخامية التي تفرز هورمون أوكسيتونين، حيث يصل الأوكسيتونين الرحم مع تيار الدم ويُثير انقبضات دورية لعضلات جدران الرحم. هذه الإنقبضات نسمِّيها آلام الولادة. في أعقاب الإنقباض، تتمزق عادة أغشية الجنين وينطلق سائل السّبي من المهبل إلى الخارج (هذا الحدث نسمِّيه "نزول ماء").

يدفع انقباض عضلة الرحم وعضلة البطن الجنين باتجاه عنق الرحم الذي يتوسع مع بداية عملية الولادة. يتم دفع الجنين عبر عنق الرحم، وعبر المهبل إلى خارج الجسم، طفل جديد جاء إلى العالم! تصف الرسمة ج - 18 مراحل خروج الجنبن.



الرسمة ج - 18: مراحل خروج الجنين

بعد ولادة الطفل، نقطع الحبل السرى، وهكذا نقطع العلاقة بين الدورة الدموية للأم وبين الدورة الدموية للوليد. يؤدي استمرار انقباض الرحم إلى انفصال المشيمة من الرحم وهي تخرج من الجسم مع أغشية الجنين وهكذا تكتمل عملية الولادة.

في مرحلة آلام الحمل، تعمل التغذية المرتدة الموجبة. التغذية المرتدة موجبة، لأن نتيجة العملية (ازدياد انقباض عضلة الرحم) تؤدي إلى ازدياد التحفيز (ضغط رأس الوليد) الذي يحفز إفراز إضافي للهورمون اوكسيتوتسين. الآلام (طلق الولادة) تدفع الجنين، ويستمر التحفيز لإفراز الهورمون (ضغط رأس الوليد). في اللحظة التي يخرج فيها رأس الجنين، يتوقف الضغط على جدران عنق الرحم، وهكذا يتوقف التحفيز لإفراز اوكسىتوتسىن وتتوقف آلام الولادة.



👔 سؤال ج -11

ارسموا رسمًا تخطيطيًا يصف التغذية المرتدة الموجبة التي تعمل خلال الولادة.

نقسِّم عادة سيرورة الولادة إلى ثلاث مراحل: مرحلة الآلام (الطلق)، مرحلة توسع عُنق الرحم ومرحلة خروج الوليد. تتغيُّر مدة كل مرحلة من ولادة إلى أخرى. هناك ولادات تستمر رُبع ساعة وهناك ولادات تستمر يوم كامل. الفروق ليست بين امرأة وأخرى، بل عند نفس المرأة ذاتها في الولادات المختلفة. توجد نساء ولدت مرة واحدة ولادة قصرة ومرة أخرى استمرت الولادة زمن طويل..

التنفس الأول - الصبحة الأولى

عندما يكون الجنين في الرحم، فإنه لا يتنفس بواسطة رئتيه. يصل الدم إلى خلايا جسمه من دم الأم عبر وعاء دم في الحبل السرى، ويتم إخراج ثاني أكسيد الكربون عبر وعاء دم آخر في الحبل السرى. تنضج الرئتين خلال الشهر الثامن للحمل، لكنها تكون فارغة من الهواء. في اللحظة التي يخرج فيها الجنين من الرحم، يدخل هواء مرة واحدة إلى رئتيه ويخرج منها مباشرة. يفعِّل تيار الهواء الفجائي الأوتار الصوتية للجنين وهكذا نسمع صيحته الأولى. هذه الصيحة الأولى هي دلالة أن الوليد يتنفس بشكل سليم. من هذه الحظة، يتم استيعاب الأكسجين وإطلاق ثاني أكسيد الكربون من دم الوليد بواسطة رئتيه.

الوليد السليم، لا يستطيع أن يعيش بشكل مستقل وهو متعلق بالأشخاص الذين يعتنون به بشكل مطلق، لكن يوجد عدة أداءات يمكن فحصها عنده، لكي نتأكد من أن تطوره سليم. مثلا: لكل وليد يوجد

رد فعل نسمِّيه رد فعل الإمساك. إذا لمسنا كفة يده بطرف الإصبع، تنقبض أصابعه مباشرةً وتمسك بقوة الصبع الذي لمسه. هناك رد فعل إضافي يدل على تطور الوليد وهو رد فعل "التقدم": عندما نمسكه من كلا طرفي جسمه بشكل ثابت، بحيث تلمس أطراف أصابعه سطح معين (سطح طاولة على سبيل المثال)، فهو يحرك رجليه الواحدة تلو الأخرى لفترة زمنية قصيرة جدًا بحركة ترجل وكأنه "يتقدم". يختفي هذا الرد الفعل خلال ساعات قليلة. المرة القادمة التي ينفذ فيها حركة ترجل (ترافقها تثبيت) تكون في سن سبعة إلى ثمانية شهور على الأقل، وعادةً أكثر من ذلك. هناك



رد فعل إمساك

رد فعل إضافي يلد مع الوليد وهو رد فعل الرضاعة.

تغذية الطفل

في الأشهر الأولى، يتغذى الطفل من حليب الأم. خلال الحمل، يؤثر تركيز البروجسترون العالى على تطور حويصلات الحليب في غدد الحليب في الثدى. بالإضافة إلى ذلك، تفرز الغدة النخامية هورمون برولكتين وهو يؤثر على إنتاج الحليب وإفرازه إلى الحويصلات. ما دام الطفل يرضع، يستمر إنتاج الحليب. يؤدي التوقف عن الرضاعة إلى توقف إنتاج الحليب.

يتأثر إنتاج الحليب وإفرازه في فترة الرضاعة من عوامل مختلفة، قسم منها داخلية - هورمونالية وعصبية، وقسم منها خارجية، مثل: تغذية الأم وعملية رضاعة الطفل.

عندما يرضع الطفل، ينقل محفز الرضاعة مخفزات عصبية إلى الهيبوثالموس. في أعقاب هذا التحفيز، تُطلق الغدة النخامية هورمون إضافي نسمِّيه ا**وكسيتوتسين** وهو يؤدي إلى انقباض خلايا في غدد الحليب في نسيج الثدي. نتيجة للانقباض، يتم دفع الحليب من الغدد إلى داخل أنابيب الحليب ومن هناك يخرج من الثدي. يحفز هذا الهورمون اقباض الرحم أيضًا، وهكذا يساعده لعودة إلى كبره العادي. من الجدير بالمعرفة أن بكاء الطفل بؤدي إلى إفراز اوكستينن.



🐒 سؤال ج -12 أي تغذية مرتدة تعمل في إنتاج الحليب؟ علَّلوا.



لا تلد جميعها لا حول ولا قوة لها (عاجزة عن الاعتناء بذاتها)

وليد الإنسان شاذ من ناحية قدرته على الاستقلال بحركاته بعد الولادة. مدة نضوج الإنسان طويلة بالمقارنة مع حيوانات أخرى. حتى في الفترات القديمة المختلفة التي اعتبر فيها الأولاد بالغون لكل شيء من اللحظة التي وصلوا فيها البلوغ الجنسي، فقد اعتُبرت الفترة الزمنية 12-14 سنة على أنها مدة زمنية طويلة بالمقارنة مع يلوغ كل ثدى آخر.

أولاد الثدييات الكبيرة الأخرى، مثل: الفيل، الحصان، والأسد يقفون على أقدامهم مباشرة بعد الولادة، ترضع حوالي 6-8 أسابيع وتصل البلوغ الجنسي في سن سنة حتى ثلاث سنوات.

يدعى باحث النشوء والارتقاء ستيفن جولدن (Stephen Gould, 1941-2002) أن الحيوان الذي مخه كبير وذا قدرات عقلية متطورة له أفضلية في البقاء. مخ الإنسان كبير نسبة إلى جسمه وأكبر بكثير من مخ تدييات أخرى نسبة إلى أجسامها. افترض جولد أن هناك مرحلة نشوء وارتقاء حاسمة في تطور الإنسان، التي تمُّ التعبير عنها في تبكير عملية الولادة إلى مرحلة فيها التطور الجنيني لم ينتهى. استمرار عملية النمو في الرحم، قد تؤدي إلى أن لا يستطيع الجنين المرور في قناة الولادة بسبب كبر رأسه ومخه. ادعى جولد أن هناك قدرة بقاء عالية للوليد الذي يولد "غير كامل" وله رأس ومخ ولم يصلا ذروة الكبر، حتى إنْ لم يكن مستقلا بشكل مطلق. لذا أثناء الولادة، لا يصل مخ الإنسان إلى الكبر النهائي، عظام جمجمة الوليد، لا تكون مغلقة ويستمر الرأس في النمو ىعد الولادة أيضًا.

نقراض أنواع.




أبنوا جدولاً ونظَموا فيه معلومات عن الهورمونات التي تشترك في عملية تكاثر الإنسان. تطرقوا في الجدول إلى الجوانب الآتية: من أين يتم إفراز الهورمون؟ متى يتم إفراز الهورمون؟ ما هو العضو المستهدف؟ وما هو تأثيره؟

ج6. النمو السكاني للإنسان

يبحث هذا الفصل في أجهزة وعمليات تكاثر الإنسان في مستوى الفرد. لكن من المهم التطرق إلى التكاثر في سياق نمو التعداد السكاني للإنسان على الكرة الأرضية. النمو السكاني للإنسان يختلف بشكل كبير جدًا عن نمو عشائر الحيوانات الأخرى ومن ضمنها ثدييات كبيرة: خلال مئات السنوات الأخيرة، ازداد تعداد السكان في العالم بشكل كبير جدًا، أما عشائر الثدييات الكبيرة الأخرى صَغُرت وانقرض قسم منها في هذه الفترة. تعرض الرسمة ج - 19 ازدياد تعداد السكان خلال الـ 2,000 سنة الأخيرة. خلال الـ 1,800 سنة، ازداد تعداد السكان في العالم 5 أضعاف، من 200 مليون نسمة إلى مليارد (ألف مليون). من سنة 1,800، خلال فترة زمنية قصيرة، حوالي 200 سنة فقط، طرأ تغيير ضخم

جدًا بنسية النمو: كبر تعداد السكان 6 أضعاف، وفي سنة 2011، اجتاز تعداد السكان الـ 7 مليارات. التغيُّر بنسبة تعداد السكان، بدأ في القرن الـ 190 (1,800) متعلق بالثورة الصناعية، بالتطور التكنولوجي، بوسائل النقل، بتطور الطب وبتحسين الظروف الصحية. يمكن أن نشرح القفزة الكبيرة بوتيرة تعداد السكان في القرن العشرين بفضل المضادات الحيوية والأدوية الأخرى التي أدت إلى انخفاض عدد الوفيات بشكل عام وانخفاض وفيات الأطفال بشكل خاص. وبفضل طرق التطعيم ضد أمراض معينة، مثل: الجدري، السِّل وشلل الأطفال التي قلَّلت من الوفيات. في أعقاب هذا التحسين، بدأ ارتفاع حاد في معدل الحياة.



الرسمة ج-19: ازدياد تعداد السكان



سؤال ج -14

هل توجد، بحسب رأيكم، علاقة بين ازدياد تعداد السكان وبين انقراض عشائر ثدييات كبيرة؟ علّلوا.

التكاثر الهائل لبنو البشر، لا يضمن جودة حياة عالية للجميع. في دول كثيرة في العالم، لا يوجد غذاء وماء بكميات كافية، ليس من السهل الحصول على علاج طبي، ومعدل الحياة فيها أقصر من معدل الحياة الذي نعرفه في إسرائيل، في الدول الضعيفة التي نسمِّيها "دول العالم الثالث"، يزداد تعداد السكان بسرعة، في يومنا هذا، على الرغم من تقلص الموارد. أما في الدول المتطورة التي اقتصاهاد جيد (مثل)، فقد قلَّت وتيرة نمو تعداد السكان.



يعرف اليوم باحثون وزعماء أن استمرار غو التعداد السكاني، قد يؤدي إلى نقص حاد في الغذاء وظروف الحياة الأساسية. كما يمكن أن يؤدي تأثير الإنسان إلى أضرار غير معكوسة لأنظمة الحياة على سطح الكرة الأرضية (مثلًا: في أعقاب ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي، تلوثت مصادر المياه والتربة وتمَّ استغلال زائد للموارد لدرجة أنه يشكّل خطرًا على بقاء جميع بنو البشر).

كيف يمكن أن نؤدي إلى تباطؤ في نسبة تعداد سكان العالم في الدول المختلفة

سنت الحكومة الصينية قوانين لتقليص الولادة: في المدينة، يُسمح للعائلة أن تُنجب طفلًا واحدًا فقط، وفي القرية 3 أطفال. كل من يخالف هذه القوانين، يدفع غرامات مالية، قد يكون تأثير سلبي لهذه الوسائل: خلال فترة زمية معينة، يكون تعداد كبار السن كبيرًا، أما تعداد الشباب الذي يمول معيشتهم يكون قليلًا فقط. قد يتطور في دول أوروبا وضع شبيه، لأن نسبة الولادة فيها صغيرة جدًا دون أن تتدخل الحكومات.

وجد باحثي هذا الموضوع أن أحد العوامل الذي يؤثر على عدد الأولاد في العائلة هو مستوى تعلُّم المرأة. كلما كان مستوى تعلُّم المرأة عاليًا، يقل عدد الأطفال التي تنجبهم خلال حياتها وتزداد مساهمتها في دعم اقتصاد البيت. هناك عامل إضافي، قد يؤثر على تقايص الولادة وهو نشر معلومات وسائل لتنظيم العائلة.

للمزيد عن

تنظيم العائلة، في الفصل الرابع، صفحات 74-75.

المواضيع الأساسية في هذا الفصل

تساعد الأعضاء التناسلية على حدوث أربع عمليات: إنتاج خلايا تناسلية، إنتاج وإفراز هورمونات تنظّم عمليات التكاثر، إلتقاء الخلايا التناسلية الذكرية مع الخلايا التناسلية الإنثوية وتطور الجنين في رحم المرأة.

يشتُمل جهاز تكاثر المرأة على: مبيض، أنابيب تنقل خلايا البويضة (قناة فالوب)، الرحم والمهبل. يشتمل جهاز تكاثر الرجل على: خصيتان، أنابيب تنقل الخلايا المنوية، قضيب وغُدد مساعدة.

في سن البلوغ، يبدأ إفراز هورمونات من المخ، ويبدأ تطور العلامات الجنسية الثانوية.

ابتداءً من سن البلوغ، تُنتُج عند الشباب خلايا منوية من خلايا أولية في الخصيتين. تَنْتُج الخلايا المنوية في أعقاب عملية التمايز، انقسامات الميتوزا والميوزا.

القسامان الأساسيان للخلية المنوية هما الرأس والذنب. تستطيع الخلايا المنوية أن تتحرك بشكل مستقل.

في سن البلوغ، يبدأ عند الشابة نضوج خلايا البويضة في المبيض، كما تبدأ دورة الحيض. تتم مراقبة دورة الحيض بواسطة نشاط دوري في الهيبوثالموس، الغدة النخامية، في المبيض والرحم. تشتمل دورة الحيض على عمليتين مركزيتين تحدثان في نفس الوقت: الأولى - نضوج خلية البويضة في المبيض وإباضة والثانية تحضير الرحم لاستيعاب الجنين.

الإخصاب - التقاء بين الخلية المنوية وخلية البويضة والاتحاد بينها - تحدث في أنبوب ناقل خلايا البويضة.

بعد أن يرتبط (يتجذر) الجنين في الطبقة المخاطية السميكة في جدران الرحم، يتطور كيسي عنين غشائيين- غشاء السلى وغشاء الكوريون.

المشيمة هي نظام تغذية، تبادل غازات وإبعاد فضلات.

تحدث ثلاث عمليات تطور في الجنين: انقسام الخلايا وهو، تمايز خلايا وانتظام خلايا في مبانس تُنتِج الأنسجة والأعضاء.

. يلد الطفل بعد حوالي 40 أسبوعًا ويتغذى من حليب أمه.

تعداد السكان في العالم كبير جدًا، أما تعداد وعشائر الثدييات الكبيرة فإنها تصغر وحتى تنقرض.

مصطلحات مهمة في الفصل

eلادة FSH

دورة الحيض

استروجن ماء (سائل) السَّلى

خصية آليات المردودية (موجب وسالب)

بلوغ جنسي المهبل

إباضة علامات جنسية أولية وثانوية

غدد حليب جنين

غو بروستتا

جُسَيْم أصفر قضيب

ديبلوئيد بروجسترون

هورمونات جنسية برولكتين

هورمونات مناسل أنبوب ينقل خلايا البويضة (قناة فالوب)

تغذية (جنين) أنبوب ينقل الخلايا المنوية

الغدة النخامية آلام الولادة

هيبوثالموس أغشية الجنين (غشاء السَّلى وغشاء كوريون)

حمل الرحم

إخصاب مخاط الرحم

بلوغ جنسي مبيض

تايز مشيمة

تنظيم هورمونالي سائل السّلى

جُرَيْب خلية البويضة

صفار خلية منوية

...

طوسطسطرون خلايا تكاثر (جاميتات، خلايا تناسلية)

كوريون



الفصل الرابع: تدخُّل في عمليات تكاثر الإنسان

قبل عشرات السنين، لم يستطع أزواج كثيرون أن ينجبوا أطفالًا لأسباب مختلفة، والحل الوحيد الذي اقتُرح عليهم أن يتبنوا أطفالًا. اليوم، يستطيع الطب الحديث أن يستعمل تكنولوجيا متطورة ناجحة لمساعدة أزواج كثيرون، لكي يُرزقوا بطفل منهم بطرق لم تكن ممكنة في الماضي.

تمَّ التدخل في عمليات التكاثر عند الإنسان بعدة مجالات: حل مشاكل الخصوبة، متابعة تطور الجنين وإيجاد عاهات (تشويهات) أثناء الحمل وطرق أخرى لتنظيم تعداد العائلة.

ما هي أسباب مشاكل الخصوبة؟

حوالي %15 من الأزواج الذين يخططون إنجاب طفلا إلى العالم، يكتشفون بعد محاولات كثيرة أنهم لا ينجحون في ذلك. قد يعاني كل واحد منهما من مشكلة معينة متعلقة بالخصوبة. تنبع هذه المشاكل من اضطرابات في إفراز الهورمونات الجنسية التي تُنظِّم نشاط جهاز التكاثر، أو من إضطرابات أخرى مثل إنسدادات مختلفة في الأعضاء التناسلية.

مشاكل الخصوبة الممكنة عند الرجال: عدد قليل من الخلايا المنوية أثناء القذف (في الحالة الطبيعية، يتم قذف حوالي 350 مليون خلية منوية، وإذا تم قذف خلايا منوية أقل من 5 ملايين، لا يتم الإخصاب)، حركة بطيئة للخلايا المنوية باتجاه البويضة، مبنى غير سليم للخلية المنوية، مشاكل في إنتاج وإفراز السائل المنوي وحدوث إنسداد في أحد الأنابيب التي تمر عبرها الخلايا المنوية. خلال الـ 60 سنة الأخيرة، طرأ انخفاض في تركيز الخلايا المنوية وفي قدرتها على الحركة. يعتقد الباحثون أن هذه الظاهرة تتأثر من التعرض لأضرار بيئية محيطة ولدرجات حرارة عالية، التدخين، تناول المشروبات الروحية، التوتر والضغط النفساني في حياة غير صحية.

مشاكل الخصوبة الممكنة عند النساء: إضطرابات في الإباضة، انسداد في الأنبوب الناقل لخلية البويضة، الذي يمنع انتقال خلية البويضة وإضطرابات في الذي يمنع انتقال خلية البويضة وإضطرابات في المتعاب الجنين في الرحم. كما يؤثر الضغط النفساني وسوء التغذية المستمر على خصوبة المرأة.

يمكن إزالة الإنسدادات في أنابيب الخلايا المنوية عند الرجل أو في الأنابيب الناقلة لخلايا البويضة عند الرجل بواسطة عمليات جراحية بسيطة. في حالة حدوث إضطرابات في إفراز هورمونات، الحلول المقترحة هي إضافة خارجية لهورمونات تشترك في نشاط جهاز التكاثر (الذي تعرَّفنا عليه في الفصل الثالث). مثلاً: يقترح الأطباء لقسم من الرجال علاج هورمونالي يزيد من كمية الخلايا المنوية أو من كمية السائل المنوي. ولقسم من النساء، يقترح الأطباء علاج هورمونالي ينظّم الإباضة.

تستطيع هذه العلاجات أن تحل مشاكل قسم من الأزواج، لكن يستصعب قسم من الأزواج في إنجاب أطفال إلى العالم.

يستطيع قسم من هؤلاء الأزواج أن يحققوا أحلامهم اليوم بواسطة تخصيب خارج الجسم.

د1. إخصاب خرج الجسم: حل لحلالات كثية تعاني من مشاكل في الخصوبة

يتم الإخصاب خارج الجسم في المختبر. نسمِّي هذا الإخصاب أيضًا "إخصاب في الأنبوب"، على الرغم من أنه يتم في صحن بتري. الإخصاب خارج الجسم مناسب للأزواج الذين خلاياهم المنوية وخلايا بويضة عندهم سليمة، لكن لسبب معين (مثلًا: أحد الأسباب آنفة الذكر)، لا يتم إخصاب طبيعي. يُستعمل الإخصاب خارج الجسم في الحالات التي تكون فيها أمراض وراثية في العائلة. وهي تُتيح فحص سلامة الجنين من ناحية وراثية في المراحل الأولى من تكوينه قبل أن يرتبط بمخاط الرحم.


1.13 مراحل عملية الإخصاب خارج الجسم

تصف الرسمة د - 1 مراحل الإخصاب خارج الجسم. في المرحلة الأولى، تحصل المرأة على علاج هورمونالي يؤدي إلى تطور عدة جُرَيْبات في نفس الوقت. نتيجة لذلك، تنضج في نفس الوقت عدة بويضات في نفس الدورة (أما في الحالة الطبيعية، تنضج بويضة واحدة فقط كل شهر). بعد أن تنضج خلايا البويضات، يتم ضخها (سحبها) من المرأة وإدخالها إلى وعاء فيه محلول مناسب للإخصاب.

في المرحلة الثانية، يضيفون الخلايا المنوية التي حصلوا عليها من الرجل إلى الوعاء الذي يحتوي على خلايا البويضة (إذا كان عدد الخلايا المنوية قليلًا، فإنهم يقومون بتركيزها)، ثم يضعون الوعاء في جهاز حاضن فيه ظروف مناسبة للإخصاب. تتحد الخلايا التناسلية دون مساعدة إضافية، لكن يتم ذلك خارج جسم المرأة.

في المرحلة الثالثة، تبدأ خلايا البويضة التي تمَّ تخصيبها في المختبر بإنقسام الميوزا وتتطور إلى أجنة. بعد عدة إنقسامات، تَنْتُج أجنة مكوَّنة من 4 أو 8 خلايا.

في المرحلة الرابعة، يتم فحص سلامة خلايا الجنين. إذا كانت خلايا الجنين سليمة، فإنهم يدخلون من 2-3 أُجنة صغيرة إلى رحم المرأة التي أُخرجت منها خلايا البويضة.



الرسمة د -1: مراحل في عملية الإخصاب خارج الجسم

اتضح من الخبرة التي تراكمت منذ أن بدأوا تنفيذ عمليات الإخصاب خارج الجسم أن احتمال حمل المرأة المعالجة وإنجاب طفل سليم جوالي %30. الجنين الذي يتطور في رحم الأم هو ابنهم البيولوجي للزوج، لأن البويضة والخلايا المنوية أخذت منهما. من هذه الناحية، لا يوجد فرق بين طفل "الأنبوب" وبين الطفل الذي تكوَّن بطريقة طبيعية.

بما أن الإخصاب بالأنبوب متعلق بتكنولوجيا دقيقة وباهظة وبعلاج هورمونالي مستمر يؤدي إلى معانة الأم بشكل كبير جدًا، فمن المعتاد أن يسحبوا من جسم المرأة خلايا بويضة أكثر من المطلوب لإنتاج حَمل واحد. يتم تخصيب جميع خلايا البويضات التي تمَّ سحبها، أما الأجنة الفائضة فإنهم يجمدونها في أجهزة خاصة في درجات حرارة منخفضة جدًا (℃196-)، وهكذا يمكن حفظها عدة سنوات لحمل إضافي في المستقبل.



جدير بالمعرفة

جائزة نوبل لمكتشف طريقة الإخصاب خارج الجسم

في سنة 2010 ، حاز البروفسور روبيرت ادواردس (Robert Edwards) من انكلترا على جائزة نوبل في الطب والفسيولوجيا على مساهمته في تطوير طريقة الإخصاب لبنو البشر خارج الجسم. طريقة الإخصاب خارج الجسم، كانت معروفة عند الثدييات - الفئران والأرانب- لكن ادواردس وجد الظروف المناسبة لإخصاب خارج الجسم خلايا بويضات أخذت من جسم إمرأة، وهكذا فتح الطريق لأزواج كثيرة أن تكون والدين. طفل الأنبوب الأول، هو لويز بارئون الذي وُلد في انكلترا في سنة 1978، ومنذ ذلك الحين، وُلدوا ملايين الأطفال بطريقة الإخصاب خارج الجسم.



🦚 سؤال د - 1

لكي يستمر تطور الجنين الذي نتَج في الإخصاب خارج الجسم، يجب إدخاله إلى الرحم. ماذا مكن الاستنتاج من ذلك؟



جدير بالمعرفة

تجميد خلايا تناسلية

يُتيح الحفاظ على حيوية خلايا في ظروف تجميد عميق (€196°-) أن نحافظ على الأجنة وعلى الخلايا التناسلية أيضًا - البويضات والخلايا المنوية. يتم حفظ الخلايا التناسلية في تجميد عميق، على سبيل المثال، في حالات مرض السرطان، عندما يُعالج المريض علاج كيميائي يهدد الخلايا التناسلية بالخطر. في هذه الحالات، يتم إخراج خلايا تناسلية قبل العلاج الكيميائي وتجمد في جهاز خاص (الرسمة د - 2). بعد الشفاء، يمكن إنتاج أجنة بواسطة إخصاب خارج الجسم من الخلايا التناسلية التي تمَّ تجميدها وزرعها في جسم الأم. وهكذا يمكن أن نساعد المرضى بعد شفائهم أن يكونوا والدين لأبناء أصحاء.



الرسمة د -2: أجهزة لحفظ خلايا فى تجميد عميق

الخلايا التي تبرعها رجال أصحاء، يتم حفظها في تجميد عميق في **بنك الخلايا المنوية** وهي متوافرة للنساء التي تحتاج تبرع خلايا منوية، مثل: النساء التي يعاني أزواجهن من خلايا منوية غير قادرة على إخصاب البويضة، أو نساء غير متزوجات ويرغبن أن تكون أمهات أحادية الوالدين.




2.13 تطبيقات الإخصاب خارج الجسم

تُتيح تكنولوجيا الإخصاب خارج الجسم استعمالات إضافية للاستعمالات التي ذُكرت في البند السابق.

إخصاب إصطناعي

عندما لا تنجح الخلايا المنوية في دخول خلية البويضة، فعندئذ يمكن تنفيذ إخصاب إصطناعي. يتم الإخصاب الإصطناعي بواسطة حقن خلية منوية واحدة داخل بويضة ناضجة بواسطة محقن دقيق جدًا (الرسمة د -3). الحقن لا يؤدى أي ضرر لخلية البويضة!

بعد الحقن، نضع خلية البويضة المخصبة داخل حاضنة فيها ظروف مناسبة للإنقسام. بعد حدوث عمليتى انقسام للجنين، نتأكد من أن الجنين سليم ونضعه في رحم الأُم.



الرسمة د-3: حقن خلية منوية داخل خلية بويضة

الفرق الأساسي بين الإخصاب خارج الجسم العادي وبين الإخصاب خارج الجسم الإصطناعي هو أنه في الطريقة الأولى، تدخل الخلية المنوية البويضة (الإخصاب) بطريقة تلقائية وعشوائية، أما في الإخصاب "الإصطناعي" - الاختيار ليس عشوائيًا. يختار منفذ التخصيب خلية منوية للإخصاب ويُدخلها بشكل إصطناعي داخل خلية البويضة.

الحاضنة

أحيانًا لا تستطيع النساء الحمل على الرغم من أن خلايا البويضة عندها سليمة. مثلًا: نساء لا يوجد لديهن رحم أو رحمهن غير سليم. الحل لهذه الحالات هو الحاضنة. بهذه الطريقة، يتم تخصيب بويضة المرأة مع خلية منوية من زوجها بإخصاب عادي خارج الجسم، لكن الجنين الذي بدأ تطوره خارج الرحم، يتم "زرعه" في رحم مرأة أخرى وافقت على أن تكون الحاضنة. قر الحاضنة بعلاج هورمونالي لتحضير رحمها لاستيعاب الجنين، حيث تحصل خلال العلاج على أقراص دواء تحتوي على هورمون الإستروجن الذي يؤدي إلى تطور الطبقة المخاطية للرحم، من خلال تزامن دورة حيضها مع الأم البيولوجية. فيما بعد، بالموازاة لنمو الأجنة في المختبر، تحصل الحاضنة على البروجسترون الذي يؤدي إلى إعداد الطبقة المخاطية للرحم لاستيعاب الجنين. يستمر العلاج بالدواء حوالي 8 أسابيع. بعد ذلك، تُنْتِج مشيمة الحاضنة هورمونات بكمية كافية وتُفرزها لاستمرار الحمل.

تنمي الحاضنة في رحمها طفلًا ليس لها، ومباشرةً بَعد الولادة تقدمه لوالديه البيولوجيين اللذين أُخذ منهما الخلية المنوية وخلية البويضة.

حل الحاضنة ليس سهلًا من ناحية قانونية وعاطفية، وهو يُلزم جميع الأطراف بالتوقيع المسبق على اتفاق بين الوالدين والحاضنة، حيث يشمل المبلغ الذي تحصل عليه الحاضنة مقابل جهودها. في سنة 1996، سُن في البلاد قانون الحاضنة الذي سُمي "قانون الاتفاقات لحمل الأجنة" (مصادقة الإتفاق وحالة المولود). يزوِّد القانون تعريفًا دقيقًا للظروف المطلوبة لمصادقة الحاضنة.

للمزيد عن

فحص صلاحية الأجنة، بتوسع فيما بعد.

🧨 سؤال د- 2

الطفيل الذي يولد لأم حاضنة يشبه من ناحية وراثية:

- 1. الأم الحاضنة والأب البيولوجي.
 - 2. الأم البيولوجية والحاضنة.
- 3. الأب البيولوجي والأم البيولوجية.
- 4. للثلاثة اللذين اشتركوا في العملية.

اختاروا الإجابة الصحيحة.

الحمل من تبرع خلية البويضة

تحتاج قسم من النساء لأسباب مختلفة، مثل: السن أو المرض إلى تبرع خلية بويضة (تبرع بويضات). هؤلاء النساء، لا توجد لديهن بويضات مناسبة للإخصاب، لكنها تستطيع أن تنمي في رحمها جنينيًا وأن تلد أيضًا. يُتيح الإخصاب خارج الجسم لهؤلاء النساء أن تحمل وأن تنجب طفلًا للعالم بواسطة خلية بويضة تتبرعها لها امرأة أخرى. خلية البويضة ليست من الأم، لكن الخلية المنوية التي تُخصبها من الأب، لذا الطفل هو النسل البيولوجي لأحد الوالدين، والأم تشعر شعور الحمل والولادة.

إيجاد خلل وراثي في الأجنة

اليوم، يُتيح التطور العلمي وطريقة الإخصاب خارج الجسم أن غيِّز خللًا وراثيًا في الجنين قبل أن يرتبط في الرحم، وهكذا غنع ولادة طفل يعاني من مرض وراثي خطير. الزوج اللذان كل واحد منهما يحمل نسخة واحدة لجين مرض وراثي معين، حيث يحدث المرض بواسطة جين واحد، يوجد احتمال كبير (%25) أن يولد لهما طفلًا يحمل في خلاياه نسختان من جين المرض، لذا يكون مريضًا عمرض وراثي. في هذه الحالات، يقترح الأطباء تنفيذ إخصاب عادي خارج الجسم، حيث تُعطى فرصة للزيجوت أن ينقسم ويُنتج 8 خلايا. في هذه المرحلة، يُخرج الأطباء خليتين من الجنين ويفحصون ما إذا يحمل الجنين نسختين من الجين المسؤول عن المرض الوراثي (يتم الفحص في كل خلية منفردة، لكي تكون إعادة للفحص). الأجنة التي لا تحمل نسختين من الجين المسؤول عن المرض، يتم إدخالها إلى الرحم.

هذه الطريقة التي بواسطتها نستطيع أن نجد قبل الحمل أجنة يهددها خطر تطور أمراض وراثية صعبة، أدت إلى انخفاض كبير جدًا في عدد الأطفال الذين يولدون مع أمراض وراثية. على الرغم من ذلك، يوجد أمراض وراثية، لم نجد لها حتى الآن الجين المسؤول عنها، أو أنها تحدث بواسطة عدة جينات، لذا لا توجد إمكانية لفحص أخطار هذه الأمراض على الجنين. أحد الأمراض الذي يمكن فحصه اليوم في الجنين هو مرض الطايزكس.



جدير بالمعرفة

مرض الطايزكس

مرض الطايزكس (Tay-Sachs) هو مرض وراثي يحدث نتيجة لنقص في إنزيم مسؤول عن العمليات الأيضية للدهنيات في المخ. يتطور المرض في سن الرضاعة ويؤدي إلى أضرار صعبة في المخ. يتوقف تطور هؤلاء الأطفال وموت معظمهم في السنوات الأولى من حياتهم. اليوم، يقترح الأطباء للأزواج الذين أصلهم أشكنازي أو شمال إفريقي أن يفحصوا ما إذا هم يحملون الأليل في خلاياهم، لأن تكرارية هذا المرض عالية نسبيًا عند هؤلاء الأزواج، وهكذا منعون ولادة طفل مريض. نسبة وجود الأليل المسؤول عن المرض عند اليهود من أصل أشكنازي هو 1:30 وعند اليهود من أصل شمال إفريقي هو 1:110، أما عند جميع السكان، التكرارية1:300 تقريبًا.

🦚 سؤال د - 3

لكي نفحص سلامة الجنين، نُخرج خليتين من بين خلايا الجنين الثماني. على الرغم من هذه العملية الجراحية، يستمر الجنين المكون من 6 خلايا في التطور السليم بشكل مطلق. ما هو السبب لذلك؟




فحص سلامة الأجنة خلال الحمل

خلال الحمل أيضًا، مكن أن نفحص ما إذا الجنين يتطور بشكل سليم وهل أجهزته سليمة. مكن تنفيذ ذلك بواسطة تصوير فوق صوتي (اولتراساوند)، فحص دم الأم بطرق بيوكيميائية وفحص خلايا الجنين الذي يتطور في الرحم بالميكروسكوب (المجهر). لكي نفحص ما إذا يوجد خلل في " أم عدة خلايا مبنى الكروموسومات أو ما إذا عددها غير سليم، يجب أن نعزل خا من الجنين وتوجيهها إلى وضع فيه انقسامات ميتوزا، لأنه فقط في نرى، عبر الميكروسكوب، الكروموسومات بشكل واضح، ويمكن أن نعدّها وأن نرى ما إذا هي سليمة.

كيف يمكن أن نفحص خلايا الجنين بواسطة ميكروسكوب دورا نؤدي إلى ضرر في الجنين ذاته؟ لهذا الغرض، نستعمل اليوم ا الطريقتين الآتيتين:

فحص سائل السلى


يتم هذا الفحص بين الأسابيع 15-20 للحمل وهو دارج الاستعمال حوالي 40 سنة (الرسمة د - 4). في سائل السلى الموجود حول الجنين، تتساقط خلايا من الجنين، لذا يمكن فحص الكروموسومات فيها. نُخرج بحذر كمية قليلة من سائل السلى الذي يعيش داخله الجنين، ثم نفصل خلايا الجنين عن السائل ونفحص فيها المكونان. لكي نقلص خطر إصابة الجنين بضرر، يتم سحب السائل خلال مشاهدته بواسطة جهاز الاولتراساوند.



الرسمة د -4: فحص سائل السلى

بعد أن نحث الخلايا التي أخرجناها إلى انقسام الميتوزا، يمكن أن نرى الكروموسومات عبر الميكروسكوب. لكي نفحص الكروموسومات، نصوِّر الخلية، "نقص" (بالحاسوب) الكروموسومات ونرتبها في أزواج متماثلة وفقًا لطولها وتفاصيل مبنى إضافية. بحسب الاتفاق العالمي السائد بين العلماء، لكل زوج من أزواج الكروموسومات المتماثلة يوجد ترقيم. في خلايا الإنسان، يوجد 22 زوجًا من الكروموسومات المتماثلة وزوج واحد من الكروموسومات الجنسية المشار إليهما بالحرفين x و y. تساعد عملية الفحص على إيجاد فائض أو نقص في الكروموسومات وأيضًا خلل في مبنى كروموسومات معينة.

تعرض الرسمة د-5 كروموسومات في خلية رجل فيها هيئة كروموسومات سليمة.



الرسمة د -5: هيئة كروموسومات سليمة في خلية رجل (رُتَّبت الكروموسومات بحسب أزواج متماثلة). صوَّرت الكروموسومات بواسطة ميكروسكوب ضوئي وهي مكبرة 5,000 ضعف تقريبًا

فحص خَمَلات غشاء كوريون

كما رأيتم في الفصل الثالث، خَملات غشاء الكوريون التي مصدرها من الجنين هي جزء من المشيمة (انظروا الرسمة ج -14). بين الأسابيع 10-12 أسبوعًا من الحمل، عكن أن نُخرج قطعة من خَملات الكوريون الموجودة في المشيمة. ونفحص في الخلايا التي أُخرجت دلالات لأمراض وراثية في الجنين. يتم فحص عدد الكروموسومات ومبناها كما هو الأمر في فحص سائل السلى.

عندما تكون حاجة لفحص خلايا الجنين، أي فحص من الأفضل أن ننفَّذ - فحص خَملات غشاء كوريون أو فحص سائل السلى؟ [آ] بعرض الجدول د-1 مقارنة بن الفحصن.

	_			
111 . 151	خملات الكوريون وفحص	رين فحص	حدمل د -1: مقلینة	

	فحص خَملات الكوريون	فحص سائل السلى
زمن الفحص	في مرحلة مبكرة من الحمل نسبيًا (الأسبوع 12-10)، قبل أن تشعر الأم بحركات الجنين والحمل لا يبدو للأنظار.	في مرحلة متأخرة من الحمل نسبيًا (الأسبوع 15-20). تشعر الأم بحركات الجنين والحمل يبدو للأنظار.
خطر الإجهاض في أعقاب	الخطر كبير نسبيًا (1:100).	الخطر صغير نسبيًا (1:200).
تنفيذ الفحص		
حسنات	إذا كان الجنين غير سليم، يمكن تنفيذ إجهاض. من ناحية جسمانية ونفسية، الإجهاض أسهل من الولادة.	في سائل السلى، تعوم خلايا مصدرها من الجنين فقط، ومن المؤكد أن الخلايا المفحوصة مصدرها من الجنين وليس من الأم.
سيئات	بالإضافة إلى خطر الإجهاض الكبير نسبيًا، يوجد خطر أن تُؤخذ بالخطأ خَملات كوريون من خلايا الأم. إذا كان الجنين أنثى، فمن الصعب أن نميًز الخطأ، وهناك إمكانية لإتخاذ قرار خاطئ.	إذا كان الجنين غير سليم، لا يمكن تنفيذ إجهاض في هذه المرحلة ويجب تنفيذ ولادة مبكرة. هذه الولادة هي صعوبة عاطفية وجسمانية للوالدين.

الوالدان هما اللذان يقرران الفحص الذي يجب تنفيذه، وما إذا يستمر الحمل في حالة اكتشاف مشكلة معينة في الجنين.

يوصي الأطباء اليوم بتنفيذ فحص سائل السلى للنساء التي أعمارها أكثر من 35 سنة. من المعروف في هذه الأعمار أن تكرارية خلايا البويضة التي تحتوي على 24 كروموسومًا كبيرة بالمقارنة للتكرارية عند النساء التي أصغر منها سنًا. في فحص خَملات الكوريون وفي فحص سائل السلى، نرى كروموسومات الجنين ويمكن أن نعرف بالتأكيد ما إذا هيئة كروموسوماته سليمة. يُتيح الفحصان تمييز أمراض وراثية في الجنين بواسطة فحص الكروموسومات بطريقة ميكروسكوبية. هذان الفحصان مهمان بالأساس، عندما يكون معروف في العائلة مرض وراثي أو عندما تكون الأم كبيرة السن. أحد الأسباب الشائعة لتنفيذ الفحص هو إيجاد أجنة تعاني من متلازمة داون.

ما هي متلازمة داون؟

الجنين الذي يحمل في خلاياه ثلاث نُسخ من كروموسوم رقم 21 بدل اثنان، فإنه يعاني من سلسلة أضرار جسمانية وعقلانية تشكّل معًا متلازمة داون (Down's Syndrome). يحدث الخلل في عدد الكروموسومات، في أعقاب خطأ خلال الميوزا (عادةً عند الأُم) الذي بسببه تَنْتُج خلية تكاثر فيها كروموسومان رقم 21 بدل كروموسوم واحد، ومجموع الكروموسومات هو 24 بدل 23 (n+1 كروموسومات). الجنين الذي يَنْتُج من خلية تناسل كهذه، يحصل على كروموسومين رقم 21 من أمه وعلى كروموسوم واحد من أبيه. هذا الجنين يكون فيه ثلاث نُسخ من الكروموسوم رقم 21 بدل اثنان، وعدد الكروموسومات في خلاياه تكون 47 بدل 46 (1+20 كروموسومات). بودنا أن نشير إلى أن هذا النوع من الخطأ، قد يحدث في كروموسومات أخرى أيضًا، لكن في معظم هذه الحالات، لا يتطور الجنين ويحدث إجهاض طبيعى.

الأطفال الذين يعانون من متلازمة داون، توجد لديهم درجات مختلفة من التخلف العقلي وعيوب حسدية مختلفة. عندما تكون درجة التخلف العقلي ليست كبيرة بشكل خاص، يمكن دمج هؤلاء الأطفال في العمل، المجتمع، كما يمكن إكسابهم مهارات حياتية تُتيح لهم إمكانية العيش بشكل مستقل وكبالغين. يتجند قسم قليل منهم كمتطوعين في الخدمة العسكرية.

بحسب البحث الذي أُجري في انكلترا ونُشر في سنة 2009، اتضح أن المعرفة المسبقة، ما إذا الجنين يعاني من متلازمة داون، أدت إلى انخفاض كبير جدًا في عدد الأطفال الذين يولدون مع هذه المتلازمة. لولا إمكانية تنفيذ هذه الفحوصات، فمن المتوقع أن تكون النسبة المئوية للأطفال الذين يولدون مع هذه المتلازمة عالية، لأن كثير من النساء تلد اليوم في سن متأخر فيه احتمال كبير أن تَنتُج خلايا فيها 24 كروموسومًا.

بسبب الأخطار المتعلقة بفحص خَملات الكوريون وبفحص سائل السلى، يوجد اقتراح أيضًا لإجراء فحوصات دم بيوكيميائية متنوعة أثناء سير الحمل، لأنها تستطيع أن تُشير إلى احتمال ولادة طفل مع متلازمة داون. تساعد هذه الفحوصات البيوكيميائية على اتخاذ قرارات بحذر حول ما إذا يحكن تنفيذ فحص خطير، لكن تزوِّدنا هذه الفحوصات بإجابة مؤكدة عن هيئة كروموسومات الجنين ويحكن أن تمنع ولادة طفل مصاب.

د2. التكنولوجيا تساعدنا لكنها تخلق صراعات أيضًا

الإمكانيات المتعددة والمتوفرة اليوم أمام الوالدين، تساعد على حل مشاكل، لكنها تُثير صراعات صعبة أيضًا. في هذا البند، نفحص قسمًا منها.

الإجهاض: نعم أو كلا.

الإجهاض الذي يمكن تنفيذه اليوم دون أن يشكّل خطرًا على الأم، أدى إلى النساء الحوامل التي لا ترغب في استمرار الحمل لأسباب معينة (صعوبات اقتصادية، فرق صغير في السن بين أطفال العائلة وما شابه) أن تختار عملية الإجهاض. يدعي هؤلاء الأشخاص أن للفرد الحق على جسده: في هذه الحالة، من حق المرأة أن تقرر الاستمرار في الحمل والولادة أو الإجهاض.

بالمقارنة مع ذلك، يرى أناس كثيرون أن عملية إجهاض جنين سليم، هي عملية غير أخلاقية وتعتبر قتل نفس.

لا يسمح القانون في إسرائيل عملية الإجهاض، إلا عندما يكون سببًا مقنعًا، مثل: مرض أو عاهة أساسية في الجنين، خطر الحياة على الأُم، أو خطر إصابة الأُم جسديًّا أو نفسانيًّا. بحسب القانون، يحتاج تنفيذ الإجهاض إلى موافقة لجنة مختصة تشتمل على أطباء مختصون وأخصائيين اجتماعيين.

يوجد للإجهاض جانب ديني. ترى الديانات الثلاثة - اليهودية، المسيحية والإسلامية الإجهاض بشكل متشابه: تسمح الديانات الإجهاض عندما يكون خطر حقيقي على حياة الأم. عندما يكون سبب الإجهاض آخر، مثل: تشويه أساسي في الجنين، أو ضائقة اقتصادية أو نفسية للعائلة، تختلف آراء الديانات وزعمائهم الروحيون عن بعضهم.

لمن ينتمى الجنين الذي تمَّ تجميده؟

كما ذكرنا من قبل، الأجنة الفائضة التي نتَجت في الإخصاب خارج الجسم، يتم تخزينها في تجميد عميق. قدرة التكنولوجيا التي تستطيع أن تحتفظ بجنين كبره أربع أو ثماني خلايا في ظروف تجميد، تُثير أحيانا صراعات غير بسيطة. الجنين الموجود في التجميد خارج جسم الأم، يمكن أن يتحول إلى نقطة خلاف بين الوالدين في حالة الطلاق أو الانفصال عن بعضهما. ماذا نعمل إذا أراد أحد الوالدين طفلًا، أما الوالد الآخر، فإنه يعترض على استعمال الأجنة؟ لمن تنتمي الأجنة المجمدة إذا توفي الوالدين؟ والأهم من ذلك: ما هي مصلحة الطفل الذي رما يولد؟

في الحمل الطبيعي، عندما يكون الجنين في رحم أمه، فهو جزء منها. لذا لا نستطيع اتخاذ قرارات تتضارب مع رغبات الأم. الأم، كما هو الأمر لكل شخص، يوجد لها حق أساسي: حق الشخص على جسده. من هنا يمكن الادعاء أنه لا يوجد حق لأي شخص أن يفرض الإجهاض على المرأة أو يمنعها من الإجهاض. لكن عندما يكون الجنين خارج جسم أمه، في تجميد عميق، فإن الأمر يختلف تمامًا.

🌓 صراع



أمامكم حدث في البلاد في سنوات التسعينيات من القرن العشرين: أراد والدين متزوجين أن ينجبا أطفالاً، احتاج الزوجين علاج إخصاب خارج الجسم. لم ينجح أي علاج معهما، لكن بقيت عدة أجنة تنتمي إلى الزوجين في التجميد. بعد مرور مدة زمنية، انفصل الزوجين عن بعضهما. تزوج الرجل مرة أخرى وأنجب أطفالاً. أما الزوجة التي لم تُنجب أطفالاً، فقد قررت أن تُنجب طفلاً أو اثنان من الأجنة التي جُمدت وحُفظت. عندما عرف زوجها السابق ذلك، اعترض بشدة وقام برفع دعوة في المحكمة.





أطفالهم.

أ. ما هي الإدعاءات التي يمكن أن يدعيها كل واحد من الزوجين، لكي يدعم مطلبه؟ ب. لو كنتم الحاكم في المحكمة، ما هو قرار الحكم الذي تصدرونه؟ علُّوا قراركم.

كثرة الأجنة: نعمة أم نقمة؟

يمكن أن يحدث صراع إضافي في أعقاب علاج أعدً لإنضاج جُرَيْبات. في هذا العلاج، يتم استعمال كميات كبيرة من الهورمونات التي تؤدي إلى نضوج عدة جُريبات وخروج عدة خلايا بويضات في نفس الوقت. إذا حدث إخصاب، فقد يؤدي إلى حمل متعدد الأجنة - خمسة أجنة وأكثر من ذلك. عندما يُنفَّذ الإخصاب خارج الجسم، يتم إدخال حوالي 3 أجنة على أمل أن يتطور واحد منها على الأقل، لكن قد تتطور الأجنة الثلاثة والحمل يكون متعدد المراحل. يُثير الحمل متعدد الأجنة صراعًا صعبًا: كلما كان عدد الأجنة كبيرًا، يزداد الخطر على الأم والأجنة ويقل احتمال تطور الأجنة بشكل سليم في الرحم. يوصي الأطباء على علاج يقلل عدد الأجنة (علاج يُسمًى تفريد الأجنة). يتم هذا العلاج في مرحلة مبكرة جدًا من الحمل، عندما تكون الأجنة في مراحل التطور الأولى. يضمن تقليل عدد الأجنة أن يكون تطور سليم لجنينين أو ثلاثة أجنة، أن تكون ولادة في الموعد وأن يقل خطر ولادة

خُدج. يعترض قسم من الأزواج على هذه التوصية، لأن تفريد (تقليل) الأجنة بحسب رأيهم يعتبر قتل

الصراع في هذه الحالة يكون صعب جدًا بشكل خاص، لأن العدد الكبير للأجنة في الرحم، يشكِّل خطرًا على حياة الأم.

نلاحظ أن التطبيقات التكنولوجية في الطب لها وجهان: من ناحية واحدة، تحل التكنولوجيا مشاكل ومحن صعبة، ومن ناحية أخرى، قد تُثير الحلول صراعات أخلاقية جديدة. من الأفضل أن نعي جميعنا معنى استعمال التكنولوجيا والمشاكل التي قد تنجم في أعقابها. قد تساعدنا المعرفة السابقة في مواجهة الصراعات التي قد تواجهنا خلال حياتنا.

د3. تنظيم تعداد العائلة

لم يكن في الماضي شائعًا تنظيم تعداد العائلة. كانت الأسباب لذلك كثيرة ومتنوعة، من بينها نسبة وفيات عالية لأطفال وأولاد صغار السن، الاعتقاد الديني وعدم المعرفة. أم اليوم، تنظيم العائلة شائع في مجتمعات كثيرة وفي أقسام واسعة في العالم. على الرغم من ذلك، يُثير هذا الموضوع نقاشًا.

في العصر الحديث، يصل معظم الأطفال سن البلوغ، ويستطيع الوالدين بوسائل محتلفة أن يحددوا عدد الأطفال وموعد ولادتهم. الحمل غير المنظم وغير المرغوب به، قد يكون عبئًا على العائلة والفرد وقد يؤثر سلبًا على الوليد. هناك عامل إضافي يؤثر على الرغبة في تنظيم كبر العائلة وهو التغيير في تقسيم الوظائف في العائلة: في عائلات كثيرة اليوم، يعمل الوالدين خارج البيت لتأمين قوة معيشتهم، لذا يعتبر التطور المهنى معيارًا في تخطيط كبر العائلة وموعد ولادة الأطفال.

طوِّرت وسائل لمنع الحمل، لكي نمنع حدوث حمل غير مرغوب به. من بين جميع الوسائل والطرق المقبولة، لا توجد أي وسيلة تمنع الحمل بشكل مطلق، كما أنه لا توجد طريقة واحدة مناسبة للجميع. كل طريقة لمنع الحمل لها حسناتها وسيئاتها. يجب أن يتم اختيار طريقة منع الحمل المناسبة بإرشاد وبإستشارة طبيةضجة.:

تعتمد طق منع الحمل بالأساس على المبادئ الآتية:

منع التقاءأو تلامس بين الخلايا المنوية وخلية البويضة الناضجة.

تغيير التوازن الهورمونالي في جهاز التكاثر.

منع زرع الجنين في الرحم.

العازل الذكري هو وسيلة لمنع الحمل وهو يمنع تلامسًا بين الخلايا المنوية الذكرية وخلية البويضة الناضجة. حسناته الكبيرة أنه متوافر كل الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر العازل الذكري وسيلة المنع الوحيدة التي بإمكانها أن تمنع انتقال أمراض عبر الأعضاء التناسلية. العازل الذكري هو كيس مطاطي ومرن، يضعه الرجل على القضيب وهكذا يمنع تلامس مباشر بين الأعضاء التناسلية للذكر والأنثى. نجاعة العازل الذري لمنع الحمل ليست عالية (حوالي %85)، لكن إذا كان هناك خوف أن أحد الزوجين يحمل مرض جنسي معين، بما في ذلك الإيدز، فالعازل الذكري هو أنسب وسيلة لتحقيق الهدفين. في نفس الوقت، يجب التذكر أن العازل الذكري قد يتمزق أو تتسرب منه خلايا منوية وعندئذ لا قيم له بتاتًا.

الغشاء الحاجب هو وسيلة منع حمل إضافي يمنع التلامس بين الخلايا المنوية وخلية البويضة الناضجة، وعلى نقيض العازل الذكري فهو معد للمرأة. الغشاء الحاجب هو حاجز مصنوع من مادة اصطناعية يُضع على سطح عُنق الرحم، لكي يمنع دخول خلايا منوية إلى الرحم.



استخدام الغشاء الحاجب أقل استعمالًا من العازل الذكري. نجاعته قليلة، ولكي نحسِّن نجاعته، يوصي الأطباء استعمال وسائل أخرى بالإضافة لاستعمال الغشاء الحاجب.

الأقراص لمنع الحمل هي وسيلة تُغيِّر التوازن الهورمونالي في جهاز التكاثر. الأقراص هي الوسيلة الأكثر نجاعة لمنع الحمل (تُقدر نجاعتها حوالي %100)، شائعة جدًا، لكنها لا تمنع العدوى بأمراض تنتقل خلال ممارسة العلاقات الجنسية. يوجد أنواع أقراص مختلفة، لكنها تعمل على نفس المبدأ تقريبًا، جميعها تحتوي على هورمونات من مجموعة الإستروجن أو من مجموعة البروجسترون التي تؤثر وتهنع الإباضة (عمليًا، تمنع الارتفاع الحاد في مستوى الهورمون لله الدم الذي يؤدي إلى الإباضة). إذا لم تتم الإباضة، لا يحدث حمل. تُؤخذ الأقراص لمدة 21 يومًا وخلالها تتطور الطبقة المخاطية للرحم بتأثير الهورمونات الموجودة في الأقراص. بعد مرور 21 يومًا، تتوقف المرأة عن تناول الأقراص لمدة 7 أيام ونتيجةً لذلك تتساقط الطبقة المخاطية للرحم ويحدث نزيف. هذا يعني، تَنْتُج دورة حيض اصطناعية دون إباضة.

استعمال كل نوع من الأقراص يختلف عن الآخر، لذا من المهم جدًا التشديد على تناول الأقراص بحسب التعليمات. قد تكون تأثيرات جانبية سلبية للأقراص المختلفة، لذا بعد الإستشارة الطبية التي تمَّت فيها ملاءمة قرص منع الحمل المناسب للمرأة، من المهم متابعة تأثير القرص على المرأة والتأكد من أن القرص مناسب لها.

الأقراص الموجودة اليوم للاستعمال مُعدَّة للمرأة فقط. خلال السنوات، توجد محاولات لإنتاج أقراص للرجل، لكن لا توجد حتى الآن معلومات كافية حول نجاعة الأقراص التي طُوِّرت حتى الآن للرجل واستعمالها قلىل حدًا.

الجهاز داخل الرحم هو وسيلة منع حمل عنع من زرع الجنين في الرحم. هذا الجهاز مصنوع من مادة بلاستيكية، أو من نحاس، أو من فولاذ لا يصدأ، حيث يتم إدخاله إلى تجويف (فراغ) الرحم بطريقة طبية، وعكن أن يبقى في الرحم لعدة سنوات. يغيِّر هذا الجهاز الطبقة المخاطية للرحم وعنع من زرع الجنين في الرحم. نجاعة هذا الجهاز لمنع الحمل عالية (حوالي %95)، لكنه غير مناسب للنساء التي لم تلد وهو بعاجة إلى مراقبة وإشراف طبى.

🥊 سؤال د -5

لا تتم الإباضة خلال الحمل أو نتيجةً لتناول أقراص لمنع الحمل. اشرحوا المشترك للحالتين واشرحوا كيف يتم منع الإباضة فيهما؟

👣 سؤال د - 6

- أ. اقرأوا القطعة التي تبحث أقراص منع الحمل، ثم اذكروا حقيقتين بيولوجيتين تدل على أن هذه الأقراص أُعدت للنساء فقط.
- ب. اعتمدوا على ما تعلمتموه عن إنتاج الخلايا المنوية وأدائها، ثم اذكروا، ماذا يمكن أن يكون مبدأ نشاط هذا القرص عند الرجل؟ اشرحوا.
- ت. يحاول باحثون تطوير قرصًا للرجل لمنع الحمل عند النساء: يتناول الرجل كل يوم قرصًا واحدًا (بشكل مؤقت)، لكي عنع إنتاج الخلايا المنوية. هل من المهم، بحسب رأيكم، أن يتم تطوير قرصًا من هذا النوع؟ علّلوا.



جدير بالمعرفة

"الأيام المضمونة" "ليست مضمونة"!

كما تعلمتم في الفصل الثالث، في اليوم الـ 14 من الدورة الشهرية (دورة الحيض)، تبدأ الإباضة ومنذ تلك اللحظة ولمدة حوالي 24 ساعة، تكون البويضة مستعدة للتخصيب. وبعد ذلك تتحلل إنْ لم تَخصب. يعتقد أشخاص كثيرون أنه يمكن منع الحمل بواسطة استعمال الطريقة المسماة" الأيام المضمونة". بهذه الطريقة، تتم ممارسة العلاقة الجنسية فقط في الأيام التي لا يحدث فيها إخصاب. في كل شهر، يوجد يوم واحد مناسب لحدوث الإخصاب. من المهم أن نذكر أن الخلايا المنوية تبقى حيوية لمدة 4 أيام تقريبًا، وهذا يعني أنه إذا كانت خلايا منوية موجودة في الرحم من 3-2 أيام قبل الإباضة، فإنها تكون قادرة على تخصيب خلية البويضة ونتيجة لذلك يتطور حمل. لذا يجب الامتناع عن القيام بعلاقة جنسية حوالي 4 أيام في كل شهر.

كما رأينا، عدد أيام دورة الحيض غير موحد حتى عند نفس المرأة. بالطبع لا نستطيع الاعتماد على العدد 28 (أيام) الذي هو معدل مدة دورة الحيض، وهو يعتمد على عدد كبير جدًا من دورات الحيض الحقيقية لعدد كبير جدًا من النساء. واضح أنه عندما تكون مدة الدورة ليست 28 يومًا، فإنَّ الإباضة لا تبدأ في اليوم الـ 14، لذا من الصعب أن نعرف توقيت الإباضة. من الصعب أن نفهم، لماذا ما زالت هذه الطريقة شائعة، على الرغم من أنه بات معروفا أنه لا مكن الاعتماد عليها (نجاعتها حوالي %70). هناك حالات حمل كثيرة غير مخطط لها وهي نتيجة للإعتماد على "الأيام المضمونة".



المواضيع الأساسية في هذا الفصل

ينجح الطب الحديث اليوم بالدمج مع التكنولوجيا المتقدمة أن يساعد أزواج كثيرة تعانى من مشاكل إنجاب أطفال أن ترزق أطفال بطرق مختلفة لم تكن ممكنة في الماضي.

الإخصاب خارج الجسم هو إخصاب يتم خارج جسم المرأة. وهو مناسب للأزواج الذين لا ينجحون لأسباب معينة في إنجاب أطفال بطريقة طبيعية، كما أنه مناسب لحالات تكون في العائلة أمراض وراثية، مكن فحصها في مراحل مبكرة بعد الإخصاب.


يوجد استعمالات إضافية كثيرة لتكنولوجيا الإخصاب خارج الجسم، مثل: الإخصاب الإصطناعي، حاضنة الحمل، حمل من تبرع خلية بويضة وإيجاد عيوب وتشويهات وراثية في الجنين.

خلال الحمل، مكن أن نفحص سلامة الجنين بواسطة فحص خُملات الكوريون أو فحص سائل السلي. الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة اليوم للإنسان، تساعد على حل مشاكل، لكنها تُثير صراعات صعبة. الوسائل الشائعة لمنع حمل غير مرغوب به: العازل الذكري، الأقراص والجهاز داخل الرحم. العازل الذكري هو أيضًا وسيلة لمنع العدوى بأمراض تُنقل بواسطة ممارسة الجنس مثل مرض الإيدز. طريقة "الأيام المضمونة" هي طريقة غير مضمونة بتاتًا لمنع الحمل.

مصطلحات مهمة في هذا الفصل



وسائل لمنع الحمل
بنك الخلايا المنوية
أقراص لمنع االحمل
إجهاض
إخصاب خارج الجسم
إخصاب إصطناعي
تجميد خلايا تناسلية
تجميد خلايا تناسلية
أجنة فائضة
طائل السلى
تنظيم تعداد العائلة
تبرع خلايا البويضة (بويضات)





الفصل الخامس: تكاثر الحيوانات

تكاثر تزوجي (جنسي)

تعلّمنا في الفصلين الثالث والرابع عن تكاثر الإنسان بشكل مفصّل. في هذا الفصل، نَصف التباين الكبير الموجود بطرق التكاثر التزاوجي للفقريات والملاءمة بين طرق تكاثرها وبيئتها الحياتية.

أُعدَّ قسم من هذا الفصل لتكاثر الحيوانات من مجموعة الفقاريات. الفقاريات هي حيوانات ذات عمود فَقري مكوَّن من فقرات ومن هنا جاء اسمها. تشتمل الفقريات على خمسة أقسام: الأسماك، البرمائيات، الزواحف، الطيور والثدييات.

ه1. صوب التكاثر

تبدأ مسيرة الحيوان منذ ولادته وتنتهي بموته. في أي سن يبدأ الفرد بالتكاثر؟ هل يتكاثر في موسم معين أم في كل موسم في السنة؟

ه1.1 البلوغ الجنسي

معظم الحيوانات لا تكون مستعدة للتكاثر مباشرة مع بداية حياتها. في أنواع كثيرة، يكون جهاز التكاثر موجود أثناء الولادة، لكن لا يكون فعالًا (كما هو الأمر عند الإنسان). يحتاج الجهاز إلى عمليات تطور، لكي ينفِّذ أداءه، المرحلة في دورة الحياة التي يستطيع منها الفرد أن يتكاثر بتكاثر تزاوجي نسميها تكاثرًا جنسيًّا. سن البلوغ الجنسي خاص لكل نوع بيولوجي (species) ويتم تحديده بحسب عوامل داخلية - وراثية مثل معدل الحياة ويتأثر جدًا من عوامل خارجية - البيئة المحيطة، مثل: درجة الحرارة وتوافر الغذاء (جدول ه - 1).

لة ومعدل حياتها	من انواع مختلف	, لثدييات	الجنسي	البلوغ	2 - 1: سن	جدول ه
-----------------	----------------	-----------	--------	--------	-----------	--------

תוחלת החיים הממוצעת (בשנים)	سن البلوغ الجنسي	النوع البيولوجي
2-3	شهران	الفأر
50	7-8 سنوات	قرد الشمبانزي
65 (المعدل العالمي)*	صبية 13-9 سنة صبي 11-15 سنة	الإنسان
60	15 سنة	الفيل

^{*} معدل حياة الإنسان في إسرائيل والدول المتطورة أعلى من المعدل العالمي وهو يصل حوالي 80 سنة.

 $\frac{1}{2}$ يكن أن نرى في الجدول ه - 1 أن هناك علاقة بين سن البلوغ الجنسي ومعدل الحياة: عادةً الحيوانات التي عمرها طويل، تصل البلوغ الجنسي في وقت متأخر بالمقارنة مع الحيوانات التي معدل حياتها قصير.

تتكاثر معظم الفقريات عدة مرات خلال حياتها. تختلف الأنواع عن بعضها في عدد مرات التكاثر خلال حياتها، لكن يوجد أنواع شاذة مثل أسماك السلمون التي تتكاثر مرة واحدة خلال حياتها.



جدير بالمعرفة

مرة واحدة تكفي

النشوء والارتقاء: نسبة مئوية صغيرة من أسمك السلمون تنجح في العودة إلى مكان ولادتها وتتكاثر فيه. العملية طويلة ومنهكة وهي مثال لقوة الانتخاب الطبيعي.

الفكرة المركزية

تقضي أسماك السلمون الشائعة على شواطئ شمال أمريكا وشمال أوروبا سنوات حياتها الأولى في جداول ماء عذبة. بعد مرور 2-3 سنوات، تخرج إلى مياه المحيط، حيث تصل هناك إلى البلوغ الجنسي. وبعد مرور عدة سنوات، تعود أسماك السلمون إلى نفس جدول الماء الذي قضت فيه سنوات حياتها الأولى (الرسمة ه 1). الرحلة التي طولها مئات وآلاف الكيلومترات، من المحيط إلى جدول الماء وسباحتها عكس التيار في مرتفع جدول الماء تؤدي إلى نفوذ قواها وكثير منها لا تبقى على قيد الحياة. بالإضافة إلى ذلك، الدببة التي تعيش في تلك المناطق، تنتظر الأسماك المنهكة، لكي تفترسها مع قدوم الشتاء. الأفراد القليلة التي تنجح في الوصول إلى مكان ولادتها، تتكاثر وقوت. الطريقة العجيبة التي تستطيع بواسطتها أسماك السلمون أن تميّز مكان ولادتها وتعود إليه بعد عدة سنوات، غير واضحة تمامًا حتى الآن.





الرسمة ه -1: على اليمين - أسماك السلمون تسبح في مرتفع جدول الماء، على اليسار - دُب يلتهم اسماك السلمون

ه 2.1 موسم التكاثر

تكاثر الإنسان غير متعلق بموسم معين، بل يمكن أن يتم كل السنة. أما معظم أنواع الحيوانات، حتى بعد وصولها البلوغ الجنسي، لا تستطيع أن تتكاثر كل السنة، بل تستطيع في موسم تكاثرها فقط. يتأثر التكاثر في اليابسة بشكل كبير جدًا من التغيُّرات في البيئة المحيطة التي من تنبع من المواسم (فصول السنة): على الأغلب، يكون موسم تكاثر كل نوع في وقت مناسب للأفراد، حيث تُولد هذه الأفراد في موسم فيه غذاء متوافر وطقس مريح. عند البرمائيات، على سبيل المثال، يتم تحديد موعد التكاثر بالأساس بحسب موعد هطول الأمطار وكمية الماء في الأنقوعة الشتوية وأيضًا بحسب درجة حرارة البيئة المحيطة.

من الجدير بالذكر أن هناك أنواع زواحف تعيش في مناطق استوائية لا يوجد فيها فروق كبيرة بين فصول السنة، لذا تتكاثر هذه الزواحف طيلة أيام السنة.

<mark>موسمية تكاثر الحيوانات،</mark> انظروا الفصل السابع صفحة 146، الفصل الثامن

في معظم أنواع الحيوانات، مكن أن غيِّز تغيُّرات موسمية في جهاز التكاثر، حيث تتأثر من عوامل بيئية محيطة، مثل: طول النهار (عدد ساعات الإضاءة)، درجة الحرارة، توافر الغذاء وجودته وغير ذلك.



جدير بالمعرفة

تأثير الضوء على تكاثر العصافير

تمُّ بحث تأثير عوامل البيئة المحيطة على جهاز التكاثر بشكل عميق. في سنة 1924، أجرى الباحث الكندى ويليام روان (William Rowan) أحد الأبحاث الرائدة في هذا المجال. في هذه التجربة، وضع الباحث مجموعتي عصافير من نفس النوع البيولوجي في أقفاص: زاد الباحث عدد ساعات إضاءة مجموعة التجربة بواسطة الإضاءة الإصطناعية، أما المجموعة الضابطة فلم تحصل على علاج إضافي. بإستثناء إضافة الإضاءة، أعطيت نفس الظروف للمجموعتين. بعد مرور وقت معين، عندما تمُّ فحص ذكور العصافير من المجموعتين، وُجد في مجموعة التجربة ازدياد ملحوظ في كبر خصية الذكور بالمقارنة مع كبر خصية الذكور في المجموعة الضابطة. استنتج الباحث أن عدد ساعات الإضاءة (وفي الظروف الطبيعية - طول النهار الذي يتغيَّر مع فصول السنة) هو العامل الذي يؤثر بشكل كبير وملحوظ على التغيُّرات الموسمية في جهاز التكاثر

يتم تطبيق معرفة تأثير البيئة المحيطة على عملية التكاثر في المزارع بشكل عملى. مثلًا: في أقنان الدجاج، تُستعمل إضاءة اصطناعية لخلق نظام إضاءة مدته من 14-16 ساعة إضاءة يوميًا خلال كل السنة. تساعد هذه العملية المزارعون أن يتم تزويد البيض كل السنة.



تدخُّل الإنسان في تكاثر *الحيواناتُ،* انظرُوا الفُصل السابع صفحات 146-151.



تلد أنواع ثدييات تعيش في مناطق صحراوية، في فصل الشتاء بالأساس. أما أنواع ثدييات تعيش في مناطق معتدلة، فإنها تلد بالأساس في فصلى الربيع والصيف. اشرحوا العلاقة بين موسم الولادة والظروف السائدة في بيت التنمية.

ه 3.1 علامات جنسية ثانوية

عند الإنسان، من السهل أن مُيِّز بين الرجال والنساء بفضل الفروق في العلامات الجنسية الثانوية. هذه الظاهرة معروفة عند قسم من الحيوانات أيضًا. في كثير من الأحيان، تكون الذكور البالغة ملونة و "مزركشة" أكثر من الإناث. اللبدة (شعر حول العنق) التي تميِّز الأسد البالغ، قرن الغزال الذكر وبالطبع الذنب الرائع للطاووس الذكر، جميعها أمثلة لعلامات جنسية ثانوية.





الرسمة ه -2: القرون علامة جنس ثانوية عند الغزلان البرية في الكرمل. على اليمين: تمتلك الذكور البالغة قرون، على اليسار: الإناث وصغارها لا تمتلك قرون

ما هي مساهمة العلامات الجنسية الثانوية في نجاح عملية التكاثر؟

تساهم العلامات الجنسية الثانوية في التمييز بين أفراد صغيرة السن (لا تكون قادرة على التكاثر) وأفراد بالغة السن وللتمييز بين الذكور والإناث أيضًا. يقلل هذا التمييز من احتمال الخطأ في تمييز الذكر أو الأنثى المناسب لعملية التكاثر وهكذا يتم توفير الطاقة.

ه 4.1 اتصال بين الذكور والإناث

العامل المهم في نجاح عملية التكاثر هو إلتقاء منسق وتكوين علاقة بين الذكور والإناث التي تنتمي إلى نفس النوع البيولوجي. كيف تتكون هذه العلاقة؟

في موسم تكاثر أنواع معينة، يطرأ تغير في الشكل، السلوك أو في إثنيهما. من خلال هذه التغيرات، تبث الذكور والإناث إلى بعضها البعض إشارات على استعدادها للتكاثر. تُستخدم هذه الإشارات (بالإضافة إلى العلامات الجنسية الثانوية) للاتصال وبواسطتها تستطيع الأفراد أن تجد بعضها. الاتصال بين الذكر والأنثى مهم بشكل خاص عند الحيوانات التي تعيش بشكل منعزل خلال فصول السنة الأخرى. عادة، تساعد هذه الإشارات الذكر على أن يبين "جودته" كزوج أفضل للتكاثر من الآخرين، لكي يقع الاختيار عليه من قبل الإناث.

جميع السلوكيات المتعلقة بجذب الذكر أو الأنثى نسميها مغازلة. عند معظم الحيوانات، الذكر يغازل والأنثى تختار. في موسم التكاثر، عند أنواع كثيرة، يحدث تنافس شديد بين الذكور على تخصيب الإناث، حيث تنتهى أحيانًا في إصابات وجرح الذكور المتنافسة.

يتم الاتصال بين الذكر والأنثى بوسائل مختلفة كما هو معروض في الجدول ه - 2، في الصفحة القادمة.

جدول ه-2: اتصال بين الذكور والإناث من أجل التكاثر

أمثلة	نوع الاتصال
مبان وألوان ذكر الفريجتا الكبير (Great frigate) ينفخ صدره الأحمر أمام الأُنثى. لون رأس الحرذون الصيني، الذي هو بُني خلال معظم السنة، يتغيَّر في موسم التكاثر ويتحول إلى أزرق. يفرش الطاووس الذكر ذنبه أمام الأنثى.	المنظر الخارجي
سلوك (المغازلة) • يقف العقرب الذكر أمام الأنثى ويحاول أن يمسك مقرضها. إذا كانت الأنثى مستعدة للتزاوج، فإنها تستجيب للذكر. يُحضِر أحد أنواع العصافير غذاءً اصطاده ويقدمه "هدية" للأنثى. يقوم اللقلق والرهو بتنفيذ رقص معقد جدًا كجزء من عملية المغازلة.	
يُخرج الضفدع الذكر صوتًا تعرفه الإناث من نفس النوع فقط. ذكور العصافير المغردة مثل الشحرور، معروفة بتغريدها الجميل الذي يجذب إليها الإناث. تُخرج الحيتان أصواتًا في موسم المغازلة. تُغيِّر الصراصير وتيرة وشدة صرصرتها. صوت قدم الغزال البالغ أعمق من صوت قدم الغزال صغير السن ووتيرة خطواته أسرع.	الصوت
الكلاب (الأنثى) التي تكون في حالة شبق، تفرز في البول مادة لها رائحة خاصة تسمَّى الفرومون الذي يجذب إليها كلاب ذكور. تفرز إناث الأسماك فرومون إلى الماء وكرد فعل إليها تفرز الذكور خلايا منوية إلى الماء. الفيلة والناقة (الإناث) تجذب الذكور بمساعدة رش البول. تتذوق الذكور البول وتعرف ما إذا الإناث مستعدة للتزاوج والحمل.	كيميائي



ذكر الفريجتا ينفخ صدره



طاووس ذكر يفرش ذنبه



👣 سؤال ھ- 2

مّعنوا في الجدول ه - 2 واذكروا:

أ. أي وسائل اتصال تُستعمل لإيجاد القرين (الذكر أو الأُنثى)؟ ب. أي وسائل اتصال تُستعمل لاختيار فرد معين للتزاوج وليس فرد آخر؟

مصطلحات

فرومون

الفرومونات هي مواد لها رائحة وتُستعمل للاتصال بين الأفراد من نفس النوع البيولوجي. تُفرز الفرومونات في العرق، البول واللعاب من فرد معين وتُستوعب بواسطة مستقبلات في خلايا حسية لأفراد أخرى من نفس النوع البيولوجي. يُثير استيعاب الفورمونات رد فعل عند الفرد المستوعب. تُستعمل الفرومونات لتحديد منطقة النفوذ (إقليم)، للتحذير من الأخطار ولإيجاد الزوج (الذكر أو الأُنثى). ليس عشوائيًا أن يذكرنا اسم الفورمونات بالهرمونات التي تُستعمل للاتصال بين أعضاء داخل الجسم، لكن الفورمونات تُستعمل للاتصال بين الأفراد.

ه2. تكاثر حيوانات مائية

تنوع الفقريات في الماء كبير جدًا ويمكن أن نجد عندها طرق تكاثر مختلفة. معظم أنواع الأسماك والبرمائيات لها أجهزة تكاثر بسيطة والإخصاب فيها هو إخصاب خارجي - يتم الإلتقاء بين الخلايا داخل الماء وخارج جسمي الذكر والأنثى. خلايا التناسل والجنين الذي يتطور بعد الإخصاب، لا تتعرض إلى خطر الجفاف. لكن هناك خطورة أن تنجرف الخلايا التناسلية مع تيار الماء وتتبعثر، وهكذا يقل احتمال الإلتقاء بينها والإخصاب.

ما الذي يزيد من احتمال الإلتقاء بين خلايا تناسلية مناسبة عندما يكون الإخصاب خارجيًا؟ وحدوث يوجد عدة عوامل تزيد من احتمال الإلتقاء بين الخلايا التناسلية من نفس النوع البيولوجي وحدوث الإخصاب:

- 1. الكمية الهائلة للخلايا التناسلية (ملايين كثيرة) التي تنطلق أثناء موسم التكاثر، تزيد من احتمال الإلتقاء والإخصاب.
 - 2. الأفراد التي تتكاثر بين بعضها، تعيش على الأغلب متجاورة.
 - 3. في كل عشيرة، تنطلق الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية إلى الماء في نفس الوقت تقريبًا.
 - 4. تساعد وسائل الاتصال الصوتية، الكيميائية والبصرية على إلتقاء الذكور والإناث.
 - 5. تساعد وسائل الاتصال الكيميائية على إلتقاء الخلايا المنوية وخلايا البويضة واتحادها.

هـ1.2 تكاثر الأسماك

يشتمل جهاز تكاثر السمكة الأنثى على زوج مبيض في داخله تُنْتُج خلايا البويضة وعلى زوج أنابيب نقل دقيقة، حيث ينتهي الأنبوبان معًا في فتحة جنسية خارجية. ويشتمل جهاز تكاثر السمكة الذكر على خصية في داخلها تَنْتُج خلايا منوية وعلى زوج أنابيب نقل دقيقة نسميها أنابيب الخلايا المنوية، حيث ينتهي الأنبوبان معًا في فتحة جنسية خارجية (الرسمة ه - 3).

في موسم التكاثر، تَنْتُج خلايا تناسلية في المبيض والخصية بكميات هائلة ويتم قذفها إلى الماء عبر فتحة الجنس الخارجية. يوجد أنواع أسماك، في موسم التكاثر، تكبر أعضائها التناسلية لدرجة أنها تحتل معظم فراغ (جوف) البطن. يصل وزن أعضائها التناسلية في هذه الفترة إلى %25-%40 من وزن الجسم!






الرسمة ه - 3: جهاز التكاثر في الأسماك

خلايا بويضة الأسماك، لا يوجد لها غلاف (باستثناء غشاء الخلية)، دائرية وتحتوي على صفار يُستخدم لتغذية الجنين الذي يتطور

من خلية البويضة المخصبة. عدد خلايا البويضة التي تَنْتُج في جسم الأنثى كبير جدًا، لكن الخلايا المنوية التي تَنْتُج في جسم الأنثى كبير جدًا، لكن الخلايا المنوية بالملايين. الخلايا المنوية صغيرة جدًا وهي مثل خلايا البويضة التي تستطيع أن تعيش في بيئة محيطة رطبة فقط. كل خلية منوية لها "رأس" وسوط له قدرة على الحركة. بمساعدة السوط، تستطيع الخلية المنوية أن تتقدم في الماء وتصل خلية البويضة.



سمكة السلمون تفقص من البيضة

الفكرة المركزية

التجانس وإلتباين: أنواع القرش هي أسماك، لكن إخصابها داخلي. تتطور صغار السن في البيوشُ داخل جسم

بعد إطلاقها من الجسم، تحافظ الخلايا التناسلية على حيويتها لعدة دقائق حتى عدة ساعات. هذه الفترة الزمنية فرصة لا تعوض لإلتقاء واتحاد الخلايا التناسلية من كلا الزوجين من نفس النوع البيولوجي (species). احتمال إلتقاء خلايا تناسلية مناسبة في بيئة محيطة مفتوحة مثل البحر هو صغير نسبيًا وبالطبع لا يوجد شيء عنع إلتقاء عشوائي بين الخلايا التناسلية لأنواع بيولوجية مختلفة التي من المعروف أنها لا تؤدي إلى إخصاب.

بعد الإخصاب، يصبح غشاء خلية البويضة قاسيًا قليلًا وهكذا منع دخول خلايا منوية إضافية.

جدير بالمعرفة

إخصاب داخلي في الماء

بالمقارنة مع معظم الخلايا التي يتم فيها إخصاب خارجي، في عدة أنواع أسماك، الإخصاب داخلي. على سبيل المثال، معظم أنواع أسماك القرش (حوالي %70 من الأنواع) التي فيها الذكر ينقل الخلايا المنوية إلى داخل جسم الأنثى، تتطور في بطن الأنثى أفراد داخل البيض. في معظم الأنواع، البيضة التي يتطور في داخلها الجنين، تحتوي على كمية صفار كبيرة جدًا، لكي تزوِّد الجنين احتياجاته. في نهاية تطور الأجنةِ، تُطلق الأفراد المستقلة من جسم الأنثى. هذه الظاهرة التي تتطور فيها الأجنة داخل جسم الأم وتخرج من جسمها كأفراد حية بعد أن أكملت تطورها نسمِّيها تفريخًا.

ه 2.2 تكاثر البرمائيات

البرمائيات إحدى مجموعات الفقريات. الضفادع والعلاجم هي المعروفة لنا كثيرًا من بين البرمائيات. تقضى البرمائيات معظم حياتها البالغة في اليابسة، لكنها متعلقة بالبيئة المحيطة المائية (كالانقوعة)

لتكاثرها. وهذا السبب لكونها تعيش بالقرب من بيوت التنمية المائية. في موسم التكاثر، تضع البرمائيات الخلايا التناسلية في الماء. يتم الإخصاب الخارجي وتطور الأجنة في البيئة المحيطة المائية. في أنواع الضفادع والعلاجم، نجد "تطوير" ملاءمة بين الزمن والمكان لإفراز الخلايا التناسلية. في هذه الأنواع، يمسك الذكر الأنثى ويحتضنها، يركب على ظهرها في الماء، يسبح معها ولا يتركها (الرسمة ه - 4). عندما تُطلق خلايا البويضة من فتحة القناة، يفرز الذكر الخلايا المنوية إلى الماء.

في البرمائيات، الفرد الذي يخرج من خلية البويضة المخصبة نسميه شرغوفا. تمر الشراغيف تغيّرات تدريجية حتى تتحول إلى برمائيات بالغة.



الرسمة ه - 4: "تزاوج" في العلجوم. انتبهوا! الذكر أصغر من الأنثى المليئة بالآف خلايا البويضة.

علم (بيسة. التنوع البيولوجي - يشكل هدم بيوت التنمية الخاصة خطرًا على استمرار بقاء الأنواع، من خلال إلحاق الضرر بالتنوع البيولوجي.

اعتماد البرمائيات على بيئة محيطة مائية، يوجِّه تكاثرها إلى موسم السنة الذي تهطل فيه أمطار وتمتلء الانقوعات بالماء. يشكل هذا الاعتماد خطرًا على العشائر التي تعيش في أماكن فيها جفت الأنقوعات في أعقاب قحط أو بناء وتعبيد شوارع. هذا الوضع سائد في منطقة الشارون، لذا تُبذل اليوم جهود خاصة للحفاظ على بيوت تنمية الخاصة، لكي نمنع انقراض أنواع برمائيات.



تطور من الشرغوف إلى البالغ

عملية التطور من الشرغوف إلى البالغ والتغيُّرات التي تحدث خلالها، نسمِّيها دورة حياة.

الشراغيف هي كانت حية مائية بحتة: يوجد لها ذنب على طوله غشاء سباحة وخياشيم (أعضاء لتبادل الغازات التي تميِّز الأسماك) ولا توجد لها أطراف الجسم. خلال دورة الحياة

(الرسمة ه- 5)، تتحول الشراغيف من حيوانات مناسبة للحياة في الماء إلى حيوانات مناسبة للحياة في اليابسة.

في الضفادع والعلاجم، تشتمل مراحل دورة الحياة على ظهور أرجل، تطور الرموش، اضمرار الخياشيم واختفاء الذنب، كما تحدث تغيُّرات في لون ومبنى

الرسمة هـ-5: من الشرغوف إلى البالغ

الجلد. عر أنبوب الهضم في تغيُّرات ملحوظة أيضًا: في الشراغيف النباتية، أنبوب الهضم طويل جدًّا وملتو داخل فراغ (تجويف) البطن، خلال دورة الحياة من الشرغوف إلى البالغ، يقصر أنبوب الهضم بشكل كبير جدًّا.

بعد مرور حوالي 6 أسابيع، تخرج الضفادع البالغة إلى الحياة في اليابسة. تتغذى على الحيوانات وتتنفس بمساعدة الرئتين التي كانت موجودة في الشراغيف ولم تكن فعًالة.



جدير بالمعرفة

تكاثر الثدييات مائية

في البيئة الحياتية المائية، تعيش أيضًا عدة ثدييات، مثل: الحيتان والدلافين (الرسمة هـ - 6) التي معظم أقربائها البيولوجية تعيش في اليابسة. مبنى أجسامها ملائم للحياة في الماء وهو

يذكرنا في مبنى أجسام الأسماك. لكن أعضاء وطرق تكاثرها كأعضاء أقاربها - الثدييات التي تعيش في اليابسة: الإخصاب داخلي، يتطور الجنين في

الرحم ويتغذى النسل في أيامه الأولى من حليب أمه. الرأي المقبول أن الأباء القديمة لهؤلاء الثدييات هي الثدييات التي كانت تعيش في اليابسة. أعضائها وطرق تكاثرها لم تتغيَّر خلال ملايين السنين من النشوء والارتقاء، لكن تطورت لديها ملاءمة للحياة في الماء،

مثل: الزعانف ومساحة سطح خارجي أملس غير مغطى بالفرو.



الرسمة ه -6: ثدييات مائية على اليمين: دولفين، على اليسار: حوت

الفكرة المركزية

النشوء والارتقاء: الحوت والدولفين، مثالان لكائنات حية مائية تطورت من كائنات حية تعيش في اليابسة.





جدوا معلومات عن أماكن وأوضاع انقوعات شتوية في البلاد وعن عشائر البرمائيات. لخصوا المعلومات في لافتة، عارضة في الحاسوب أو في مقال صحفى.



البرمائيات هي مثال لكائنات حية تعيش في اليابسة، لكنها غير ملائمة للتكاثر في اليابسة. اشرحوا هذه العبارة.

ه 3. تكاثر حيوانات في اليابسة

تطور النشوء والارتقاء لأجهزة تكاثر حيوانات ونباتات تعيش في اليابسة، كان متعلقًا بتطور أجهزة تكاثر تلتقي فيها خلايا تناسلية في بيئة محيطة مائية أو رطبة ويتطور الجنين في بيئة محيطة مائية محمية من الجفاف.

المميز البارز لتكاثر الأنواع التي تعيش في اليابسة كل حياتها - زواحف، طيور وثدييات - هو **الإخصاب** المداخلي.

في الإخصاب الداخلي، تُنقل الخلايا المنوية بمساعدة الأعضاء الجنسية إلى داخل جسم الأُنثى، بحيث لا تتعرض الخلايا المنوية إلى الهواء الجاف، وهي تلتقي في بيئة محيطة رطبة ومحمية داخل جسم الأُنثى. المميّز الإضافي لأنواع تعيش في اليابسة والمتعلق بتكاثرها هو تطور مبان خاصة لحماية الجنين من خطر الجفاف. خلال النشوء والارتقاء، تطورت في حيوانات اليابسة وسيلتين أساسيتين تكسب الجنين المتطور حماية.

الوسيلة الأولى، هو الرحم الذي تطور عند الثدييات (كما رأينا في جهاز تكاثر المرأة) وهو يحمي الأجنة التي تتطور داخل جسم الأنثى. الوسيلة الثانية هي البيضة التي يتم وضعها خارج جسم الأم. البيوض التي يتم وضعها في اليابسة تكون على الأغلب ذات قشرة (قاسية أو مرنة) تقلل من فقدان الماء وتكسب الجنين حماية جسدية. تطورت هذه الوسيلة عند معظم الزواحف (مثل: الأفاعي، السحالي والسلاحف) والطيور التي يتطور فيها الجنين خارج جسم الأُنثى. "تجديد النشوء والارتقاء" هو بيض الزواحف والطيور، أما في رحم الثدييات، التطور هو غشاء السلى. غشاء السلى مليء في السائل (سائل السلى) الذي يشكّل البيئة المحيطة المائية التي يتطور فيها الجنين.

يزوِّد الرحم والبيضة الجنين، الذي يتطور في اليابسة، الظروف المطلوبة لتطوره، مثل: بيئة محيطة رطبة، مواد غذائية، أكسجين، إبعاد الفضلات، والحماية من الإصابات والجفاف.

بودنا أن نذكر أنه في الأنواع التي تعيش في الماء، مثل: الأسماك والبرمائيات، يتطور النسل في البيوض، على الرغم من أن مبنى البيوض التي تُضع في الماء بسيط وملائم لعدم وجود خطر الجفاف ولا توجد صعوبة في التخلص من مواد الفضلات التي تُفرز مباشرةً إلى الماء.

مصطلحات

خلية البويضة والبيضة

خلية البويضة هي خلية تناسلية أنثوية (جاميتا أنثوية).

البيضة هي مبنى يتطور في معظم أنواع الحيوانات من خلية البويضة، وتشكِّل في هذه الأنواع مكانًا لتطور الجنين. البيضة مغلَّفة في قشرات وتحتوي على كمية كبيرة من الماء والمواد الغذائية. في معظم الحيوانات، تُضع البيض خارج جسم الأُم، لكن هناك أنواع، يتطور الجنين في البيضة التي تبقى داخل جسم الأُم. في الأسماك والبرمائيات، فقط بعد أن تخرج خلية البويضة من الجسم وتُخصبت نسميها بيضة. بعد الإخصاب، عر الغشاء الخارجي لخلية البويضة تغيُّرات إنزياتية (بناء بروتنات) وبصح قاسيًا.

في الطيور والزواحف الترتيب عكس ذلك: تُضع البيضة بعد أن يتم تخصيب خلية البويضة. باستثناء البيض غير المُخصب الذي يضعه الدجاج في القن ونأكله.

علاقة بموضوع

علم البيئة: سلسلة غذائية. البيضة اختراع "ناجح"، لكن توجد خطورة إلى جانب ذلك. إنَّ رزم الجنين مع المواد المطلوبة لتطوره الأولى داخل غشاء قاسي، يبدو لنا لأول وهلة على أنه فكرة ناجحة جدًا. لكن أخطار كثيرة تستتر للأجنة التي تتطور في البيضة التي تُضع في البيئة المحيطة الخارجية في اليابسة. البيضة وجبة كاملة، موزونة ومركَّزة، تُفضلها حيوانات كثيرة: طيور جارحة، قارض وثدييات من بينها الإنسان. في حالات كثيرة، القشرة ليست قاسية جدًا، وتؤدي إصابتها إلى موت الجنين. تتطور الأجنة الموجودة في بيض الطيور، فقط إذا ركدت عليها الطيور وحافظت عليها في درجة حرارة مناسبة طول فترة الركود (أيام أو أسابيع). إذا أُصيب أحد الوالدين (الأب أو الأم) أو افتُراس، فإنَّ الركود يتوقف والجنين لا يتطور.

بالمقارنة مع معظم الزواحف التي أجنتها تتطور في البيضة التي تُضع خارج جسم الأُم، في عدة مجموعات من الزواحف، مثل: السحالي، الحربايات والأفاعي، يمكن أن نجد أنواعًا تتطور فيها الأجنة داخل جسم الأُم، داخل بيوض قشرتها مرنة، وهي تخرج من جسمها كأفراد حية بواسطة التفريخ بعد أن أكملت تطورها.

جدير بالمعرفة

سحلية "حامل"

في نوع معين من السحالي (Common lizard, Viviparous lizard)، تتطور الأجنة داخل جسم الأُم مغلَّفة بغشاء (دون قشرة قاسية). تستمر فترة الحمل حوالي 3 شهور في أشهر الصيف، وخلالها تكشف جسمها لحرارة الشمس ساعات طويلة بقدر الإمكان. في نهاية فترة الحمل، تُمزق الأجنة الغشاء وتخرج من جسم الأُم سحالي صغيرة ومستقلة. في كل حدث تكاثر، تُفرخ السحلية من 3-12 فردًا.

يفترض باحثو النشوء والارتقاء أن هذه الظاهرة عبارة عن ملاءمة للمناطق التي أقليمها باردة، لأن الأجنة محمية داخل جسم الأُم من تأثير درجة حرارة البيئة المحيطة. على الرغم من أن السحالي تفتقر آلية داخلية لتنظيم درجة حرارة جسمها (متغيِّرة درجة الحرارة)، إلا أنها تستطيع أن تختبئ أو تكشف نفسها، وهكذا تؤثر على درجة حرارة جسمها.

علاقة بموضوع

على التنوع البيولوجي.



الحفاظ على سلاحف البحر - نوع بهدده خطر الإنقراض

في شواطئ إسرائيل، يوجد مواقع تصلها إناث سلاحف البحر في موسم التكاثر، لكي تضع بيوضها. تضع الأنثى بيضها في حفرة تبنيها في الرمل (الرسمة هـ -7). بعد مرور حوالي 50 يومًا تخرج سلاحف وتسرع متوجهةً إلى البحر، وهناك تستمر حياتها. يتم خروجها في الليالي التي يكون فيها القمر كامل والضوء المنعكس عن الماء يوجِّه السلاحف الصغيرة إلى البحر. الأخطار التي تستتر لسلاحف البحر كثيرة:

الوقوع في شباك الصيد.

إلحاق أضرار يقوم بها الإنسان في مواقع وضع البيض (بناء، حركة مستجمون والركوب على تراكتورات صغيرة).

الأضواء المنبعثة من البيوت والسيارات المارة على الشوارع المجاورة للشاطئ تبلبل السلاحف الصغيرة وبدل من أن تتوجه إلى البحر، فإنها تتوجه إلى الإتجاه المعاكس وبالطبع لا تبقى هناك على قد الحياة.

هذه الأخطار أدت إلى انقراض أنواع وانخفاض ملحوظ في تعداد عشائر سلاحف البحر. إحدى العمليات التي أُجريت للحفاظ على سلاحف البحر هي نقل البيوض التي وضعتها السلاحف إلى مكان محمي والحفاظ عليها حتى تخرج منها السلاحف الصغيرة. في الأيام التي تخرج فيها السلاحف الصغيرة، نساعدها على إيجاد طريقها إلى البحر.





الرسمة هـ-7: سلاحف البحر على اليمين: سلحفاة تسبح في الماء، على اليسار: أنثى تضع البيض في حفرة على شاطئ البحر



🦋 سؤال ھ - 5

جدوا في الإنترنيت معلومات حول النشاط الذي يحدث في اللاد للحفاظ على سلاحف البحر. ركِّزوا المعلومات في عارضة حاسوب أو لافتة.

ه1.3 تكاثر الطبور

في هذا البند ،نتعرف على تكاثر دجاج البيت كمثال لتكاثر الطيور.


جهاز تكاثر الديك

جهاز تكاثر الديك مبني من ثلاثة أقسام أساسية (وبذلك يشبه الأعضاء التناسلية عند الإنسان): زوج خصيتان، زوج أنابيب ينقل الخلايا المنوية وعضو جنسى للتزاوج (الرسمة ه-8).

الخصيتان موجودتان في تجويف (فراغ) البطن في طرف الظهر. الخصية مبنية من شبكة أنابيب دقيقة تَنْتُج فيها خلايا منوية. ترتبط جميع أنابيب الخصية بأنبوب بربخ الخصية. داخل النسيج الذي يربط بين أنابيب الخلايا المنوية، توجد خلايا وسطية تُنْتج الهورمون الذكرى - طوسطسطرون. في موسم التكاثر، تكر الخصتان بالمقارنة مع فترات أخرى.

يخرج من بربخ الخصية أنبوبان ناقلان للخلايا المنوية وهما ملتويان جدًا ويستمران حتى الفتحة الخارجية - القناة. تنضج الخلايا المنوية داخل الأنابيب التي تنقل الخلايا المنوية، وتُخزَّن في القسم النهائي للأنبوب.

العضو التناسلي في الطيور، مبنى من طيتي جلد موجودتين في الطرف الأقصى لفتحة القناة. أثناء التزاوج، متلئ الطيتين سائلًا يشبه الليمفا وتنتفخان، وعندئذ يقترب الذكر من الانثى وينقل إلى جسمها السائل المنوى الذي يحوى داخله خلايا منوية.





الرسمة ه - 8: جهاز تكاثر الديك - الذكر

جهاز تكاثر الدجاجة

جهاز تكاثر الدجاجة مبنى من قسمين أساسيين: المبيض وأنبوب البيض (الرسمة ه - 9). في معظم أنواع الطيور ومن بينها الدجاجات، عكس معظم أنواع الثدييات، فقط المبيض وأنبوب البيض في الطرف الأيسر يكونان متطوران، أما المبيض وأنبوب البيض في الطرف الأمن فإنهما ينضمران في المرحلة الجنينية. يخمن باحثو النشوء والارتقاء أن الجهاز غير الزوجي، يقلل وزن الدجاجات ويكسبها أفضلية في الطبران.

يقع المبيض في تجويف (فراغ) بطن الدجاجة وهو يبدو كعنقود مكوَّن من أجسام كروية صفراء بأحجام مختلفة. كل "كرة" عبارة عن خلية تناسلية أنثوية -خلية بويضة تشتمل على نواة الخلية التي تحوى في داخلها المادة الوراثية، قليل من السيتوبلازم ومجمَّع غذاء يملئ معظم حجم الخلية - صفار البيضة. تظهر السيتوبلازم والنواة كبقعة صغيرة صافية على سطح الصفار. كل خلية بويضة في المبيض محاطة بطبقة دقيقة وغنية بالأوعية الدموية التي تُغذى خلية






إنتاج البيضة

في أعقاب التزاوج، يتم الإخصاب في القمع الموجود في بداية أنبوب البيضة. تتحرك خلية البويضة المخصبة على طول أنبوب البيض، وخلال حركتها تُضاف إليها مكونات مختلفة تُنْتِج البيضة الكاملة. أنبوب البيض ملتوٍ، يصل طوله عند الدجاجات البيوضة حوالي 53-73 سم. على طول أنبوب البيض، توجد غُدد تفرز إلى داخله بروتين (ألبومين - المادة البيضاء في البيض الذي نأكله في البيض) ينتظم كطبقة حول خلية البويضة. تساهم هذه الطبقة (كصفار البيضة) في تطور الجنين وتغذيته. بعد ذلك يَنْتُج غشاءان دقيقان

يغلِّفان البروتين.

عندما تصل خلية البويضة المخصبة المحاطة بالبروتين وبالأغشية منطقة "الرحم" (الذي يختلف في مبناه وأدائه عن رحم الثدييات) في أنبوب البيضة، تُفرز من الخلايا في هذه المنطقة أملاح كالسيوم ترسب على البويضة وتُنْتِج الغلاف الخارجي القاسي. يُستخد "الرحم" لبناء الغلاف الخارجي ولتخزين البيض قبل وضعها خارج الجسم. تستمر هذه العملية المعقدة حوالي يوم وفي نهايته تكون البيضة جاهزة، لكي توضع خارج الجسم (الرسمة ه - 10). انتبهوا! في أقنان الدجاجات التي تبيض بيضًا، لا يوجد ذكور، والدجاحات تبيض بيضًا على الرغم من عدم حدوث تخصيب.



الرسمة ه -10: بنى بيضة الدجاجة

الفكرة المركزية

ملاءمة المبنء والأداء: مبنى بيض الطيور ملائم لتطور لالجنين في البيابسة.

يحتل صفار البيض والبروتين، اللذان يعتبران مصدر المواد الغذائية التي يتطور منها الجنين، معظم حجم البيضة. نلاحظ داخل طبقة البروتين مبانٍ مسلسلة نسميها جدائل البروتين (الذي نراه أحيانًا داخل بروتين بيضة غير مطبوخة). تثبت جدائل البروتين خلية البويضة المخصبة والجنين الذي يتطور منها، في مكانها في مركز البيضة. في الطرف الواسع للبيضة، في الفراغ بين الغشائين، نلاحظ "كيس هواء". يمكن أن نرى كيس الهواء في طرف البيضة المسلوقة ("البيضة القاسية").

قشرة بيضة الدجاجة مصنوعة من الكالسيوم، قاسية وتزوِّد الجنين حماية من الإصابات الميكانيكية، من الأشعة المباشرة والجفاف. بالإضافة إلى ذلك، تُتيح القشرة للجنين أن يتبادل الغازات مع البيئة المحيطة الخارجية بفضل الثقوب الصغيرة جدًا الموجودة فيها.


🕞 جدير بالمعرفة

بيضة النعامة أكبر بيضة من بين بيوض الطيور، حيث يصل وزنها حوالي 1.2 كغم. بيضة عصفور الشمس أصغر بيضة من بين بيوض الطيور، حيث يصل وزنها حوالي نصف غرام فقط.





النعامة الأنثى وبيضتها



الرسمة هـ -11: مقطع تخطيطي في بيضة دجاجة فيها جنين

تطور الجنين في البيضة

بعد أن تبيض الدجاجة البيضة المخصبة، يتطور الجنين فيها. في الرسمة ه - 11، نرى حول الجنين الذي يتطور إنتاج أربعة أغشية خارج الجنين نسمِّيها **أكياس الجنين،** وهي تقوم بوظائف مهمة في تطور الجنين في

- 1. غشاء السلى (amnion)، يغلّف الجنين ويحتوى على سائل السّلى الذي يشكِّل البيئة المحيطة المائية التي يتطور فيها الجنين.
- 2. كيس صفار البيضة الذي يغلِّف الصفار، تَنْتُج فيه شبكة أوعية دموية عبرها مر الغذاء إلى الجنين. معظم صفار البيض مكون من بروتينات، دهنيات وسكريات، حيث تُستخدم غذاء للجنين الذي يتطور في البيضة.
- 3. غشاء بول جنيني (allantois) يُستخدم وعاء للفضلات. تساعد الأوعية الدموية الموجودة في غشاء البول على تبادل الغازات بين الجنين والبيئة المحيطة الخارجية (كما هو الأمر في عمل الرئتين).
 - 4. غشاء كوريون، بغلِّف الحنين والأغشية الداخلية.



الرسمة ه - 12: صوص يخرج من البيضة

خلال تطور الجنين، تمنع قشرة البيضة من حدوث تغيُّر في حجمها على الرغم من التغيُّرات التي تحدث داخلها. تُحدد هذه الحقيقة كبر الجنين الذي يستطيع أن يتطور داخلها. في نهاية تطور الأنسجة والأعضاء (في الدجاج حوالي 21 يومًا)، تخرج الصيصان من البيض (الرسمة ه - 12). في عملية خروج الصوص من البيضة، يمزق الصوص الغشاء الذي يغلِّفه مساعدة منقاره ويتنفس لأول مرة مساعدة رئتيه من الهواء الموجود داخل كيس الهواء.





أ. جدوا معلومات عن النسبة المئوية للماء، وعن المكونات الغذائية في بيضة الدجاجة، ثم اعرضوا النتائج بطريقة بيانية. علِّلوا اختيار طريقة العرض.

ب. لماذا نوصى الشخص المصاب بحروق أن يزيد من استهلاك كميات البروتينات التي يستهلكها خلال فترة شفاؤه؟

ت. اكسروا بحذر بيضة طازجة داخل ماء وميِّزوا أقسامها.



👣 سؤال ھ-7

أ. قارنوا بين نظام الأغشية الذي يغلِّف جنين الإنسان ونظام الأغشية الذي يغلِّف جنين

- ب. القشرة القاسية لبيضة الدجاجة تمنع ازدياد الحجم الكلي. أي أقسام من البيضة يكبر حجمها وأى أقسام يصغر حجمها خلال تطور جنين الدجاجة؟ علِّلوا.
- ت. ما هو المصدر الوراثي لأقسام البيضة: الجنين، صفار البيضة، البروتين والأغشية التي تقع خارج الجنين؟ اشرحوا.
- ث. خلال تطور جنين الطيور، يتراكم حامض بول غير قابل للذوبان في غشاء البول. ما هي أفضلية ذلك للجنن؟
- ج. وزن الثدى أثناء ولادته أكبر بكثير من وزن الخلية الواحدة الزيجوت الذي تكوَّن منه. بالمقارنة معه، وزن الصوص الذي يخرج من البيضة أقل بقليل من وزن البيضة (دون القشرة). ما الشرح لهذا الفرق؟



省 سؤال ھ-8

ما هو الفرق الأساسي بين بيضة السمكة وبيضة الطير؟

مساهمة الوالدين في تطور الجنين



الرسمة ه -13: حمام رقطي أثناء الركود

لا تنتهى مساهمة الوالدين في تطور الجنين مع وضع البيض. التطور السليم للجنين في البيضة متعلق بوجود ظروف بيئية محيطة مناسبة أيضًا.

عند أنواع حيوانات كثيرة تضع البيض، يزوِّد الوالدان ظروف بيئة محيطة مناسبة. عادةً، تضع الأم البيض في بيئة محيطة رطبة أو مظللة وفي موسم السنة الذي يكون فيه خطر الجفاف صغير بالمقارنة مع فترات أخرى. بالإضافة إلى الركود (الرسمة هـ - 13)، توفر الأم حراسة فعَّالة على الأجنة، وتساهم في تنظيم درحة الحرارة والرطوية.

تركد طيور وزواحف كثيرة على بيضها حتى يفقص البيض ويخرج النسل. خلال الركود، في كثير من الأحيان، يغيِّر الوالدين مكان وضع البيضة، لكي لا تلتصق أغشية الجنين بقشرة البيضة. على الأغلب، الأم تركد على البيض والأب يُحضر لها الغذاء، لكن هناك بعض أنواع الطيور التي يركد فيها الوالدين على البيض بالتناوب حتى خروج النسل.

الاعتماد واستقلال نسل الطيور

غيِّز في نسل الطيور بين الفراخ والصيصان:

الفراخ تبقى في العش. تفقص من بيوض صغيرة بعد مرور فترة ركود قصيرة. عارية من الريش (تقريبًا أو كليًّا)، عمياء، ضعيفة، لا تستطيع الوقوف على أرجليها ولا تستطيع الحركة، لذا فهبي بحاجة إلى عناية والدين مخلصين. في الأيام الأولى، تستطيع الفراخ أن ترفع رأسها وتفتح منقارها فقط، لكي تحصل على الغذاء من والديها (الرسمة ه - 14). الخطر الذي يهده الفراخ كبير جدًا، لأنها لا تستطيع أن تطير، وعندما يذهب الوالدين لجمع الغذاء، فإنها مهددة بالافتراس.







الرسمة ه -14: على اليمين: فراخ جائعة (عصافير إسترالية)، على اليسار: صوص حجل

جميع نسل الطيور المغردة (مثل: الفصية الرشيقة والبلبل) فراخ، وكذلك الأمر جميع نسل الطيور الجارحة، مثل: النسر والبومة. الصيصان تترك عشها. تفقص من بيض كبير، يقظة ومغطاة بريش دقيق، عيناها مفتوحة، أرجلها متطورة، وبعد مرور وقت قصير من خروجها من البيض، تستطيع أن تأكل بقواها الذاتية. هذا يعني أن الصيصان تحتاج إلى عناية قليلة نسبيًا من

الوالدين. نجد الصيصان بالأساس عند الطيور التي تركد على الأرض وتركض أو تسبح جيدًا، مثل: أنواع الدجاج، الإوز والبط.



ا سؤال هـ 9

تبيض النسور من 2-3 بيوض في المرة الواحدة، أما الإوز فإنه يبيض حوالي 10 بيضات في المرة الواحدة. ماذا يمكن أن تكون العلاقة بين عدد البيضات التي تبيضها الطيور وبين مدى استقلالية النسل؟ اشرحوا.



البحث البحث البحث

تبيض طيور من نوع السمامة البنية من 1-3 بيوض في المرة الواحدة. أُجريت دراسة استقصائية لفحص عشائر السمامة البنية، عدَّ الباحثون عدد البيض في كل عش، وبعد ذلك عدوا الفراخ التي نجحت أن تكبر وتترك العش. استمرت الدراسة ست سنوات وفيما يلى نتائجها في جدول ه - 3.

جدول ه -3: معدل "النجاح" للعش في عشيرة السمامة

النسبة المئوية لعدد الفراخ التي نجحت في النمو وتركت العش	معدل عدد الفراخ التي نجحت في النمو وتركت العش	عدد الأعشاش في العشيرة	عدد البيض في العش
80%	0.8	36	1
85%	1.7	102	2
57%	1.7	32	3

أ. اذكروا استنتاجين يمكن استنتاجهما من نتائج الجدول.

ب. عدد الفراخ التي بقيت على قيد الحياة في الأعشاش التي وُضعت فيها بيضتان يشبه عدد الفراخ التي بقيت على قيد الحياة في الأعشاش التي وُضعت فيها 3 بيوض. هل من الأفضل أن تضع السمامة 3 بيوض؟ عللوا.

في تحليل إضافي للنتائج، وزع الباحثون النتائج بحسب توافر الغذاء للفراخ في سنوات مختلفة. يظهر تحليل النتائج في جدول ه - 4.

(التكملة في الصفحة القادمة)

جدول ه -4: معدل "النجاح" للعش بحسب توافر الغذاء للفراخ					
توافر الغذاء للفراخ عالٍ توافر الغذاء للفراخ منخفض					
النسبة المئوية لعدد الفراخ التي نجحت في النمو وتركت العش	معدل عدد الفراخ التي نجحت في النمو وتركت العش	النسبة المئوية لعدد الفراخ التي نجحت في النمو وتركت العش	معدل عدد الفراخ التي نجحت في النمو وتركت العش	عدد البيض في العش	
80%	0.8	80%	0.8	1	
50%	1.0	95%	1.9	2	
30%	0.9	77%	2.3	3	

- ت. أمامكم استنتاجات، أي منها يمكن استنتاجها من مكتشفات الجدول هـ 4؟ عللوا اختياركم.
 - 1. لم يؤثر توافر غذاء الفراخ على "نجاح" نمو الفراخ.
- 2. في السنوات التي يكون فيها توافر غذاء عالٍ، توجد أفضلية لوضع 3 بيوض بالمقارنة مع بيضتين فقط.
 - 3. يؤثر توافر الغذاء أقل على النجاح عندما ننمى فرخًا واحدًا في العش.
 - 4. عندما لا يكون نقص في توافر الغذاء، تبقى جميع الفراخ على قيد الحياة.

ه 2.3 تكاثر الثدييات

تعرفتم في الفصل الثالث على جهاز التكاثر وعملية تكاثر الإنسان. في ثدييات أخرى، جهاز التكاثر وعمليات التكاثر تشبه جهاز التكاثر وعمليات التكاثر عند الإنسان وتتميز بوجود دورة جنسية. في هذا البند، نتوسع في التباين الذي يتم في تكاثر أنواع معينة من الثدييات وفي دوراتها الجنسية.

دورة الشبق ودورة الحيض

عند أنواع قرود معينة، تتم دورة الحيض كما تعلَّمنا عند الإنسان. استعداد الأنثى للتزاوج غير محدد لموسم معين في السنة، لكن هناك دورية كبيرة في أداء جهاز التكاثر. يوجد صعود ونزول دوري في تركيز الهورمونات في الدم التي في أعقابها تحدث الإباضة. تحدث الإباضة في مرحلة ثابتة من الدورة. تعرفنا على تفاصيل دورة الحيض في الفصل الثالث.

عند معظم أنواع الثدييات، الأنثى مستعدة (تستطيع) للتزاوج في فترة معينة فقط (أو في فترات معينة) خلال موسم التكاثر (جدول ه -5). الفترة الزمنية التي تكون فيها الأنثى مستعدة للتزاوج نسميها فترة الشبق. في فترة الشبق، يرتفع تركيز هورمونات تكاثر معينة، وتحدث خلالها سلوكيات مميَّزة، مثلًا: ترفس وتصهل إناث الحصون، تُطلق البقرات خوارًا وتقفز على بعضها وتبكي القطط. الزمن الذي يمر من بداية فترة شبق واحدة حتى بداية فترة شبق ثانية نسميه دورة الشبق، حيث تختلف مدتها في الأنواع المختلفة.

للمزيد عن

موسمية التكاثر، انظروا الفصل السابع صفحة 146، والفصل الثامن صفحة 176.

مدة فترة الشبق - الاستعداد للتزاوج	مدة دورة الشبق	تكرار (تردد) دورات الشبق	النوع
12-10 ساعة	3 أسابيع	كل السنة	البقرة
3-2 أيام	3 أسابيع	كل السنة	الخنزير
24-12 ساعة	3 أسابيع	الموسم - عدة دورات شبق في الموسم	الماعز
7-4 أيام	3 أسابيع	الموسم - عدة دورات شبق في الموسم	القط

الموسم - عدة دورات شبق في الموسم

الموسم - عدة دورات شبق في الموسم

الموسم - دورات شبق واحدة في الموسم

الخروف

الحصان

الكلب

18-16 بومًا

3 أسابيع

36 ساعة

6-5 أيام


10-7 أيام

جدول ه - 5: دورات الشبق عند إناث الثدييات

في الأنواع التي توجد لها دورة شبق، تتم الإباضة في أعقاب ارتفاع تركيز الإستروجين في الدم. يوجد أنواع، يتم عندها الشبق في مرحلة ثابتة في دورة الشبق، على سبيل المثال، عند إناث الفئران والأبقار. يوجد أنواع، يتم عندها الشبق في أعقاب التزاوج، هذا يعني أن التزاوج يُثير التغيُّرات الهورمونالية الضرورية للإباضة. الإباضة التي تتم في أعقاب التزاوج نسمِّيها إباضة مشروطة (الرسمة ه - 15)، وهي تتم، على سبيل المثال، عند إناث القطط والأرانب.

بالمستوى المبدائي، دورة الشبق عند الأبقار تشبه دورة الحيض عند الإنسان. في الدورتين، تتم الإباضة في موعد ثابت خلال الدورة - بعد نضوج الجُريبات في المبيض، وبعد الإباضة يتطور جُسيم أصفر في المبيض. انتبهوا، عند الإنسان، تتم الإباضة في منتصف الدورة (دورة الحيض) وعند البقرة تتم الإباضة في بداية الدورة (دورة الشبق). ينبع هذا الفرق من التعريف العشوائي لبداية الدورة بحسب العلامات التي نراها بالعين: عند الإنسان نزيف دم، وعند البقرة سلوكيات معينة. بودنا أن نشير أن البقرة لا توجد لديها ظاهرة النزيف. إذا لم يتم حمل، تُمتص الأنسجة المخاطية في الجسم.

للمزيد عن دورة الحيض، انظروا الفصل الثالث، صفحات 46-44.



الرسمة ه -15: الإباضة عند أنواع مع دورة حيض أو مع دورة شبق



👣 سؤال ھ - 10

أ. ماذا تتشابه وماذا تختلف دورة الشبق ودورة الحيض؟ ب. ما هي الأفضلية التي مكن أن تكون للإباضة المشروطة؟



🚹 سؤال ھ-11

أنجبت كلبة 6 جراء، منها توأم متماثل، كانت 8 جُسَيْمات صفراء في المبيضين معًا. كم خلية بويضة لم تصل تطور كامل؟ عللوا إجاباتكم.

تطور الجنين داخل جسم الأُم

هناك فرق مهم بين الثدييات وفقريات أخرى تعيش على اليابسة، وهو المكان الذي يتطور فيه الجنين: في أنواع طيور مختلفة وفي معظم أنواع الزواحف، تتطور الأجنة في البيوض التي تُضع على اليابسة خارج جشم الأم. أما في معظم أنواع الثدييات، بما في ذلك الإنسان، يتطور الجنين داخل عضو خاص - الرحم -داخل جسم الأم.

يعرض الجدول ه -6 مدة الحمل في الثدييات المختلفة. يمكن أن نرى في الجدول أن هناك علاقة عامة بن كبر الحبوان ومدة الحمل.

جدول ه-6: مدة الحمل في الثدييات المختلفة

مدة الحمل (بالأيام)	الثدي
150	الخروف
270	البقرة
280	الإنسان
360	الحوت
400	الزرافة

مدة الحمل (بالأيام)	الثدي
16	الهامستر
21	الفأر
42	الأرنب
61	الكلب
63	القط

مصطلحات

خروج الجنين من جسم الأم

هناك ثلاثة مصطلحات تصف العملية التي يخرج فيها النسل المتطور من جسم الأم إلى خارج

التفريخ: خروج نسل تطور في بيض داخل جسم الأم إلى العالم. يمكن أن يكون النسل مسِتقلا، مثل: 📍 سمك القرش، السحالي والأفاعي، أو أنه بحاجة إلى رعاية الوالدين لفترة زمنية معينة، مثلا: العقارب التي تحمل نسلها على ظهرها في بداية حياتها.

الإنجاب: خروج نسل ثدييات (باستثناء الإنسان) تطور في رحم الأم إلى العالَم. النسل - جراء، 🚅 عجول، جدي وغير ذلك - تحتاج عادة إلى استمرار عناية ومراقبة الوالدين لمدة زمنية معينة على الأقل، مثل: جراء القطط والكلاب.

الولادة: مصطلح خاص لعملية خروج الجنين من الرحم عند الإنسان. وهو يحتاج إلى عناية ومراقبة الوالدين لمدة زمنية طويلة.



🔐 سؤال هـ - 12

عودوا إلى الفصل الثالث ولخصوا الحسنات للجنين الذي يتطور داخل الرحم.

تغذية نسل الثدييات

ينبع اسم الثدييات من إحدى المميزات الخاصة لهذه الحيوانات: تغذية النسل بحليب الأم - الرضاعة (الرسمة هـ -16). جميع جراء الثدييات في الطبيعة متعلقة في بداية حياتها بالأم وهي تتغذى في فترة حياتها الأولى من الحليب الذي يَنْتُج من غدد حليب الأم.

غدد الحليب موجودة في الجنسين، لكن في الإناث فقط يَنْتُج حليب في نهاية الحمل. تبدأ غدد حليب الأنثى بالتطور مع النضوج الجنسي، لكن في فترة الحمل، تتطور بشكل سريع بفضل تأثير الهورمونان بروجسترون واستروجن. يشترك الهورمون برولكتين (lact=حليب; pro=الحصول على) وهورمونات أخرى في تطور الغدد وإنتاج الحليب.

> تختلف أنواع الثدييات بعدد غدد الحليب ومكانها: عند الإنسان وأنواع قردة، يوجد غدتين حليب وهما موجودتان في الثدى في الصدر. عند الأبقار، الخراف، الحصون، نجد غدد الحليب في الضرع على البطن بجانب الرجلين الخلفيتين. عند أنواع الثدييات التي لديها جراء كثيرة في كل حمل (مثل: الكلاب والقطط)، يوجد غدد كثيرة، وفُتحات الغددة مرتَّبة بسطرين على طول طرف بطن الحبوان.



الرسمة ه - 16: عجل يرضع من أمه

اعتماد واستقلال أفراد الثديبات

كما ذكرنا، جميع جراء الثدييات في الطبيعة متعلقة في بداية حياتها بالأُم التي تغذيها، وهي تتغذى في هذه الفترة من الحليب الذي يَنْتُج في غدد حليب الأم. مع ذلك، يوجد فروق مِدى استقلالية الأفراد مثل ما رأينا عند الطيور. نستعمل هنا المصطلحين يترك العش ويبقى في العش الذين تعرفنا عليهما في سباق الطبور.

أفراد الأرانب، الغزلان والأبقار تترك العش. وهي تولد بعد حمل طويل نسبيًا، مغطاة بالشعر، لها مخالب (أظافر قرنية) وعيون مفتوحة. تفرز فضلاتها بذاتها، تستطيع أن تقف على رجليها وتمشى خلال عدة دقائق أو ساعات معدودة بعد أن تلد. وظيفة الأم أن ترضعها

وأن تحميها.

جراء القطط والكلاب تبقى في العش. تلد بعد حمل قصير، عاجزة عن القيام بأي شيء، عارية من الشعر وعيونها مغلقة. متعلقة بشكل مطلق بأُمها للتغذيةُ، للحفاظ على درجة حرارة جسمها وتحتاج مساعدة الأُم،



لكي تفرز بولها وبرازها. الأُم تحميها أيضًا من الحيوانات المفترسة ومن أفراد أخرى في العشيرة (مثلًا الذكور) قد تؤذبها.

حراء القردة متعلقة بأمها لتزودها بالغذاء والحماية، لكنها تستطيع أن تمتطى أمها وتتحرك معها من مكان إلى آخر (الرسمة ه - 17).



الرسمة هـ -17: قردة وجروها



🐒 سؤال ھ - 13

اذكروا حسنة واحدة وسيئة واحدة لنوع أفراده تبقى في العش بالمقارنة مع نوع أفراده تترك العش. اشرحوا.



省 سؤال هـ -14

ماذا يتشابه وماذا يختلف تكاثر سمكة، طير وثدى. تطرقوا في إجاباتكم إلى جهاز التكاثر وعملية التكاثر.

ثدسات الجيب

ثدييات الجيب هي مجموعة ثدييات قدمة جدًا من ناحية النشوء والارتقاء، المميز الخاص للحيوانات التي تنتمي إلى هذه المجموعة هو طريقة تكاثرها والاعتماد المتطرف للأفراد الحديثة السن بأمها. هذه المجموعة شائعة بالأساس في استراليا (أنواع قليلة موجودة في جنوب أمركا). عكس الثدييات التي . تعرفنا عليها والتي تملك مشيمة متطورة تدمج بين أنسجة الجنين وأنسجة الأُم، ثدييات الجيب توجد لها مشيمة بسيطة، يتغذى الجنين فترة قصيرة بالأساس من صفار البيض الموجود في كيس صفار البيض، وتغذيته أقل ناجعة بالمقارنة مع الثدييات التي لديها مشيمة متطورة.

تخرج أفراد ثدييات الجيب إلى هواء العالم في مرحلة مبكرة جدًا من تطورها. مثلًا: يلد أحد أنواع الكنغر بعد 36 يوم حمل عندما يكون وزنه حوالي 0.8 غرام فقط! للمقارنة - وزن البالغ حوالي 30 كغم.

مباشرةً بَعد الولادة، يقوم الوليد الصغير برحلة عجيبة إلى منطقة الحلمات الموجودة داخل "الجيب" (طي جلد كبير)، على بطن أمه وهناك يستمر في تطوره. على الرغم من أنه أعمى، إلا أنه ينجح في إكمال رحلته وإيجاد الحلمة التي يدخلها في فمه. يتسع طرف الحلمة وهلاً كل حجم الفم. يبقى الجرو الصغير مربوطًا بالحلمة لمدة شهر - شهرين، حتى تتطور فكيه بشكل كافٍ، لكي يفتح فمه ويتحرر من الحلمة. من هذه المرحلة، يبقى الجرو الصغير داخل "الجيب" على بطن أمه يرضع الحليب، يكبر ويتطور. بعد مرور حوالي 300 يوم، يزن حوالي 5 كغم ولم يبقى في الكيس. بعد خروجه من الجيب، يبقى الجرو بجانب أمه، يرضع من حليبها حتى يصل سن سنة ونصف. صورة أم الكنغر المعروفة مع صغيرها الذي يطل عبر جيبها، (الرسمة ه - 18)، لا تمثِّل جميع أنواع ثدييات الجيب. يوجد أنواع مثل الأبسوس الأميركي الذي تلد الأنثى من 8-10 جراء في الولادة الواحدة. و"الجيب" هو طي من الجلد



الرسمة ه- 18: أم الكنغر مع جروها الذي يطل عبر الجيب.



المرفوع حول الحلمات فقط وهو لا يغطي جميع الجراء. في هذه الأنواع، عندما تتحرر الجراء من الحلمات، تستمر الأُم في ارضاعها، لكنها تضعها في عش ولا تحملهم معها كل الوقت.



جدير بالمعرفة

ثدي يضع بيضًا

الثدييات عديمة المشيمة نادرة، تعيش عدة أنواع من هذه الثدييات في قارة استراليا فقط. الإوز الأُسترالي ثدي يعيش في الماء والتخصيب عنده داخلي. في أعقاب الإخصاب، تضع أنثى الإوزة بيضها داخل جُحر وتركض عليه حتى يفقس. بعد أن تخرج الصغار، يتغذون من الحليب الذي تفرزه الأُم على سطح جلدها (الإوز الأُسترالي لا يوجد لديه حلمات).

ه 4. جوانب نشوء وارتقاء التكاثر الجنسي عند الحيوانات

تطورت الثدييات في الماء، والقديمة من بينها الأسماك، تعيش كل دورة حياتها في الماء. تطورت البرمائيات من الأسماك ويدل اسم البرمائيات على مميزاتها: تعيش على اليابسة بالغة، لكن لتكاثرها ولبداية تطورها تحتاج إلى بيت تنمية مائى. يرى الكثير في البرمائيات أنها حلقة انتقالية في تطور نشوء وارتقاء الفقريات.

الفقريات الأولى التي تطورت لديها القدرة خلال النشوء والارتقاء على التكاثر في اليابسة، كانت زواحف قديمة، وقد وضعت هذه الزواحف بيضًا على اليابسة. بفضل هذه القدرة وتطور ملاءمات إضافية لليابسة، تحولت هذه الزواحف إلى الفقريات الأولى الحقيقية التي تعيش على اليابسة. يخمِّن الباحثون أن أصل نشوء وارتقاء فقريات اليابسة - زواحف، طيور وثدييات - من هذه الزواحف القديمة. خلال النشوء والارتقاء، تطورت أعضاء وآليات تُتيح التكاثر على اليابسة. تقدَّم هذا التطور بعدة اتجاهات معروضة في جدول هـ - 7.

جدول ه-7: من بيئة محيطة مائية إلى اليابسة: تطور النشوء والارتقاء لطرق تكاثر الفقريات

بسة	بيئة محيطة يا	بيئة محيطة مائية	
انثی	داخل جسم الأُ	وللاء في	المكان الذي يتم فيه الإخصاب
في جسم الأنثى، في الرحم	في اليابسة، في بيضة قشرتها قاسية	في الماء، داخل بيضة	المكان الذي يتم فيه
		قشرتها مرنة	الجنين
دم الأُم بواسطة المشيمة	المواد الموجودة في البيضة	المواد الموجودة في	مصدر المواد التي يتغذى
		البيضة	منها الجنين
يُفرز البول بواسطة	تتراكم في كيس بول الجنين	تُفرز إلى الماء	طريقة إفراز الفضلات في
الكليتين إلى سائل السلى			الجنين
من حليب الأُم	من الغذاء الذي يُحضرِه الوالدين أو من الغذاء الذي يجده بشكل ذاتي	من الغذاء في الماء	طريقة تغذية الفرد



👣 سؤال ھ - 15

نجد عند الحيوانات طرق تكاثر جنسية تختلف عن بعضها، من بينها البيئة المحيطة التي يتم فيها التكاثر وعدد الأفراد. مامكم جدول يعرض معلومات عن ثلاثة حيوانات (أ-ت): طبر، سمكة، ثدى.

	الحيوان		
	j	ب	ت
بت تنمية الحيوان	ماء	ماء	يابسة
كان تطور الجنين	بيضة	الأُم	بيضة
بيئة التي يحدث فيها التكاثر	ماء	ماء	يابسة
دد الأفراد	آلاف	عادةً واحد	عدة

أ. أي حيوان من بين الحيوانات أ، ب أو ت هو ثدي، أي منها هو طير وأي منها سمكة؟ عللوا تحديدكم لكل حيوان؟

ب. في أي بيئة حياة - مائية أو يابسة - مدى عشوائية إلتقاء خلايا تكاثر الحيوانات يكون


تكاثر جنسي

عند الحيوانات التي نراها عادةً في بيئتنا المحيطة، يوجد بالأساس تكاثر تزوجي. هكذا الأمر عند معظم الفقريات التي تتكاثر بطريقة تزاوجية فقط. لكن يجب أن نعرف أنه عند معظم الحيوانات، يوجد أنواع تتكاثر بطريقة لا جنسية إلى جانب التكاثر الجنسي. في هذا البند، نعرض عدة أمثلة لطرق تكاثر لا جنسية عند الحيوانات.

ه5. تكاثر غير تزاوجي بواسطة الإنقسام أو التبرعم

في الكائنات الحية أحادية الخلية حقيقية النواة، مثلًا: الأميبا، انقسام الخلية معناه تكاثر. خلية واحدة . هي كائن جي مستقل، من خليةٍ واحدة تَنْتُج خليتان، كل واحدة منهما كائن حي مستقل. لذا انقسام الخُّلية يشكلُ في الكائن الحي الأحادي الخلية آلية تكاثر غير تزاوجي. قبل حدوثُ الإنقسام، تتضاعفُ المادة الوراثية في النواة، تنقسم نواة الخلية بعملية الميتوزا، وفيما بعد ينقسم السيتوبلازم والعضيات. نتيجة للإنقسام، نحصل على خليتين متماثلتين بالمادة الوراثية، وتعيش هاتين الخليتين ككائنيْ حي أحاديي الخلية مستقلتين (الرسمة ه - 19 أعلاه). في هذا الإنقسام، لا تبقى خلية الأم على قيد الحياة.

التبرعم طريقة تكاثر غير جنسية إضافية، تتطور بواسطتها أفراد جديدة على الأم. في أحاديات الخلية، على سبيل المثال في الخميرة (الرسمة هـ 19- أدناه)، يبدأ التبرعم بمضاعفة المادة الوراثية في النواة وبإنقسام النواة بطريقة الميتوزا. فيما بعد يَنْتُج برعم طرفي من طرف واحد، ينتقل إليه إحدى الأنوية مع كمية قليلة من السيتوبلازم، ويَنْتُج غشاء بين الخليتين. ينفصل الفرد الجديد عن الأم ويبدأ بالنمو. يوجد متعددات خلايا تتكاثر بطريقة التبرعم. في هذه الأنواع، ينمو طرف مكوِّن من خلايا تتحول




الرسمة هـ-19: تكاثر غير جنسي في أُحادية خلية حقيقية النواة الصور العلوية: انقسام خلية الأميبا (تكبير: 200-600 ميكرومتر)، الصور السفلية: تبرعم الخميرة (كبر: حوالي 4 ميكرومتر)

يوجد متعددات خلايا تتكاثر عادةً بطريقة التبرعم. في هذه الأنواع، ينمو من الأُم طرف مكوَّن من خلايا تتحول إلى كائن حي مستقل. في أنواع معينة، مثلًا: المرجان، تبقى الأفراد مرتبطة ببعضها. وفي أنواع معينة، مثلًا الهيدرا: ينفصل الفرد

الجديد في مرحلة معينة عن الأم

الرسمة ه - 20).

إذا انفصل الفرد الجديد أو لم ينفصل، فإنه يبدأ في النمو. من الجدير بالمعرفة أن الفطريات (من بينها الخميرة)، المرجان والهيدرا، تتكاثر بطريقة تكاثر حنسنة أنضًا.



الرسمة هـ -20: تكاثر غير جنسي في كائن حي متعدد الخلايا - تبرعم في الهيدرا

تتشابه طريقتي التكاثر انقسام الخلية والتبرعم (غير الجنسية التي وصفناها) بإنقسام نواة الخلية الذي يتم بطريقة الميتوزا، لكنهما تختلفان بالطريقة التي تنقسم بها سائر مكونات الخلية. على الرغم من ذلك، يتم الإنقسام دامًًا بطريقة تكون في كل خلية نسخة كاملة من المادة الوراثية وجميع المكونات الضرورية لبقاؤها كوحدة مستقلة.

ه6. تكاثر عذري

التكاثر العذري (parthenogenesis) هو طريقة تكاثر غير تزاوجي، يتم عند عدة أنواع من الفقريات (أنواع سحالي وأفاعي)، لكنه شائع عند اللافقريات ويحدث في الأساس عند مفصليات الأرجل والحشرات. الفرق بين التكاثر العذري وطرق أخرى للتكاثر غير التزاوجي: في التكاثر العذري، تتطور الأفراد من خلية تناسلية واحدة، ولا يوجد اتحاد بين الخلايا التناسلية. يتطور الفرد من خلية بويضة غير مخصبة، لذا يتم التكاثر العذري في الإناث فقط.

للمزيد عن

'تكاثر عذري في النباتات، انظروا الفصل السادس، صفحة 130. عند نحل العسل، يَنْتُج الذكور فقط في تكاثر عذري دون تخصيب، أما الإناث فإنها تَنْتُج في أعقاب التخصيب فقط. لذا الذكور هيبلوئيدية (في خلاياهم توجد هيئة كروموسومات واحدة - n) والإناث ديبلوئيدية (في خلاياها توجد هيئة كروموسومات مزدوجة - 2n). وظيفة الذكور والإناث في مجتمع النحل مختلفة: يخصب الذكور الملكة، أما الإناث فإنها تعمل عاملات لجمع الغذاء وتعتني بالنسل. يتم التكاثر العذري عند الدافني أيضًا (سرطان صغير) (انظروا نافذة البحث هـ -2). عند الدافني، أفراد التكاثر العذري هم إناث.

في التكاثر العذري، مكن أن تَنتُج أفراد ديبلوئيدية مسارين أساسين:


الميوزا ومضاعفة الكروموسومات في خلية الابنة الهيبلوئيدية، وهكذا نحصل على خلية ديبلوئيدية يتطور منها الفرد. بهذه الطريقة، يمكن أن نحصل على تباين معين عند الأفراد بحسب الخلية الهيبلوئيدية، ناتج الميوزا الذي بدأت منه العملية.

دون ميوزا: لا تمر الخلية التناسلية بعملية ميوزا ويتطور فردًا من الخلية الديبلوئيدية. جميع الأفراد متماثلة من ناحية وراثية إلى الأنثى التي نَتَجَت فيها.

في أحد أنواع الدافني الذي تمُّ بحثه، وجد الباحثون، في مراحل إنتاج الخلايا التناسلية، أن الميوزا تتوقف ولا نحصل على خلايا هيبلوئيدية، بل نحصل على خلايا ديبلوئيدية يتطور منها الأفراد.



نافذة البحث



دافنی

الدافني هي سرطان صغير يعيش في أنقوعة الشتاء. تستطيع الدافني أن تتكاثر بطريقتين: تكاثر تزاوجي (جنسي) وتكاثر عذري. في فصل الشتاء، عندما تكون الأنقوعة مليئة بالماء، جميع الدافني الموجودة تكون إناثا وهي تتكاثر تكاثر عذري: تتطور دافني إناث بالغة من البيوض الموجودة في أجسامها. مع حلول الربيع، عندما تبدأ الأنقوعة بالجفاف، يتطور قسم من البيوض الموجودة في أجسام الإناث إلى ذكور. يتزاوج الذكور مع إناث الدافني الموجودة في الأنقوعة، وفي أعِقاب التزاوج، تتطور في جسم الأنثي بيضتين نسميهما **بيضتا الإستدامة**، تبيض الأنثى داخٍل مياه الأنقوعة. بيوض الإستدامة كبيرةٍ، مغلفة بغطاء قاسي يساعدهن على البقاء عندما تجف الأنقوعة.

عندما تمتلئ الأنقوعة مرة أخرى في فصل الشتاء، تفقس إناث الدافني من بيوض الاستدامة. تتكاثر هذه الدافني بتكاثر عذري وهكذا تعود مرة أخرى إلى الأنقوعة.

أ. اذكروا حسنة واحدة للتكاثر العذري وسيئة واحدة له.

أجرى باحثون تجربة وقد مَيت الدافني في ظروف المختبر لمدة 15 يومًا في 4 أوعية مختلفة. في بدإية التجربة، كانت نفس كمية ماء الأنقوعة ونفس عدد الدافني في جميع الأوعية. في كل يوم، أخرجت كمية مختلفة من الماء دون دافني. خلال 15 يومًا، تابع الباحثون ظهور بيض الإستدامة في كل وعاء.

فيما يلى جدول يعرض نتائج التجربة.



عدد الأيام التي مرَّت حتى ظهرت بيوض الاستدامة في الوعاء	كمية ماء الأُنقوعة التي أُخرجت في كل يوم من الوعاء (ملل)	رقم الوعاء
لم تظهر	1	1
11	2	2
9	3	3
7	4	4

ب. ماذا مكن الاستنتاج من نتائج التجربة؟

ت. كيف تساعد الظاهرة التي تبدو في نتائج التجربة لملاءمة الدافنى لبيت نموها (أنقوعة الشتاء)؟

ث. خمنوا نتائج التجربة، إذا أضفنا إلى كل وعاء كمية دافنى مختلفة، بدل من أن نُخرج ماءً من الأوعية. عللوا إجاباتكم.

ه7. تكاثر لا جنسي بطرق بيوتكنولوجية

الأفضلية الأساسية للتكاثر اللا الجنسي - التماثل الوراثي بين الفرد والوالد - أدت إلى تطور تكنولوجية تكاثر لا جنسية بطرق غير ممكنة في الطبيعة. الطريقتان التكنولوجيتان هما مستنبت الأنسجة والهندسة الوراثية.

مستنبت النسيج، طريقة مقبولة اليوم لتكاثر النباتات بطريقة غير جنسية. بهذه الطريقة تَنْتُج نباتات حديثة السن من خلية واحدة أو من مقطع نسيج صغير أُخذ من فرد صفاته مرغوبة للمزارعين (للحصول على المزيد من معلومات عن مستنبت النسيج، انظروا الفصل السابع).

في الهندسة الوراثية أيضًا، يَنْتُج فردًا جديدًا من خلية بالغة ليست خلية تناسلية. في الماضي (في السنوات 1960-1975)، نجح باحثون في هدم نواة خلية بويضة غير مخصبة لضفدع وإدخال نواة خلية من نسيج إمعاء ضفدع بالغ. تطور شرغوف طبيعي من خلية البويضة!


وُثق بداية عهد الهندسة الوراثية في الثدييات مع ولادة الخروف دولي في سنة 1997. نَتَج الخروف دولي بعملية هندسة وراثية معقدة، اشترك فيها ثلاثة خراف - ثلاث "أمهات":

خروفة واحدة - أُخذت منها خلية جسم (من الضرع). أُخرجت النواة الديبلوئية من الخلبة واستُعملت.

خروفة ثانية - أخرجت منها خلية بويضة. أخرجت نواة خلية البويضة. زُرعت النواة التي أُخرجت من ضرع الخروفة في خلية البويضة.

خروفة ثالثة - زُرعت في رحمها خلية بويضة بعد أن مرَّت خلية البويضة إتحاد مع نواة مصدرها من خلية جسمية.

هكذا، دون إخصاب، حصلنا على خلية ديبلوئيدية تطورت منها الخروفة دولي (الرسمة ه -21). جميع خلايا الخروفة دولي كانت متماثلة تمامًا لخلايا الخروفة التي أُخذت منها النواة الديبلوئيدية، وهي لا تشبه "الأُمهتان الأُخريتان: الأُم التي تبرعت خلية البويضة والأُم التي حملت الجنين في رحمها.



جدي مُهندَس وراثيًا - دولي

عاشت الخروفة دولي حوالي ست سنوات، وقد أنجبت خلالها بوني. لكن عندما كان عُمرها 6 سنوات، ماتت من مرض رئوي ميِّز خراف سنها أكبر منها بكثير.

في هذه الهندسة الوراثية، استُعملت مادة وراثية من خروفة بالغة عُمرها ست سنوات، أحد المخاوف الكبيرة أن دولي ماتت، لأنها وُلدت مع خلايا بالغة أدت إلى هرمها بسرعة.

يعتمد هذا الخوف على النظرية التي تُشير إلى أن عدد مرات انقسام الخلية هو عدد ثابت مسبقًا، وفي كل إنقسام، يقصر طرف جزىء الـ DNA الذي نسمِّيه تيلومير. عندما ينتهى التيلومر في خلايا حرجة، فإنَّ الكائن الحي يتعرض إلى أمراض متعلقة بالهرم. ما أن دولي أنتجت من خلايا ضرع خروفة عمرها ست سنوات، قد يكون عُمرها البيولوجي 11 سنة عند موتها، وهذا سن عودة جيد للخروفة.

على الرغم من الاكتشاف الكبير الذي تحقق في أعقاب إنتاج دولي بهذه الطريقة، إلا أنه حتى يومنا هذا، لا يوجد استعمال واسع لهذه الطريقة في حيوانات متطورة، لكن هذه الطريقة نالت إعجاب بعض الناس المعنيون في أن تُنتَج نسخة طبق الأصل منهم



عملية الهندسة الوراثية في الحيوانات ومن ضمنها في الإنسان، أثارت جدل كبير في العالم، وهي تطرح أسئلة أخلاقية كثيرة.



👣 سؤال ھ - 16

أ. ماذا مكن أن يكون الدافع لاستعمال الهندسة الوراثية في حيوانات المزرعة؟ ب. اقترحوا تبريرين يرفضان استعمال الهندسة الوراثية في الإنسان.

ت. اقترحوا تبريرين يدعمان استعمال الهندسة الوراثية في الإنسان.



المواضيع الأساسية في هذا الفصل

السن الذي يستطيع فيه الكائن الحي أن يتكاثر متعلق بعوامل وراثية - داخلية تتأثر من عوامل خارجية من البيئة المحيطة.

المرحلة، في دورة الحياة، التي يستطيع منها الفرد أن يتكاثر بطريقة جنسية نسميها بلوغا جنسيًا. بعد البلوغ الجنسي، لا تستطيع معظم الحيوانات أن تتكاثر كل السنة، إلا في موسم تكاثرها فقط. عند معظم أنواع الثدييات، من السهل التمييز بين الذكور والإناث بفضل الفروق في العلامات الجنسية الثانوية.

في موسم التكاثر، تبدأ تغييرات في الشكل و/أو سلوكيات الحيوان (الذي وصل البلوغ الجنسي). بفضل هذه التغيّرات، تبث الذكور والإناث إلى مدى استعدادها للتكاثر. في معظم أنواع الأسماك، أجهزة التكاثر بسيطة والإخصاب خارجي.



العوامل التي تزيد احتمال إلتقاء خلايا تناسلية من نفس النوع البيولوجي وحدوث إخصاب في بيت تنمية مائي هي: كمية هائلة للخلايا التناسلية، الأفراد التي تتكاثر فيما بينها تعيش متجاورة على الأغلب، تُطلق الخلايا التناسلية الأنثوية والذكرية إلى الماء في نفس الوقت تقريبًا، تساعد وسائل الاتصال الصوتية و/ أو الكيميائية على التقاء الذكور والإناث وإلتقاء الخلايا المنوية مع خلايا المبويضة.

في البرمائيات، الفرد الذي يخرج من البيضة نسمِّيه شرغوفًا. تمر الشراغيف تغيُّرات تدريجية حتى تتحول إلى برمائيات بالغة في عملية نسمِّيها تحول.

المميز البارز في تكاثر أنواع تعيش كل حياتها على اليابسة، مثل: الزواحف، الطيور والثدييات هو الإخصاب الداخلي.

تكاثر الزواحف والطيور، يوجد له مميِّز مشترك لأغلب الأنواع وهو تطور الجنين داخل بيضة تُباض خارج جسم الأُنثى.

يُتيح مبنى إلبيضة للجنين أن يتطور بشكل مستقل، لكن الأخطار التي تهدد الجنين كثيرة.

جهاّز تكاثر أُنثى الدجاج مبني من قسمين: مبيض وأنبوب البيض. فقط المبيض وأنبوب البيض الأيسران متطوران.

تتطور أربعة أغشية حول الجنين الذي يتطور في البيضة.

مَيِّز عند أفراد الطيور بين صيصان تترك عشها وفراخ تبقى في عشها.

عند الإنسان وأنواع قردة معينة، توجد دورة الحيض. استعداد الأنثى للتزاوج لا يقتصر على فترة معينة في السنة.

ي عند معظم أنواع الثدييات توجد دورة شبق. استعداد الأَنثى للتزاوج يقتصر على فترة معينة خلال دورة الشبق.

في معظم أنواع الثدييات، ومن بينها الإنسان، تتطور الأجنة داخل جسم الأُم في عضو خاص نسمِّيه الرحم.

جميع أفراد الثدييات في الطبيعة متعلقة في بداية حياتها بالأم، وهي تتغذى في الفترة الأولى من حياتها على الحليب الذي يَنْتُج في غدد حليب الأُم.

خلال النشوء والارتقاء، تقدم تطور الأعضاء والآليات التي تُتيح التكاثر في اليابسة بعدة اتجاهات: المكان الذي يتم فيه الإخصاب، المكان الذي يتطور فيه الجنين، الطريقة التي يتغذى بها الجنين والطريقة التي يتغذي بها الفرد الحديث السن.

في الكائنات الحية الأحادية الخلية، مثل: الأميبا والبراميسيوم، انقسام الخلية بطريقة الميوزا معناه تكاثر.

التبرعم طريقة تكاثر لا جنسية، تتطور أفراد جديدة وتَنْتُج على الأُم، تنفصل عن الأُم وتستمر في حياتها بشكل منفصل.

التكاثر العذري هو طريقة تكاثر لا جنسية، يتم على سبيل المثال في حشرات تعيش في مجتمعات، مثل: النحل، سرطانات الماء مثل الدافني.

مستنبت النسيج والهندسة الوراثية هما طريقتان تكنولوجيتان لتكاثر لا جنسي، لا يمكن أن يتم في الطبيعة.

مصطلحات مهمة في هذا الفصل

خصيتان دورة الحيض

بلوغ جنسي دورة الشبق

إباضة ميتوزا

بيضة علامات جنسية ثانوية

غُدد حليب يترك العش

ذات مشيمة طيور

أسماك فورمون

ركود أنبوب الخلايا المنوية (أنبوب الخلايا المنوية)

برمائيات أنبوب ناقل البيض (أنبوب البيض)

هورمونات جنسية شرغوف

حمل تكاثر لا جنسي

إنجاب تكاثر عذري

رضاعة رحم

إخصاب خارجي مبيض

إخصاب داخلي هندسة وراثية

تفریخ مشیمة

يبقى في العش سائل السَّلى

مغازلة كيس صفار البيض

صفار البيض كيس الجنين

عديمة المشيمة خلية بويضة

ثدييات خلية منوية

بربخ الخصية اتصال بين جنسين

الشبق



الفصل السادس: تكاثر النباتات

تتم في نبانات كثيرة طريقتيْ تكاثر: تكاثر غير تزاوجي (لا جنسي) وتكاثر تزاوجي (جنسي). التكاثر غير النزاوجي في النبات نسمِّيه تكاثر خضري أيضًا (معناه نمو وازدياد)، لأن أعضاء النبات المختلفة (التي لا تشترك في التكاثر التزاوجي) - سيقان، غصون أوراق وجذور تُستخدم مصدر للنبات الجديد. كل عضو من هذه الأعضاء يستطيع أن يتطور إلى نبات كامل. يمكن أن يتم التكاثر الخضري دون أي علاقة بسن النبتة وبموسم السنة.

بالمقارنة مع التكاثر الخضري، فإنَّ التكاثر التزاوجي هو حدث خاص يتم في مرحلة معينة من دورة حياة النبات. في هذه المرحلة، تتطور في النبات أزهارًا فيها أعضاء تكاثر جنسية وفيها يتم الاخصاب. في أعقلب الإخصاب، تتطور ثمار في داخلها بذور - بداية جيل جديد.

يوجد نباتات حولية، هذا يعني أنها تبدأ دورة حياتها، تكبر وتتكاثر وتنهي حياتها في دورة واحدة، أو على الأكثر خلال سنة واحدة. كثير من النباتات التي نراها في إزهارها في فصل الربيع، هي نباتات حولية، مثل: البيسوم والخردل وكذلك الأمر، نباتات كثيرة من النباتات الزراعية، مثل: القمح، الذرة وعباد الشمس. نباتات أخرى متعددة السنوات - تعيش أكثر من سنة واحدة وتستطيع أن تتكاثر عدد كثير من المرات خلال حياتها، نباتات كهذه هي نباتات البساتين والكروم، مثل: التفاح، الخوخ، العنب والزيتون وأشجار الحرش، مثل: المثان مثل: المثان النباتات المتعددة السنوات، يوجد جنبات (شجيرات) وأشجار تستمر في النمو والتواجد سنوات كثيرة، وجيوفيتات (نباتات أرضية) أيضًا ستتعلمون عنها فيما بعد. التكاثر التزاوجي الذي يحدث عدة مرات في دورة الحياة هو ظاهرة معروفة لكم أيضًا عند حيوانات كثيرة. لكن على الرغم من ذلك، يوجد فرق أساسي في هذا الأمر بين النباتات والحيوانات: في حين أن عدد سنوات حياة (أو أشهر حياة) حيوانات معينة هو نهائي ويقع في مجال ضيق (مثلًا: القطط





الرسمة ح-1: على اليمين - بيسوم، نبات حولي، على اليسار - شجرة نبات متعدد السنوات

والكلاب التي معدل حياتها 12 سنة)، فإنَّ معدل حياة النباتات يتغيَّر في مجال واسع جدًا من السنوات، مثلًا: يعيش النرجس 5-10 سنوات، يعيش الشيرق عدة عشرات السنوات، يصل عُمرُ المل مئات السنين. تعيش أشجار معينة مئات وحتى آلاف السنين، لكن أقسام الشجرة مثل الأوراق تموت وتتساقط.

ح1. تكاثر غير تزاوجي (لا جنسي)


بالتأكيد رأيتم مرةً ساقًا أُخذ من نبات، وُضع في الماء، أنبت جذورًا وبعد أن غُرس في التربة تطور إلى نبات مستقل. في أنواع معينة، تستطيع ورقة سقطت من نبات أن تُنمي جذورًا، أن تتجذر في التربة وأن تتطور إلى نبات كامل (الرسمة ح-2).



الرسمة ح-2: ورقة نبتة لحمية سقطت على التربة، غَت جذورًا وتطورت إلى نبات حديث السن.

يوجد مميزان مهمان للنباتات يُتيحان تكاثر غير تزاوجي وأيضًا تكاثر تزاوجي خلال عدة سنوات كثيرة:

- استمرار التطور في أطراف الغصون والجذور التي تشكِّل قمم مو النبات وفي براعم إبط الأوراق، توجد أنسجة خاصة مريستيمات (الرسمة ح 3)، خلاياها تتقاسم بوتيرة سريعة وتستطيع أن تتطور وتتمايز إلى أنسجة وأعضاء مختلفة: أوراق، أزهار، غصون وجذور.
- القدرة على التجدد خلايا النباتات البالغة التي قايزت، توجد لديها القدرة على التجدد. تتم هذه القدرة بالأساس بفضل صفتين:
- في كل خلية من خلايا النبات، توجد جميع المعلومات الوراثية المطلوبة لبناء نبات كامل.
- الخلية البالغة التي مرَّت تمايز (مثل خلايا الورقة في الرسمة ح 2)، يمكن أن تعود وتكون ذات قدرة على الانقسام كخلية مريستماتية مثل الخلايا الجذعبة الجنينية عند الحيوانات.



الرسمة ح - 3: أمان المريستيمات في النبات

يحدث التكاثر غير التزاوجي بشكل طبيعي بطرق مختلفة، لكن جميعها تعتمد على العملية الخلوية ميتوزا.

يعرض الجدول ح-1 الطرق المختلفة للتكاثر غير التزاوجي من أعضاء النبات التي تقع داخل التربة وفوق التربة.

جدول ح-1: طرق تكاثر غير تزاوجية في النبات

	العضو	الوصف والشرح	أمثلة
أعضاء داخل التربة	جذمور	ساق متعدد السنوات، يكبر بطريقة أفقية ويحمل أوراق وسليميات. تتطور نباتات جديدة من البراعم* الموجودة في إبط الأوراق.	هليون
	درنة	ساق ثخين أو جذر ثخين يُخزِّن مواد إدخارية. مِكن أن تتطور نباتات كاملة من الدرنات الصغيرة التي تَنْتُج في قاعدة الدرنة ومن براعم التكاثر.	יִלול). כלנית, נורית, סייפן, סתוונית, אירוס
	بصل	ساق قصير وثخين، قواعد الأوراق مرتَّبة حوله بكثافة ومخزَّنة فيها مواد إدخارية. تتطور بُصيلات جديدة من براعم التكاثر الموجودة بين الأوراق.	ים הי ניקה יש ושן, חצב
	جذر	تستطيع الجذور المكشوفة أن تتطور إلى سيقان تحمل أوراقًا وفي النهاية إلى نباتات جديدة.	أجاص، عناب
أعضاء فوق التربة	أوراق	نباتات حديثة السن تتطور في جوانب أوراق نبات بالغ. في الوقت المناسب، تسقط على التربة وتتطور إلى نبات مستقل.	ניצנית
	روافد	سيقان تنمو بالموازاة لسطح التربة (يمكن أن تكون روافد داخل التربة)، تنمو غصون تحمل أوراقًا وجذور من البراعم الموجودة في السليميات.	توت أرضي، عشب أخضر، بوني
	חוטרים	غصون تتطور من قاعدة النبات، تستطيع أن تتطور إلى نبات مستقل جديد إذا انفصلت من نبتة الأم.	موز، أشجار النخيل
	فسائل	تستطيع السيقان التي تتساقط على الأرض أن تنمو منها جذور وأن تتطور إلى نباتات جديدة ومستقلة.	الصبار ("أوراق" الصبار هي سيقان)، التين

^{*}براعم- طرف حديث السن وقصير جدًا للساق الذي تتطور منه أوراق أو أزهار.



الرسمة ح־4: تكاثر لا جنسي (خضري) في النباتات من اليمين إلى اليسار: درنات على نبتة بطاطا، براعم تكاثر على حبة بطاطا، צמחונים في أطراف ورقة بالغة בניצנית, روافد عشب أخضر، روافد بوني.

-ير. المبنى ووظيفة الكائن الح إلى شروط البيئة المحيطة.

الجيوفيتات (ge=أرض; phyton=نبات) هي نباتات متعددة السنوات لها أعضاء تخزين ثخينة، داخل الأرض، تحمل براعم. أعضاء التخزين هي الجذمور، البصل أو الدرنة.

> في مناطق مناخ البحر الأبيض المتوسط مثل إسرائيل، التي فيها الصيف جاف وساخن، تجف أقسام النبات الموجودة فوق التربة مع قدوم الصيف، أما الأقسام الموجودة داخل التربة فإنها تبقى في سبات داخل التربة. في فصل الخريف، تتطور أوراقًا وأزهارًا من البراعم أحيانًا مثل ال ، تظهر الأزهار قبل الأوراق) وتَنْتُج ثمار وبذور. أعضاء التخزين مثل درنات النرجس، צבעוני ויקינתון تحتوى على مواد إدخارية، بالأساس كريوهيدرات. عندما تستيقظ النبتة من سبات الصيف، تتحلل المواد الإدخارية مساعدة إنزمات ويستخدم النبات المتجدد نواتج التحليل لعمليات نمو أعضاءه حتى تتطور أوراق تتم فيها عملية التركيب الضوئي.



أعمدة أزهار חצב



👔 سؤال ح- 1

أ. مكن أن نشاهد في الطبيعة عادة معدية مرادناת הלמוניות وهي تنمو في جماعات كثيفة. اقترحوا شرحًا لهذه الظاهرة.

ب. من تقسيم درنة بطاطا واحدة إلى أقسام، مكن أن نحصل على عدة نباتات بطاطا. اذكروا صفتين مهمتين تُتيحان تتطور نبات كامل من أقسام درنة واشرحوا أهمية كل واحد منها.

لا جنسية في الزراعة، في الفصل السابع، في ري الصفحات 153 - 154.

تُتيح الهوية الوراثية للنسل الناتج في التكاثر اللاجنسي إلى الحفاظ على الصفات المطلوبة لأجيال كثيرة. لهذا السبب، يفضل مزارعون وبستانيون أحيانًا أن يستعملوا طرق تكاثر غير تزاوجي أيضًا في نباتات تستطيع أن تتكاثر في تكاثر تزاوجي. عندما ينجحون في رعاية صنف ذا جودة، يحاول المزارعون إكثاره بطرق تكاثر غير تزاوجية، وهكذا يكون كل النسل متماثلًا في صفاته إلى نبات الأم. مثال لنمو نبات زراعي يتكاثر تكاثر لا زوجي هو أصناف عنب عديدة، مثل كبرينا - سوبينيون الذي يتم تكاثره بواسطة التركيب منذ مئات السنين وهكذا تُحفظ صفاتها من جبل إلى آخر.

ح2. تكاثر تزاوجي

التكاثر التزاوجي عند النباتات يشبه من ناحية مبدئية التكاثر التزاوجي في كائنات حية أخرى: خلايا تكاثر هيبلوئيدية (جاميتات) تلتقي وتتحد، من الزيجوت الديبلوئيدي يتطور جنين وهو يتطور إلى نبات جديد. مع مرور الوقت، يكبر النبات حديث السن إلى نبات بالغ ويصل مرحلة تطور الأزهار في داخلها أعضاء تناسلية، وهو بتكاثر ويُنجب نسلا إضافيًّا.



ا سؤال ح -2

لماذا لا تُحفظ صفات نبتة الأم في التكاثر التزاوجي؟




👣 سؤال ح-3

في مشتل نباتات الحديقة، شتلوا أشتال ورد في تلمين عريضين متجاورين أو ب. جميع الأشتال . في التلم أ غُيت من فسائل أُخذت من نبات أم واحد. جميع الأشتال في التلم ب غُيِّت من بذور جُمعت من نفس نبتة الأم التي أُخذت منها الفسائل للتلم أ. كانت الظروف متماثلة في التلمين. بين النباتات التي غّت في التلم ب، كان فرق كبير في الطول، أما بين النباتات التي غّت في التلم أ، كان فرق أقل في الطول. اشرحوا النتائج.

متى يتكاثر النبات بتكاثر تزاوجى؟

تبدأ دورة حياة النباتات مع بذور (الرسمة ح - 5) مع إنبات البذرة التي تتطور منها النبتة حديثة السن. في جميع أنواع النباتات، توجد مرحلة في حياة النبتة - مرحلة النمو الخضري- فيها ينمو ويكبر النبات، لكنه لا يُزهر ولا يستطيع أن يتكاثر بتاتًا. مكن أن تتم مرحلة التكاثر التي يتم التعبير عنها بالإزهار، إذا تحققت شروط خاصة تتأثر من عوامل داخلية ومن عوامل خارجية - بيئية محيطة. الأزهار هي مركز نشاط تكاثر النباتات التي مع بذور: في أعضاء التكاثر في الزهرة، تتطور الخلايا التناسلية التي تشترك في عمليات التلقيح والإخصاب. في أعقاب الإخصاب، تتطور في النبات ثمار وفي داخلها بذور. في كل بذرة يوجد جنين وهو بداية الجيل القادم.



الرسمة ح -5: مراحل وعمليات في دورة حياة نبات مع بذرة: من بذرة واحدة إلى تُمتر فيها بذور

في النباتات الحولية، يهرم النبات وعوت وتبدأ البذور دورة حياة جديدة. في نباتات متعددة السنوات، تتم المرحلة التناسلية في الدورة مرات كثيرة خلال حياة النبات.

مصطلحات

مع بذور ودون بذور

غيِّز في مملكة النبات بين نباتات مع بذور ونباتات دون بذور. في النباتات التي دون بذور، يتطور الجنين داخل عضو بدأ فيه الإخصاب وهو غير محمي بقشرة. الطحالب التي تُعتبر نباتات مائية، وأيضًا الأشنات والسرخسيات التي تُعتبر نباتات يابسة بسيطة تعيش في بيئة محيطة رطبة، جميعها من دون بذور وهي لا تحمل أزهارًا.

في النباتات التي مع بذور، الأجنة محمية جيدًا داخل البذرة. تنتمي إلى هذه المجموعة معظم النباتات المعروفة لكم اليوم من الحياة اليومية، والتي سوف نتوسع فيها في هذا الفصل.

ح1.2 الإزهار

في النباتات التي مع بذور، الانتقال إلى مرحلة التكاثر التزاوجي يتم التعبير عنه بالدرجة الأولى بظهور الأزهار. تُزهر النباتات متعددة السنوات كل سنة في موسم ثابت، مثلًا: يُزهر ال החעב في الخريف واللوز - مع قدوم فصل الربيع (عيد غرس الأشجار). تُزهر النباتات الحولية في نهاية مرحلة النمو.

كيف "تعرف" النباتات اقتراب الموسم المناسب للتكاثر؟ 📝

الانتقال من مرحلة النمو الخضري إلى المرحلة التناسلية متعلق بعوامل داخلية وبعوامل خارجية. العوامل الداخلية التي تؤثر على موعد الإزهار متعلقة بالمعلومات الوراثية للفرد التي تُحدد سير التطور الذي عيِّزه. حسب المعلومات الوراثية، توجد فترة فترة ينمو فيها النبات، لكنه لا يتكاثر بتاتًا. يختلف طول هذه الفترة في الأنواع المختلفة: في النباتات الحوليةالتي تنمو في موسم الأمطار، وفي النباتات الصحراوية أيضًا، هذه الفترة قصيرة جدًا وتستطيع أن تستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط. أما في أشجار كثيرة، تمر عدة سنوات قبل أن يتم التكاثر الأول للنبات.

جدير بالمعرفة

مرة واحدة تكفى ...

يوجد نباتات متعددة السنوات مثل ال האגבה التي تتكاثر تكاثر تزاوجي مرة واحدة في الحياة خلال حياتها. ينمو النبات ويطور أوراقًا خلال حوالي 15 سنة ويتكاثر تكاثر غير تزاوجي. عند اقتراب نهاية حياته، ينمو عمود واحد من الأزهار، وبعد الإزهار والإخصاب، ينهي النبات دورة حياته ويموت (ذُكرت ظاهرة شبيهة حول أسماك السلمون في الفصل الخامس، صفحة 81).

الضوء عامل خارجي - بيئة محيطة يؤثر بشكل كبير على موعد إزهار نباتات كثيرة. بيَّنت أبحاث كثيرة أن النباتات حساسة لدورية عدد ساعات الإضاءة في اليوم، وهي تُزهر عند دمج عدد معين من ساعات الضوء وساعات الظلام. رد فعل النبات لدورية الضوء نسمِّية فترة التوقيت (photo=ضوء; periodos=فترة). اتضح أن العامل الذي يحدد ما إذا نبات يُزهر



אגבה مع عمود إزهار

أو لا يُزهر هو تسلسل عدد ساعات الظلام وليس بالضرورة عدد ساعات الضوء. نبات نهار قصير، هو نبات يُزهر فقط إذا كان تسلسل عدد ساعات الظلام أكبر من قيمة العتبة (القيمة الحرجة). يُزهر نبات نهار طويل، فقط إذا كان تسلسل عدد ساعات الظلام أقل من قيمة معينة.

للمزيد عن

التأثير على موعد الإزهار بواسطة إضاءة اصطناعية، في الفصل السابع، صفحة 161.

نتعلم من هنا أن النباتات التي تُزهر في الربيع، تستجيب لإطالة النهار وتقصير الليل، أما النباتات التي تُزهر في الخريف، فإنها تستجيب لتقصير النهار ولإطالة الليل. بجانب ذلك، يوجد نباتات مبالية (لا تستجيب)لطول النهار ويتأثر إزهارها من عوامل أخرى.

معنى رد فعل النبات لدورية الضوء والظلام أن النبات فيه وسيلة تحس بالضوء وأيضًا وسيلة تقيس مدة الإضاءة أو الظلام. وسيلة إحساس الضوء هي صبغية الفيتوكروم. الفيتوكروم (phyton=نبات; chroma=لون) موجود في كل النباتات الخضراء وهو يشترك في عمليات مهمة في النبات، مثل: الإنبات والإزهار التي يكون فيها الضء مؤشرًا من البيئة المحيطة.

الفيتوكروم موجود على شكلين وبذلك خصوصيته: الشكل الأول نسمِّيه Phytochrome red) ، عتص من الضوء أطوال أمواج الضوء الأحمر (أطوال أمواج 650-680 نانومتر) وهو يتغيَّر في أعقاب ابتلاع الضوء إلى شكل نسمِّيه Phytochrome far-red) Pfr ، وهذا الشكل الأخير يبتلع ضوء أحمر بعيد (أطوال أمواج 710-740 نانو متر). يُعيد ابتلاع الضوء الأحمر - البعيد الفيتوكروم إلى الشكل Pr الذي يبتلع ضوء أحمر فقط (الرسمة ح -6). يحث (يؤدي) تغيير شكل الفيتوكروم تغيُّرات في النبات، مثل: الإزهار والإنبات. يؤدي البقاء مدة زمنية طويلة في الظلام إلى تغيير شكل الفيتوكروم الفعَّال - Pfr .



الرسمة ح-6: انتقال شكل الفيتوكروم عند تأثير أنواع الضوء

في أعقاب ابتلاع الضوء بواسطة الفيتوكروم Pr، تغيِّر بروتينات، في مبنى الفيتوكروم، مبناها الفراغي إلى الشكل الفعَّال Pfr. تدخل في شكلها الفعَّال إلى نواة الخلية وترتبط ببروتينات النواة التي تؤثر على نشاط جينات معينة وعلى ثبات بروتينات مختلفة. وهكذا تؤثر على تحفيز الإزهار في قسم معين من النباتات وعلى تثبيط (إعاقة) الإزهار في نباتات أخرى، وكذلك الأمر على الإنبات.

في الطبيعة النباتات لا تتعرض لإضاءة منفصلة للضوء الأحمر وللضوء الأحمر البعيد، لكن خلال النهار، يتعرض النبات إلى الضوء الأحمر أكثر من الضوء الأحمر - البعيد. تستجيب النباتات إلى نوع الضوء ولمدة الإضاءة: نباتات النهار القصير، مثل: חרצית، توت أرضي، أرز ودخان، تُزهر عندما يكون في بيئتها المحيطة عدد ساعات الظلام خلال اليوم أكبر من قيمة معينة. نباتات النهار الطويل، مثل: القمح، الشعير، الشمندر، الفجل، البازيلاء والخس، تُزهر عندما يكون عدد ساعات الظلام خلال اليوم أصغر من قيمة معينة (لللة قصرة).

بيَّنت الأبحاث إذا قطعنا فترة الظلام المطلوبة لإزهار نبتة نهار قصرة بواسطة ومضة قصرة للضوءالأحمر، فإنَّ النبتة لا تُزهر (الرسمة ح -7). مكن أن نُبطل تأثير الضوء الأحمر بواسطة ومضة ضوء إضافية لضوء أحمر - بعيد. بالمقارنة مع ذلك، في نباتات نهار طويل تحتاج إلى فترة ظلام قصيرة، ممكن أن نؤدى إلى إزهار بواسطة قطع فترة الظلام الطويلة بواسطة ومضة ضوء أحمر. وهذا التأثير أيضًا، مكن أن تلغيه بواسطة إضاءة بضوء أحمر - بعيد.

نَنْتُج من الوصف أعلاه أنه توجد في النبات آلبة لقباس عدد ساعات الضوء والظلام. هاتان الآليتان: آلية قياس الزمن وآلية الحس في نوع الضوء (أحمر أو أحمر بعيد) تعمل معًا في توجيه الإزهار.

في اليوم	وء 🔲 وساعات الظلام	تسلسل ساعات الض	
8 8 8	8 16	16 8	
			النبتة أ
			النبتة ب

الرسمة ح -7: تأثير دورية ساعات الضوء والظلام على الإزهار في نبات يوم قصير ونبات يوم طويل



أ. أي نبتة من بن النبتين في

الرسمة ح-7 هي نبتة يوم قصير؟ اشرحوا.

ب. هل النباتات التي تُزهر في البلاد في الصيف هي نباتات نهار قصير، أن نباتات نهار طويل؟



نُشر السؤال الآتي في منتدى بُستانيين في الإنترنيت:

في عيد رأس السنة الميلادية قبل سنتين، حصلنا على هدية أصيص صبار مزهر وجميل جدًا - דיגוקקטום - وقد أحبه جميع أفراد العائلة. في تعليمات المعالجة، سُجِّل أن الإزهار يتجدد في كل سنة، في بداية الشتاء. الأصيص موجود في الصالون، وهو مكشوف للضوء نسبيًا. ينمو النبات بشكل مثالي وهو يبدو سليم وقوى، لكن مرَّت سنتين ونحن ما زلنا ننتظر الإزهار. ماذا يجب أن نعمل، كي يعود للإزهار؟

الإجابة التي وردت في ذلك المنتدى:

يجب إخراج ال הזיגוקקטום إلى الشُرفة المكشوفة لضوء الشمس حوالي شهرين قبل بداية الإزهار المتوقع. هذا يعنى، إذا يبدأ إزهاره في شهر نوفمبر، فمن الأفضل أن تُخرجه إلى الشُرفة في شهر سبتمبر.


أ. بناءً على المعلومات والإجابة التي أعطيت في المنتدى حول إزهار نبتة ال הזיגוקקטוס، حدِّدوا ما إذا هي تنتمي إلى نبات نهار طويل أو نبات نهار قصير. اشرحوا إجابتكم. ب. اشرحوا التوصية لنقل ال הזיגוקקטוס من الصالون إلى الشُرفة.



זיגוקקטוס

هناك عامل خارجي في البيئة المحيطة يؤثر على الإزهار وهو درجة الحرارة. يوجد أنواع نباتات تُزهر فقط بعد أن تتعرض مدة زمنية معينة لدرجة حرارة منخفضة نسبيًا $^{\circ}$ $^$

ح2.2 مبنى الزهرة والأعضاء التناسلية



الرسمة ح -8: مقطع طولي تخطيطي في الزهرة

لا توجد زهرة يمكن تسميتها "زهرة نموذجية"، لأنه لا يوجد تقريبًا حدود للتباين في شكل ومبنى الأزهار، لكن يمكن أن نَصف أقسامًا تميِّز معظم الأزهار. تعرض الرسمة ح-8 مقطع طول تخطيطي للزهرة. أقسام النبتة مرتَّبة عادةً في دوائر (حلقات):

في أغلب الحالات، نجد دائرتين للغلاف الزهري - أوراق الكأس وأوراق التويج. أوراق الكأس خارجية ويكون عادةً لونها أخضر. وظيفتها الأساسية حماية أقسام الزهرة الأخرى، خاصةً في المراحل الأولى من تطور برعم الزهرة الذي في ذلك الحين تغلفه. أوراق التويج هي الأوراق الداخلية، عادة تكون ملونة وتشكل وسيلة لجذب الملقحات - حيوانات تنقل حُبيبات اللقاح من زهرة إلى زهرة، وهكذا تساعد في عملية التكاثر التزاوجي.

يوجد أنواع أزهار لها دائرة واحدة فقط من الغلاف الزهري، مثلًا: البُصيل. يوجد أنواع أزهار، لا يوجد للأزهار غلاف زهرى بتاتًا، مثلًا:

أزهار الخروب. في أنواع كثيرة، تكون أوراق الغلاف الزهري للأزهار متحدة (مرتبطة) وهي تبدو ككأس كامل وليس كأوراق تويج منفردة، مثلًا: نبتة ال $\pi = 0$ الرسمة ح $\pi = 0$ ا.








الرسمة ح-9: أزهار ذات غلاف زهري مختلف من اليمين إلى اليسار: היביסקוס, יערה איטלקית, פטוניה

في الداخل وبَعد أوراق التويج يوجد أسدية وفي مركز الزهرة يوجد הيزاد (أحيانًا يوجد عدة برادوي). في نباتات كثيرة يوجد غُدد رحيق داخل الزهرة أو مجاورة لها. غُدد الرحيق هي أنسجة تفرز رحيقًا سائلًا حلوًا وله رائحة يُستخدم لجذب ملقحات تتغذى عليه. يمكن أن نعتبر الرحيق على أنه مكافأة لمُلقحات النبتة مقابل "خدمات التلقيح" التي تقدمها.

الأعضاء التناسلية الذكرية: الأسدية

كل سداة مبنية من ترت يحمل مِربِدِح فيه أربعة أكياس لُقاح (الرسمة ح -10). في أكياس اللقاح يوجد خلايا ديبلوئيدية - خلايا الأم. تتم الميوزا في هذه الخلايا، ومن كل خلية أُم تَنْتُج 4 خلايا هيبلوئيدية، حيث تتطور كل واحدة منها إلى حبيبة لقاح. لكن يجب علينا أنْ لا نُخطئ أنْ حبيبة اللقاح ذاتها ليست مماثلة للخلية التناسلية الذكرية النباتية! تنقسم نواة خلية حبيبة اللقاح (بالميتوزا)، وهكذا نحصل في داخل حبيبة اللقاح على خليتين هيبلوئيديتين. بعد إنبات حبيبة اللقاح على الميسم، تنقسم خلية واحدة إلى خليتين، ومن بين الخليتين الابنتين تكون خلية واحدة خلية تناسلية ذكرية (خلية التكاثر) تتحد مع خلية البويضة ويَنْتُج الزيجوت.



الرسمة ح -10: تطور حبيبات اللقاح

عدد حبيبات اللقاح في كل زهرة كثيرة جدًا. في أشجار النخيل، على سبيل المثال، تم عد عشرات آلاف حبيبات اللقاح في الزهرة الواحدة. تنتشر حبيبات اللقاح إلى أزهار أخرى بمساعدة الرياح أو بمساعدة الحيوانات. تُحفظ حيوية حبيبات اللقاح عدة ساعات وحتى عدة أيام من موعد نضوجها. في أماكن كثيرة في البلاد، نرى في فصل الربيع لقاح أصفر بالعين المجردة. هذه هي حبيبات لقاح ال ١٣٦٨. حبيبة اللقاح الناضجة محاطة بجدار متعدد الطبقات. الجدار مصنوع من المواد الأكثر صمودًا التي تَنتُج في الطبيعة. الطبقة الخارجية قاسية جدًا ولها نتؤات (بروزات) ومنخفضات عيز النوع. يوجد لمبنى جدار حبيبات اللقاح وصفاتها عدة وظائف:


حماية حبيبات اللقاح من الجفاف، الأشعة والضربات الميكانيكية (الآلية).


جدار له تتته يساعد على الالتصاق بالملقح والتحرير منه أيضًا عندما يصل الملقح الميسم.

جدار ملساء أو ذات أكياس هواء تسهل على الطيران في الريح.

تعرُّف وتمييز بين الميسم وحبيبات اللقاح من نفس النوع البيولوجي.

تُستعمل البروزات والمنخفضات الموجودة على جدران حبيبات اللقاح كإحدى الوسائل لتصنيف النباتات.





حبيبات لقاح من نباتات مختلفة (مكبرة حوالي مائة ضعف)



جدير بالمعرفة

جدار حبيبات اللقاح

بفضل الصمود العالى للجدار الخارجي، يُحفظ شكل حبيبات اللقاح سنوات كثيرة بعد أن تصبح غير حيوية. وجد باحثون متحجرات لحبيبات لقاح عُمرها 100 مليون سنة. يساعد تنوع حبيبات اللقاح التي حُفظت من فترات قدمة على تعلم التاريخ البيولوجي للكرة الأرضية وعلى معرفة الشروط التي كانت سائدة فيها في الماضي. بالأساس مكن التعلم عن أنواع الأشجار والغابات التي كانت شائعة في فترة معينة، وفقًا لكميات وأنواع حبيبات اللقاح المختلفة التي وُجِدت، حيث تُنتج أشجار كثيرة حبيبات لقاح بكميات كبيرة.

في عدة حالات، ساعدت حبيبات اللقاح على حل واكتشاف أعمال جنائية: حبيبات اللقاح التي وُجدت على ملابس المشتبه به والتي مُيِّزت بواسطة جدرانها الخاص، ربطت المشتبه به موقع الجرعة.




🐔 سؤال ح - 6

مبنى حبيبات اللقاح مناسب للتكاثر في بيئة محيطة جافة. اشرحوا هذه العبارة.

الأعضاء التناسلية الأنثوية: المتاع

المتاع مبنى من ثلاثة أقسام (الرسمة ح-8):

- 1. ميسم: منطقة واسعة في رأس القلم. في حالات كثيرة تكون على الميسم شعيرات وهي لاصقة تُستعمل لإستيعاب حبيبات اللقاح. عندما تصل حبيبة لقاح إلى ميسم الزهرة من نفس النوع (species) فإنها "تنبت". الميسم هو مكان غنى بالرطوبة وسهل لإنبات حبيبات اللقاح، كما أن الميسم يفرز سائلًا غنيًا بالسكريات، الحوامض الأمينية والدهنيات التي تزوِّد مواد غذائية لحبيبة اللقاح التي تنبت.
- 2. القلم: أنبوب يربط بين الميسم والمبيض الموجود في قاعدة المتاع. مر عبره الخلايا التناسلية الذكرية إلى المسض.
- 3. المبيض: موجود في قاعدة المتاع. في كل مبيض يوجد مبنى نسمِّيه بويضة أو عدة مباني كهذه، هذا يعني عدة بويضات. عدد البويضات وترتيبها في المبيض عيِّز كل نوع نبات.



الرسمة ح -11: مراحل تطور خلية البويضة



تحدث الميوزا في خلية البويضة، حيث نحصل على أربع خلايا هيبلوئيدية، ثلاث منها تضمر. في الخلية التي تبقى، تتم ثلاثة انقسامات ميتوزا، في أعقابها يَنْتُج مبنى يشتمل على نواتين هيبلوئيديتين و 6 خلايا أنويتها هيبلوئيدية (الرسمة ح-11). فقط خلية واحدة من بين الخلايا الست هي خلية بويضة (خلية تكاثر أنثوية) تتحد أثناء الإخصاب مع خلية تكاثر ذكرية لإنتاج زيجوت.

مصطلحات

بويضة وخلية يويضة

المصطلحان بويضة وخلية بويضة لهما معنيان مختلفان في سياق الحيوانات والنباتات. في حين أنه في الحيوانات، خلية البويضة (خلية التكاثر الأنثوية) نسمِّيها بويضة أحيانًا، إلا أنه في النباتات، تشتمل البويضة في داخلها على مبنى متعدد الخلايا، فقط خلية واحدة من خلاياه هي خلية بويضة (الخلية التكاثرية الأنثوية).




سؤال ح - 7

اذكروا مميزات (مكونات مبنى وعمليات) متشابهة في الجهاز التناسلي عند النباتات وفي الجهاز التناسلي عند الحيوانات في اليابسة.

🥇 توسع ست واحد أو أكثر

تحتوى أزهار معظم أنواع النباتات على أسدية ومتاع أيضًا. هذه الأزهار ثنائية التزاوج. يوجد أنواع نباتات في أزهارها يوجد متاع فقط أو أسدية فقط. هذه الأزهار نسمِّيها أحادية التزاوج (الرسمة ح -12).

بن أنواع النباتات التي أزهارها أحادية التزاوج، يوجد نباتات، نجد عليها أزهار ذكرية وأزهار أنثوية على نفس الفرد. هذه النباتات أحادية المسكن، مثلا: الذرة. في أنواع أخرى، الأزهار الذكرية والأنثوية موجودة على أفراد مختلفون. يوجد لهما "مسكنان"، هذا يعنى ثنائية المسكن، مثل: الخروب والنخيل.



الرسمة ح-12: الإمكانيات الوجودة بالنسبة لمكان أعضاء التكاثر في الأزهار والنباتات

للمزيد عن

مبادئ التكاثر التزاوجي، في الفصل الثاني، صفحة 25.

ح3.2 تلقيح

مثل إنتاج الفرد عند الحيوانات، يَنْتُج الفرد عند النباتات في أعقاب الإخصاب - اتحاد خلية تناسلية ذكرية (جاميتا ذكرية) مع خلية تناسلية أنثوية موجودة في البويضة داخل المبيض. العملية التي تسبق الإلتقاء بين الخلايا التناسلية نسمِّيها "تلقيح"، هذا يعني انتقال حبيبات لقاح إلى الميسم. بعد إنبات حبيبات اللقاح فقط، تَنْتُج خلية تناسلية ذكرية.

بالمقارنة مع الحيوانات، النباتات ثابتة في مكانها ولا تستطيع أن "تفتش" عن زوج. يتم نقل حبيبات اللقاح من زهرة إلى زهرة بطريقتين أساسيتين: التلقيح بواسطة الرياح والتلقيح بواسطة الحيوانات (جدول (بالأساس حشرات وعصافير). مبنى الزهرة، لونها ومبنى حبيبات اللقاح ملائمة لطريقة التلقيح (جدول ح-2, الرسمة ح - 13).

جدول ح-2: ملاءمة الزهرة وأعضائها للتلقيح بواسطة الرياح والحيوانات

تلقيح بواسطة الحيوانات	تلقيح بواسطة الرياح	الميز
أزهار كبيرة وملونة أو صغيرة، لكنها مرتّبة في نورة كثيفة وبارزة تجذب في شكلها وألوانها الحشرة الملقحة.	أزهار صغيرة لا لون لها	كبر الأزهار وألوانها
مبنى يشجع على التلامس بين الحشرة التي تصل الزهرة وبين حبيبات اللقاح والميسم.	أحيانًا تنقصها أوراق التويج	مبنى الأزهار
يوجد رحيق و"مسارات رحيق" على أوراق التويج التي توجُّه الملقح إلى الرحيق.	لا يوجد	غدد رحیق
يوجد رائحة تجذب الحيوانات.	لا يوجد	رائحة الأزهار
مناسبة لإلتصاق اللقاح إلى جسم الحشرة أو أرجلها أثناء زيارته الزهرة	خيوط الملقحات طويلة، مرنة وبارزة من داخل الزهرة	مبنى الأسدية
عددها كبير جدًا (يُستخدم قسم منها كغذاء للملقحات)	عددها كبير جدًا (ملايين)	عدد حبيبات اللقاح
كبيرة وثقيلة نسبيًا، السطح الخارجي خشن، توجد إضافات تُسهل على الإلتصاق بجسم الحيوان الملقح.	صغيرة، خفيفة في الوزن وسطحها الخارجي أملس نسبيًا. أحيانًا توجد إضافات تسهل على الطيران مثل أكياس الهواء.	مبنى حبيبات اللقاح
السطح صغير نسبيًا ولاصق	مكشوفة، مرنة، له مساحة استيعاب واسعة ولاصقة، أحيانًا متفرع.	مبنى الميسم

علاقة بالموضوع

علم البيئة: ملائمة مبنى الزهرة للعلاقة المتبادلة مع الحيوانات.





الرسمة ح -13: على اليمين - أزهار (חרצית) تُلقحها حشرات. على اليسار -أزهار كككك تُلقحها الرياح.

▲ سؤال ح -8

تُلقح نحلة العسل نباتات كثيرة. ما هو نوع العلاقة المتبادلة بين نحلة العسل والأزهار؟ اشرحوا.

👔 سؤال ح -9

في منطقة معينة، ينمو نوعان من النباتات. النوع الأول - نباتات ذات رائحة عطرة، لها أوراق تويج ملونة، والنوع الثاني - نباتات ذات أوراق تويج لا لون لها. في أعقاب الرش بالمواد الكيميائية، أبيدت معظم الحشرات في المنطقة. نتيجةً لذلك، حدث تغيير في النسبة العددية بن نوعى النباتات.

ماذا كان، حسب رأيكم، التغيير في النسبة العددية بين نوعي النباتات؟ علِّلوا.

سؤال ح-10

أ. مَاذَا تُبذَل الموارد الرئيسية والطاقة في النباتات التي تُلقح بواسطة الرياح بالمقارنة للنباتات التي تُلقح بواسطة الحيوانات؟

ب. اشرحوا، كيف يكون بذل الموارد مرتبط بطريقة التلقيح؟

جدير بالمعرفة

حمى القش

ليس كل حبيبة لقاح تصل الميسم تنبت عليه. أولًا وقبل كل شيء، على نبتة معينة، لا تنبت حبيبات لقاح نباتات تنتمي إلى نوع (species) آخر كان تطير بالرياح أو وصلت عن طريق الصدفة بواسطة حشرة أو عصفور. نفهم من هذه الظاهرة أن النبتة فيها آلية تعارف، وفقط حبيبات لقاح من نفس النوع تنجح في الإنبات. فيها بعد خلال الفصل، نتعرف على آلية إضافية.

تلقيح ذاتى وتلقيح غريب

إذا كانت حبيبات اللقاح التي نبتت على الميسم من نفس الزهرة أو من أزهار نفس الفرد (في نبات أُحادي المسكن)، فإنّ ذلك تلقيح ذاتي. إذا وصلت حبيبات اللقاح من فرد آخر من نفس النوع (species)، فإنَّ ذلك تلقيح غريب (متبادل).

في التلقيح الغريب، التنوع الوراثي عند الأفراد كبيرًا، لأن هناك دمج معلومات وراثية من والدين مختلفين، أما في التلقيح الذاتي، والد واحد هو المصدر الوحيد للمعلومات الوراثية. من المهم أنْ نتذكر أنه في التلقيح الذاتي أيضًا، الأفراد لا تكون مماثلة للوالد، لأنه في عملية إنتاج الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية تحدث الميوزا، تَنْتُج خلايا تناسلية مختلفة عن بعضها في مكوناتها الوراثية واتحاد الخلايا التناسلية يكون عشوائيًا، وفي الواقع هذا تكاثر جنسي لكل شيء.

في أنواع نباتات كثيرة، يحدث تلقيح غريب وتلقيح ذاتي. يشكل التلقيح الذاتي أفضلية في أنواع فيها احتمال التلقيح الغريب صغير، على سبيل المثال، عندما يكون البُعد بين الأفراد كبير جدًا ولا يُتيح التلقيح الغريب. يوجد أنواع فيها معظم التلقيح هو تلقيح ذاتي، لكن أنواع قليلة فقط، تُلقح بتلقيح ذاتي.

ا سؤال ح -11

أ. في أي مرحلة في عملية إنتاج الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية تحدث الميوزا؟ ب. درجوا مدى التشابه - من الأكثر شبهًا إلى الأقل شبهًا - بين الأفراد المختلفة: أفراد التلقيح الذاتي، أفراد التلقيح الغريب، توأم متماثل، الأشقاء والأخوة والأخوات التوأم. اشرحوا التدريج الذي حدَّدتهوه.



👔 سؤال ح-12

أ. أي نوع اتصال يوجد بين حبيبات اللقاح والميسم؟ اشرحوا. ب. ما هي الأفضليات الممكنة عندما تتم طريقتي التلقيح في نفس النبتة؟



النحث النحث النحث

تنيمة نباتات طبية في بيوت تنمية مصنوع من شبكة

في السنوات الأخيرة، اتسع استعمال النباتات الطبية. النبتة אِיפַסִיס מצוי (Isatis jusitanica) - نبات حولي من عائلة الصليبين، يُستعمل في الطب الشعبي بالأساس لمعالجة النزيف الخارجي والداخلي، لإلتئام الجروح، لتسكين الآلام ولتهدئة الحروق.

مع ازدياد الطلب على نبتة ال לאיסיס لإحتياجات طبية، بدأ المزارعون في تنمية النبات في مبان مصنوعة من شبكات كثيفة. لكن اتضح أن النباتات التي تنمو في هذا النوع من البيوت، لم تتطور فيها ثمار.

للبحث الذي أعدُّ لفحص السبب لعدم وجود ثمار، تمَّ اختيار 5 أنواع نباتات من عائلة الصليبين. استُعملت في التجربة 40 شتلة من كل نوع وقد وُزعت إلى مجموعتين: مجموعة واحدة كبيرة داخل بيت تنمية مصنوع من شبكة، ومجموعة ثانية كبيرة في قطعة أرض مفتوحة، مجاورة لبيت التنمية المصنوع من شبكة. في كل واحدة من المجموعتين تمَّ فحص:




איסטיס מצוי

- 1. العدد الكلى للأزهار من كل نوع نبات.
- 2. عدد الثمار التي تطورت من كل نوع نبات.

من مُعطيات عدد الأزهار وعدد الثمار، تمَّ حساب الخصوبة بالنسبة المئوية لكل نوع نبات حسب القاعدة الآتية:

عدد الثمار التي أغرتها نباتات من نوع معين X 100 الخصوبة بانسبة المئوية = المجموع الكلى للأزهار التي نتجت من نباتات نوع معين



الرسمة ح-14: الخصوبة بالنسبة المئوية عند أنواع نباتات ثُميَّت في قطعة أرض مفتوحة أو في بيت تنمية مصنوع من شبكة

- 1. يدعي الباحثون أن النتائج تُشير إلى أن بيت التنمية المصنوع من شبكة عنع التلقيح بواسطة الحشرات. استعينوا بالنتائج المعروضة في الرسمة، كي تعلِّلوا هذا الإدعاء.
- 2. ما هي، حسب رأيكم، طريقة التلقيح عند האביבית המצויה ושל הטוריים המצויים؟ اشرحوا إجابتكم.
 - 3. ماذا كنتم تقترحون على المزارعين أن يعملوا، كي ثمار وبذور في نبتة ال האיסטיס؟
- 4. لماذا، حسب رأيكم، حاول المزارعون تنمية ال האיסטיס في بيوت تنمية مصنوعة من شبكة وليس في حقل مفتوح؟

طرق لمنع التلقيح الذاتي

في نباتات كثيرة، تطورت خلال النشوء والارتقاء آليات مختلفة تصغِّر احتمال التلقيح الذاتي، وفي حالات كثيرة تمنعه بتاتًا.

يمكن تصنيف آليات منع التلقيح الذاتي إلى ثلاث مجموعات.

أ. فصل المكان: الأعضاء التناسلية الأنثوية والذكرية بعيدة عن بعضها

يمكن تحقيق فصل المكان بالطرق الآتية: في الأزهار أُحادية التزاوج، كل زهرة تحتوي على أعضاء تناسلية منو نوع واحد فقط - أسدية أو أمتعة (متاع). في نباتات أحادية المسكن، تقع الأزهار أحادية التزاوج على نفس الفرد، لكن البُعد بينهما يقللاحتمال حدوث تلقيح ذاتي. في نباتات ثنائية

المسكن، تقع الأزهار على أفراد مختلفة، لذا على أي حال احتمال حدوث التلقيح الذاتي صغير.




أزهار الحروب على شجرة أنثوية



أزهار الحروب على شجرة ذكرية

שנית גדולה



الرسمة ح -15: فصل المكان - طول مختلف للأسدية ولقلم المتاع في أزهار

طريقة فصل إضافية في المكان موجودة في نباتات فيها الأسدية والمتاع في نفس الزهرة، لكنها "ישורה" שנית גדולה יפפר أزهار فيها الأسدية أقصر من المتاع، ويوجد أزهار فيها الأسدية أطول من المتاع (الرسمة ح - -15). يتم التلقيح الخصب فقط إذا سقطت حبيبات لقاح من سداة قصيرة على ميسم متاع قصير وبالعكس.

ب. الفصل في موعد نضوج الأسدية والميسم الفصل في موعد النضوج الأسدية والمتاع لا تنضج في نفس الوقت بالضبط. تنضج الأسدية قبل نضوج المّيسم أو بالعكس، وهكذا مُنع التلقيح الّذاتي ويزدادّ احتمال التلقيح الغريب. النّضوج المبكر للأسدية معروف، على سبيل المثال، في أزهار كثيرة من عائلتي ال مسهوريت الممادردوي. في نباتات معينة من عائلة النجيليات، ينضج المتاع قبل الأسدية.

ت. عدم الملاءمة الذاتى: منع التلقيح الذاتى بواسطة آلية وراثية

"عدم الملاءمة الذاتي" معناه أن حبيبات لقاح فرد معين لا تستطيع أن تنبت على ميسم نفس الفرد، هذا يعني يوجد هنا رفضٌ "الذات" وقبول "غير الذات". الآلية التي تمنّع إنبات حبيبات لقاح أو استمرار تطور הנחשון هي وراثية وتعتمد على قدرة التمييز بين "الذاتي" وبين "غير الذاتي".

ما هو الشرح لظاهرة "عدم الملاءمة الذاتية:

بيَّنت الأبحاث أن النباتات تحتوي على جين يُشرف على نظام التعارف. نرمز له عادة بالحرف S. يوجد للجين S اليلات كثيرة، وكل أليل يُشفر لإنتاج مادة خاصة. في كل خلية نبات ديبلوئيدية، يوجد اليلان للجن S إشارتيهما على سبيل المثال هما: S1 وَ S2. حبيبة اللقاح هيبلوئيدية، لذا في خليته يوجد أليل وإحد فقط من الأليلين - 51 أو 52. إذا سقطت حبيبة لقاح على ميسم (خلاياه ديبلوئيدية)، وأحد الأليلات في نوى الخَلايا مماثل للأليل في حبيبة اللقاح، فإنّ حبيبة اللقاح لا تنبت. لكن إذا كان في نواة خلية خلايا الميسم أليلات مختلفة، مثلا: S3 و S4, ، فإنّ حبيبة اللقاح تنبت. هذا هو أحد الآليات التي تحدد فيها الشحنة الوراثية ما إذا تنبت أو لا تنبت حبيبات اللقاح.



👔 سؤال ح -13

تعرفتم حتى الآن على آليتين للتعارف:

- 1. تعارف بين الميسم وحبيبات اللقاح من نفس النوع (species)، الذي يضمن أن تنبت على الميسم فقط حبيبات لقاح من أفراد من نفس النوع.
 - 2. آلية "عدم الملاءمة الذاتية" التي تمنع تلقيح ذاتي في نفس الفرد.
- أ. أي آلية أخرى (في الحيوانات)، معروفة لكمّ، تعتمد على التعارف بين الذاتي وغير الذاتي؟ ما هي الآلية؟ ما هو الفرق بينه وبين آلية "عدم الملاءمة الذاتية" في النباتات؟ ب.ما هي الأفضلية للفرد التي تنبع من الآلية 1؟


ح4.2 الإخصاب

تنتهي عملية التلقيح، كها ذكرنا، عندما تصل حبيبات اللقاح الميسم. لكن التلقيح لا يؤدي بالضرورة إلى التقاء بين الخلايا التناسلية وإلى إخصاب. الشرط الأول لاستمرار عملية التكاثر هو إنتاج علاقة بين حبيبات التلقيح والميسم. لذا يجب عليهم أنْ "يتعرفوا" على بعض - أنْ يَميِّزوا أنهم من نفس النوع (species). فقط في حبيبات اللقاح من نفس النوع يوجد ملاءمة في المبنى وملاءمة بيوكيميائية بين المواد في جدار حبيبات اللقاح ونسيج الميسم. في نباتات كثيرة، رد الفعل لسقوط حبيبات اللقاح "المعروفة" للميسم، فإن الميسم يُفرز سائل يساعد على استيعاب حبيبات اللقاح وإنباتها.

بتأثير المواد التي تُفرز من الميسم، تنمو שלוחה مغلفة بغشاء من داخل فتحة حبيبة اللقاح إلى داخل نسيج الميسم. هذه ال نسمِّيها נחשון. يفرز ال הנחשון إنبات حبيبة للتاع وهكذا يشق طريقه داخل للقاح مسم

إبريمات تديب انسجه المناع وهكدا يسو قلم المتاع (الرسمة ح - 16).

أثناء نحوه يتغذى ال הנחשון من مواد في نسيج قلم المتاع. في الواقع، يمكن أن تنبت عدة حبيبات على الميسم وتنبت عدة دחשונים، تنمو وتصل المبيض. في المبيض الذي توجد فيه عدة بويضات، يصل داسا واحد إلى كل بويضة. ينبع من هذا الوصف أن ليس كل حبيبات اللقاح التي تهبط على الميسم وتنمو من كل منها داسا تنجح، في نهاية العملية، في الوصول إلى أن أحد الخلايا التناسلية في ال בداسا يتحد مع النواة في خلية البويضة، حتى لو كانت من نفس النوع (species).



الرسمة ح -16: إنبات حبيبة لقاح


كما هو الأمر في الإخصاب الذي يتم في التكاثر

التزاوجي عند الحيوانات، في الإخصاب عند النباتات أيضًا، تتحد خليتيْ تناسل مختلفة ويَنْتُج زيجوت (لاقحة) ديبلوئيد يتطور منه الجنين. لكن في النباتات تكون عملية الإخصاب معقدة أكثر بقليل من عملية الإخصاب في الحيوانات.

كما ذكرنا، في حبيبة اللقاح يوجد خليتان هيبلوئيديتان (الرسمة ح -10). خلال إنبات كل حبيبة لقاح، تنقسم إحدى الخلايا بالميتوزا وتَنْتُج خليتين هيبلوئيديتين هما خليتان تناسليتان ذكريتان. خلية أخرى هي خلية ال הנחשון، وهي التي تنقل نهو ال הנחשון إلى البويضة في المبيض. تصل خلايا تناسلية بواسطة ال הנחשון من حبيبة اللقاح التي سقطت ونبتت على الميسم إلى الخلية التناسلية الأنثوية في البويضة، داخل المبيض، وهناك يحدث الإخصاب.

للمزيد عن

مبادئ في التكاثر التزاوجي (لا تصل جميع الخلايا التناسلية الذكرية إلى إخصاب)، في الفصل الثالث، صفحة 49. في الإخصاب، تتحد نواة إحدى الخلايا التناسلية الذكرية مع نواة خلية البويضة ويَنتُج زيجوت ديبلوئيدي يتطور منه الجنين. تتحد نواة الخلية التناسلية الذكرية مع نواتين هيبلوئيديتين إضافيتين في مركز البويضة (الرسمة ح-17) وهكذا تَنْتُج خلية في نواتها ثلاث هيئات من الكروموسومات (نواة تريبلوئيدية 3n). تنقسم هذه الخلية بالميتوزا ويتطور نسيج الإندوسبيرم الذي تُخزَّن فيه مواد إدخارية تُستعمل لتغذية الجنين خلال تطور البذرة ولتغذية البادرة في بداية تطورها. عملية الإخصاب مضاعف (الرسمة ح -17).



الرسمة ح -17: إخصاب مضاعف في نباتات كاسيات البذور. على اليمين: ينمو ال הנחשון باتجاه البويضة. على اليسار: إخصاب (اتحاد نوى).

انتبهوا! نسب الكبر غير دقيقة: في الواقع، حبيبات اللقاح صغيرة جدًا بالمقارنة مع الأعضاء الأخرى في الزهرة. تصف الرسمة المتاع فقط من دون باقي أقسام الزهرة. في النوع الموصوف في الرسمة، توجد في المبيض بويضة واحدة فقط.

إلتقاء الخلايا التناسلية وعملية الإخصاب اللذان وصفناهما الآن، يحدثان في بيئة محيطة رطبة ومحمية من الجفاف. هذه عملية إخصاب داخلي تميِّز الكائنات الحية الي تعيش على اليابسة. في أعقاب الإخصاب، تتطور البذرة، والمبيض ذاته يتطور إلى ثمرة في داخلها بذور.

بعد الإخصاب، تذبل الأسدية، الميسم وقلم المتاع. في نباتات كثيرة، يذبل الغلاف الزهري ويتساقط أيضًا.



من زهرة إلى ڠرة: نبتة خيار مع زهرة وڠرة تبدو عليها بقايا أوراق التويج.

لا "تحظى" جميع الأزهار في التلقيح ولا تتطور ثمار في جميعها. تتساقط أزهار كثيرة قبل أن تُلقح بسبب صقيع أو رياح قوية. تتساقط أزهار أخرى بعد تلقيحها وحتى بعد تخصيبها بسبب كمية الموارد المحدودة في النبتة. فقط الأزهار التي بقيت على قيد الحياة في شروط البيئة المحيطة، وتمَّ تلقيحها بحبيات لقاح ملائمة وخُصبت - تتطور فيها ثمار مع بذور. تُبذل طاقة كثيرة في إنتاج الثمار والبذور التي في داخلها والتي هي في الواقع "جيل المستقبل".

👣 سؤال ح -14

أ. ماذا تتشابه وماذا تختلف حبيبات اللقاح في النبات والخلايا المنوية في الحيوان؟ ب. ماذا تختلف حبيبات اللقاح عن الخلايا التناسلية الذكرية في النبات؟

15- سؤال ح

لإنتاج الثمرة والبذور التي في داخله، يوجد عدة شركاء كما هو موصوف في الجدول الآتي. انسخوا الجدول وأكملوا في العمود الفارغ المصدر الوراثي لكل ناتج من نواتج الإخصاب في أعقاب التلقيح الغريب.

مصدر المادة الوراثية	يتطور من	القسم في الثمرة أو البذرة
	الزيجوت	الجنين
	نواة تريبلوئيدية	الإندوسبيرم
	مبيض (وأحيانًا أقسام أخرى للزهرة)	أنسجة الثمرة وقشرتها


ح 3. من الزيجوت إلى الجنين

ح 1.3 تطور الجنين: جنين، إندوسبيرم وفلقات

الزيجوت - الخلية الديبلوئيدية التي تَنْتُج في الإخصاب - ينقسم إلى خليتين ابنتين وهما تستمران في الإنقسام (انقسامات ميتوزا). بعد انقسامات كثيرة، يَنْتُج جنين مكن أن مَيِّز فيه بسويق وفي بداية جذر - جُذير (الرسمة ح -18).



بذرة فاصولياء



الرسمة ح-18: رسم تخطيطي لمبنى البذرة

على اليمين: بذرة فاصولياء (ثنائية الفلقة) فيها جنين يشمل فلقتان كبيرتان، سويق وجُذير. على اليسار: مقطع في بذرة قمح (أحادية الفلقة) فيها جنين يشمل فلقة صغيرة واحدة، سويق وجُذير وبالإضافة

يحتاج تطور الجنين إلى مواد لاستخراج الطاقة ولبناء خلايا. يتم تزويدها إلى الجنين المتطور من نبتة الأم بواسطة حامل الجنين الذي هو عبارة عن مجموعة خلايا تربط بين الجنين الذي يتطور وبين أنسجة نبات نبتة الأم. في أعقاب الإخصاب يتطور كما ذكرنا الإندوسبيرم أيضًا. تُخزَّن في الإندوسبيرم كربوهيدرات، دهنيات وبروتينات يستخدمها الجنين الذي يتطور، وبعد الإنبات تستخدمها البادرة حديثة السن، حتى تُنْتج بذاتها المواد التي تحتاجها بعملية التركيب الضوئي.

الخلية - مبنى وأداء: المواد الإدخارية الموجودة في البدرة لا تذةب، لذا لا تؤثر على التركيز الأسموزي في الخلآيا.



بذور البقوليات

يوجد نباتات مثل عائلة البقوليات (بازيلاء، فاصولياء، فستق) التي تُنقل فيها المواد الموجودة في الإندوسبيرم خلال تطور الجنين إلى الأوراق الأولى للجنين - فلقات وتُخزَّن هناك. في البذرة البالغة لهذه العاءلة لا يوجد اندوسبيرم. في نباتات أخرى، مثل: القمح والذرة، الإندوسبيرم هو المزوِّد المباشر للمواد المطلوبة بتطور البادرة. المواد في الإندوسبيرم والفلقات هي مساهمة جيل الوالدين في الجيل القادم وبذل "جهدهم" في ضمان نجاحهم. يستعملها النبات الحديث السن مدة زمنية طويلة بعد انفصاله عن

مواد التغذية "المرزومة" في البذرة مع الجنين، أعدّت في الواقع لاستعمال النبات المتطور، لكن آخرون يستمتعون بها: تشكل البذور غذاءً جيدًا ومركز لكائنات حية كثيرة من بينها الإنسان أيضًا، مثل: الأرز، القمح، البقوليات (البازيلاء، الفستق، الصويا)، الجوز واللوز التي تعتبر بذورها مكونًا مهما في غذائنا. تشكل بذور القمح مصدرًا لحوالي %80 من مجموع الغذاء الذي يُستهلك في البلاد.



省 سؤال ح -16

أ. ماذا تتشابه بيضة الزواحف والطيور وبذرة النبات؟

ب. ماذا تتشابه المشيمة في الثدييات والإندوسبيرم في البذرة وماذا يختلفان؟ اذكروا مميزًا متشابهًا ومميزين مختلفين واشرحوا.



فلقات: واحدة، اثنان أو أكثر

إحدى الوسائل لتصنيف النباتات هي عدد الفلقات التي مّيِّز الجنين والنبات الحديث السن في بداية تطوره. يوجد نباتات ذات فلقة واحدة نسمِّيها أحادية الفلقة، مثل: القمح والذرة، ويوجد نباتات ذات فلقتين - ثنائية الفلقة، مثل: الفاصولياء، الفستق، الأفوكادو والبندورة. القسم الذي يُؤكل في الفستق هما فلقتى الجنين. يوجد نباتات أيضًا عدد فلقاتها أكثر من اثنتين، فهذه النباتات متعددة الفلقات ك האורן. في كثير من الأحيان، شكل الفلقات يختلف عن شكل أوراق النبات البالغ.

تطور أجنة دون إخصاب

في القرن الـ 19، ميَّزوا أن هناك نباتات تُنْتج كمية هائلة من البذور دون تلقيح أو إخصاب! هذا هو في الواقع شكل خاص للتكاثر العذري. الجنين ديبلوئيد ويتطور من خلايا البويضة التي لم مّر ميوزا. بهذه الطريقة من التكاثر، تُحفظ أفضليات انتشار النوع بواسطة بذور بالإضافة إلى أفضليات التكاثر التزاوجي. هذه الظاهرة ليست نادرة، وقد شُوهدت في السحلبيات وفي أنواع الحمضيات وأيضًا في أنواع من عائلة המורכבים (סביון). الأنواع التي تتكاثر بهذه الطريقة، توجد لها أفضلية في بيوت التنمية التي فيها احتمال التلقيح بواسطة الحشرات قليل، على سبيل المثال، في قمم الجبال التي تهب فيها رياح قوية وفي مناطق مناخها بارد جدًا. معظم الأنواع التي تتكاثر بهذه الطريقة، تتكاثر بطريقة التكاثر التزاوجي أيضًا.

ح 2.3 البذور: حماية الأجنة وملاءمة للانتشار

تكمن البذور في داخلها قدرة الجيل القادم، يوجد فيها مباني وآليات تطورت خلال ا**لنشوء والارتقاء** وتُستعمل لحماية الأجنة ولنجاح تأسيس النبات الحديث السن بعد الإنبات.

حماية الأجنة في النباتات مهمة جدًا، لأنه عكس الحيوانات، في النباتات الانتقال من جنين إلى كائن حي مستقل، يستمر في النمو والتطور لإنتاج البالغ، غير متواصل بل متقطع. تُتيح البذرة للجنين أن يعيش في ظروف بيئة محيطة، لا يستطيع النبات البالغ أن يعيش فيها بتاتًا. مثلًا: النباتات الحولية في بلادنا، تمر فترة الصيف الجاف كبذور وهكذا "تتملص" من ظروف البيئة المحيطة الصعبة. في الفترة الزمنية التي تمر من نضوج الثمار وحتى الإنبات، تتعرض البذور لإصابات مختلفة: إصابات آلية، مثل: التآكل وأسنان الحيوانات، ضرر من حوامض ومواد أخرى في الجهاز الهضمي للحيوانات (التي تأكل الثمرة التي تحتوي على البذور) وإصابة بواسطة الفطريات. أحيانًا، تنبت البذرة بعد مرور مدة زمنية كبيرة على تتتعرف البادرة المواد الإدخارية المخزونة في البذرة في بداية تطورها حتى المرحلة التي تتطور فيها أوراق تستغل البادرة المواد الإدخارية المخزونة في البذرة في بداية تطورها حتى المرحلة التي تتطور فيها أوراق وتنتُج فيها مواد عضوية في عملية التركيب الضوئي.

علاقة بموضوع

علم البيئة: دورة حياة النباتات الحولية - ملاءمة لظروف مناخ فصول سنة تختلف عن بعضها بشكل كبير جدًا.

ح 3.3 ثمار: حماية بذور وأيضًا انتشارها إلى أماكن بعيدة

الثمرة هي قسم من النبتة التي تتطور من مبيض الزهرة، عادةً في أعقاب الإحصاب. المرحلة الأولى في تطور الثمرة نسميها بروسة. هذه مرحلة حساسة في تطور الثمرة. لا تتطور الثمرة في جميع الأزهار والنسبة المئوية لل החנטה هو معطى مهم جدًا لمزارعي الثمار.

يمكن أن تحتوي الثمرة على بذرة واحدة (أفوكادو ومشمش) أو عدة بذور (تفاح، بندورة، بازيلاء، فلفل، رمان) (الرسمة ح -19) وفقًا لعدد البويضات التي كانت في المبيض والتي خُصبت.



חנטים ליידה סולנום שעיר







الرسمة ح -19: ڠرة مع بذرة واحدة - أفوكادو، ڠار مع بذور كثيرة - رمان وفلفل

انتبهوا! حسب هذا التعريف، الأشياء التي نسمِّيها في حياتنا اليومية "خضروات"، مثل: البندورة، الخيار، الفلفل والباذنجان هي هُار أيضما في مفهوم علم النبات ومن ناحية ادائها في دورة حياة النبات.

جدير بالمعرفة

ذوات البذور: مع ثار ودون ثار

بدأ تطور النباتات كاسيات البذور التي بذورها محمية داخ ثمرة قبل حوالي 145 مليون سنة. من ناحية النشوء والارتقاء، كاسيات البذور سبقت نباتات عاريات البذور، مثل: אורן والسرو اللذان بذورهما مكشوفة بين קשקשי האצטרובלים ولا يوجد لها ثمار بتاتًا.

في أعقاب الإخصاب، الأنسجة التي سوف تتطور إلى ثمرة عصيرية، يكبر حجمها وتمتلئ بالماء والمواد مثل السكر. أحيانًا يتغيَّر اللون أيضًا مع نضوج الثمرة والبذور التي في داخلها. هذه المباني التي تمتلئ بالمواد المغذية والذيذة، تحوَّل البذرة والثمرة إلى غذائين مفضلين لحيوانات كثيرة ومن ضمنها الإنسان. يمكن أنْ نفكر أنَّ أكل الثمار فيه سيئة للنبتة، لكن هذه الصفات للثمار تُشكِّل ملاءمة لإنتشار البذور، كما يمكن أن نلاحظ في الجدول ح-1.







الرسمة ح -20: ملاءمات مختلفة لانتشار البذور من اليمين إلى اليسار: ملاءمة لانتشار البذور لأماكن بعيدة - ירוקת החמור (رسم تخطيطي وصورة), ملاءمة لانتشار البذور بواسطة الرياح - זקן הסב, ملاءمة لانتشار البذور بواسطة الحيوانات - עוזרר

يوجد أنواع نباتات، تنتشر كل ثمارها إلى مكان بعيد، لذا تُستعمل الثمرة وحدة انتشار للنبات. هكذا الأمر مع معظم الثمار العصيرية التي تأكلها العصافير وحيوانات أخرى (مثلًا: وردر المرادر) والثمار التي يوجد لها ورود الها والتحق بفراء الحيوانات (مثلًا: «موهرا). في أنواع أخرى، تفتح الثمرة والبذور تتساقط من داخلها، وهي التي يتم نشرها إلى أماكن بعيدة وتشكِّ

في أنواع أخرى، تفتح الثمرة والبذور تتساقط من داخلها، وهي التي يتم نشرها إلى أماكن بعيدة وتشكل وحدة الإنتشار.

جدول ح -3: صفات ثمار وبذور وملاءمتها للانتشار

ملاءمة ل	مثال	الصفة/مبنى الثمرة أو البذرة
يتم الانتشار بواسطة حيوانات تتغذى من القسم العصيري وتترك البذور أو تفرزها في البراز من دون أن تمس بقدرتها على الإنبات.	مشمش، أفوكادو، بندورة، , עוזרר	څرة عصيرية، حلوة ولينة
الانتشار إلى أماكن بعيدة مع النضوج	ירוקת החמור, כליל החורש	تفتح الثمرة ("انفجار")
توقيت الإنبات إلى موسم المطر	ריסן דק	تفتح الثمرة بعد أن تصبح رطبة فقط
الانتشار إلى أماكن بعيدة بواسطة حيوانات لا تأكل البذور	אספסת	ثمرة لها إضافات تلتصق بفرو الحيوانات
الانتشار بواسطة الرياح	סביון	הקה أو بذرة لها ציצת شعر
الانتشار بواسطة الرياح	הרדוף הנחלים	څرة لها شعر
الانتشار بواسطة الماء	חבצלת החוף	بذرة لها قشرة اسفنجية



יגפר הרדוף



هار חבצלת החוף في داخلها بذور

جدير بالمعرفة

براءة اختراع من الطبيعة

إحدى الإختراعات المستعملة في حياتنا اليومية هي الأشرطة اللاصقة ("سكوتش") التي تُستعمل لإغلاق الحذاء، الحقائب وغير ذلك. أُخذت الفكرة التي تعتمد عليها براءة الاختراع من الطبيعة مباشرةً. "شريط" مع עם קרסים או לולאות (مثل الثمار) تلتصق بقوة "لشريط" فرو (مثلًا: الحيوانات) كما نرى في ثمار ال הלכיד أو ال האספסת التي تلتصق بالجوارب.




أشرطة لاصقة (سكوتش)



אספסת

لم يسألني أحد، ما إذا أنا مستعد للنقل ... يستغلوني للنشر من دون أن يطلبوا مني إذن



سورى ع رَّدُ تبذل نبتة الأُم مواد وطاقة في ڠرة عصيرية كبيرة، الجنين أو نبتة الأُم لا "يفوزان" باستعمالها. ما هي الأفضلية للنبتة أنه يوجد لها ڠرة تؤكل وعصيرية؟



سؤال ح -18

أ. البذور والثمار هي وسائل لإنتشار الجيل القادم للنبات إلى أماكن بعيدة. اذكروا حسنة واحدة وسبئة واحدة للإنتشار إلى أماكن بعيدة بالمقارنة مع الإنتشار إلى مكان مجاور تنمو فيه نبتة الأم.

ب. يوجد بذور تنبت فقط بَعد أن تأكل الحيوانات الثمرة وتفرزها في البراز. ما هو نوع العلاقة المتبادلة الموصوفة هنا؟ اشرحوا.



هار عدمة البذور

يوجد حالات تتطور فيها ثمار عديمة البذور، هذه الظاهرة نسمِّيها وحمرنام وهنه البذور، هذه الظاهرة نسمِّيها وحمرنام البذور، هذه الخاهرة وعدى وجمع البذور، هذه الخاهرة وعدى والمحتود والمح





الرسمة ح -21: ثمار عديمة البذور: بطيخ، موز وأفرسمون

تتطور ثمار ال פרתנוקרפיים (الرسمة ح -21) عندما يحدث انفصال بين تطور الثمرة وبين تطور البذور. يوجد نباتات يتطور فيها مبيض الزهرة إلى ثمرة بعد الإخصاب، على الرغم من توقف تطور البذور. في نباتات أخرى، يمكن أن تتطور ثمرة في أعقاب التلقيح، حتى لو لم يتم بعدها إخصاب. يوجد حتى نباتات يتطور فيها المبيض إلى ثمرة من دون تلقيح أيضًا.

لا يوجد في الطبيعة نباتات تُنْتِج ثمار فقط دون بذور، ومن الواضح أن هذه النباتات لا توجد لها استمرارية. تمَّت رعاية معظم الثمار التي ينقصها بذور ونأكلها على يد مزارعون بسبب قيمتها الإقتصادية وهم يكثرونها بطرية التكاثر غير التزاوجي. أمثلة لثمار פרתנוקרפים هي الموز، الأنناس، أصناف معينة من البطيخ، أصناف معينة من ثمار الحمضيات والعنب. في أنواع معينة، يحكن أن نؤدي إلى تطور ثمار دون إخصاب بواسطة المعالجة بالهرمونات النباتية مثل الأوكسين، وهكذا يتم في تنمية النباتات الزراعية المختلفة.



שות פרתנוקרפיים


في نبات معين من عائلة ال הסוככיים (قريب عائلة "الجزر الأبيض")، تشتمل النورة على ثمار عديمة البذور إلى جانب ثمار ذات بذور. الثمار "الفارغة" لا تختلف بلونها وشكلها عن الثمار التي يوجد فيها بذور.

في البحث الذي أجرى في الولايات المتحدة، تمَّ فحص الفرضية الآتية:

يساهم وجود ثمار هدروروس في ازدياد احتمال بقاء النبات على قيد الحياة وفي إنجاب دور جديد، لأن ذلك يقلل من نسبة الثمار ذات البذور التي تأكلها يرقات الفراش التي تتغذى على ثمار النبتة.

في التجربة التي أجراها الباحثون، جمعوا 30 ثمرة مع بذور و 30 ثمرة من دون بذور. خُلطت الثمار ووُضعت في صحن. أُضيفت 5 يرقات إلى كل صحن. خلال التجربة التي استمرت 15 ساعة، تمَّ عدَّ الثمار التي بقيت في الصحن 12 مرة.

كرروا التجربة 4 مرات، وقد عُرضت النتائج التي حصلوا عليها في إحدى التجار في الرسمة ح - 22.



الرسمة ح -22: عدد الثمار التي بقيت بعد مرور 15 ساعة بوجود يرقات الفراش

أ. صفوا المكتشفات المعروضة في الرسم البياني.

ب. ماذا يمكن الاستنتاج من المكتشفات حول الغذاء المفضل لدى اليرقات؟

كشفت فحوصات المقارنة التي أُجريت على الثمار عن مكتشفين:

القيمة الغذائية للثمار مع البذور أعلى من الثمار: فهي تحتوي على كميات أكبر من الكربة هيدرات والبرونينات.

تحتوي الثمار مع البذور على تركيز أعلى من المواد السامة لليرقات.

ب. كيف يمكن الاعتماد على هذين المكتشقين، كي نشرح المثكتشفات المعروضة في الرسم البياني؟ اشرحوا.

ت. هل تدعم نتائج التجربة والفحوصات فرضية الباحثون؟

ح4. من بذرة إلى نبتة


ح1.4 الإنبات

مرحلة الإنبات هي مرحلة مهمة جدًا في تكاثر النبات. معظم البذور لا تنبت مباشرة مع نضوجها، بل تكون في سبات لمدة زمنية معينة. يتميز السبات بمحتوى ماء منخفض في البذرة وبعمليات أيضية منخفضة جدًا. تطورت خلال النشوء والارتقاء آليات ووسائل هدفها أن تضمن حدوث الإنبات في ظروف مثلى، لأن الظروف السائدة أثناء نهوض البذرة من سباتها والبدء بالإنبات هي التي تحدد بمدى كبير نجاح الجيل الجديد.

إحدى العلامات الأولى للإنبات هي انفجار غلاف البذرة وبزوغ الجُذير والسويق (الرسمة ح-23). في بذور البقوليات، مثل: الفاصولياء، العدس والحمص، يخرج الجُذير بعد مرور يوم أو يومين. هناك ظاهرة مثيرة الاهتمام وسهلة التمييز في البذور التي تنبت وهي أن الجُذير ينمو باتجاة التربة، أما السويق والسيقان الحديثة السن، فإنها تنمو باتجاه معاكس. بينت التجارب أن السويقات تنمو إلى أعلى دامًا، أما الجُذير ينبت إلى أسفل دامًا، وذلك أيضًا إذا وضعنا البذرة بشكل معكوس. توجيه هذه الإتجاهات في أما الجُذير وال הمتلاح هي نتيجة نشاط الهورمونات التي تنظم النمو (انظروا الجدول ح -4 فيما بعد).



بادرات عدس في بداية تطورها



الرسمة ح-23: الرسمة التخطيطية - مراحل في نمو الفاصولياء

شروط ضرورية للإنبات

علاقة بموضوع الخلية - مبنى وأداء: تستهلك عملية التنفس الخلوي الهوائي أكسجين وتنطلق الحرارة خلالها.

الشرط الضروري (لكن غير كاف) للإنبات هو الماء. تحتوي البذرة على كمية قليلة جدًا في الماء، وبفضل ذلك، فإنَّ عمليات الحياة مثل التنفس الخلوي تكون بطيئة جدًا. تساعد هذه الصفة البذرة على البقاء مدة زمنية طويلة. يحفز دخول الماء العمليات الأيضية (تبادل المواد) في خلايا البذرة، ويبدأ نشاط الإنزيات بشكل نشيط جدًا. تتحلل المواد الإدخارية في الفلقات أو الإندوسبيم ومن نواتج التحليل تَنْتُج مواد جديدة. يبدأ انقسام الخلايا ونمو أعضاء البادرة. تحتاج هذه العمليات إلى طاقة متوافرة تُستخرج خلال عملية التنفس الخلوي. ويحتاج التنفس الخلوي إلى الأكسجين الذي يُعتبر الشرط الثاني للإنبات.

في هاتين العمليتين - استيعاب الماء والتنفس الخلوي - من السهل أن نشاهد ما يلي: البذور التي تبللت تتنفخ بشكل كبير جدًا بسبب استيعاب كمية ماء كثيرة، ومكن متابعة تنفسها بوسائل بسيطة (مثلًا: انبعاث ${\rm CO}_2$). يتم التعبير عن العمليات الأيضية النشطة في البذور في انبعاث الحرارة أيضًا الذي يرافق عمليات استخراج طاقة. إذا عزلنا بذور تنبت (في وعاء منعزل مثل الترموس)، فيمكن قياس ارتفاع درجة الحرارة في بيئتها المحيطة.

جدير بالمعرفة

إنبات في ظروف ينقصها أكسجين

تحتاج معظم النباتات إلى أكسجين لإنباتها. باستثناء أنواع معينة من نباتات الأرز التي تنبت في ظروف ينقصها الأكسجين في تربة يغمرها الماء. يتم استخراج الطاقة المطلوبة لتطور البادرات في هذه الأنواع بعملية التخمر التي تُستخرج فيها كمية طاقة أقل من التي نحصل عليها في عملية التنفس الخلوى الهوائي.

بالإضافة إلى تأثير الماء والأكسجين على بذور معينة، فإنَّ الضوء، أيضًا، عامل مهم في توجيه إنبات البذور. تُكسب الحساسية للضوء البذرة معلومات عن مكانها - هل البذرة موجودة في مكان فيه ظروف ضوء للإنبات والنمو أو أن البذرة موجودة في الظل (مثلًا: تحت الشجرة) أو في عمق التربة في ظروف ضوء غير مناسبة للنمو. الحاجة إلى الضوء كشرط للإنبات تُكسب النبات أفضلية، لأنها تزيد من احتمال وصول السويق الذي يتطور إلى سطح التربة ويتعرض للضوء قبل أن تُستغل كل المواد الإدخارية (التي كميتها محدودة في البذرة). من المهم التذكر أن استمرار النمو متعلق بالضوء الذي يُتيح حدوث عملية التركيب الضوئي. مع ذلك، بقاء البذور في الطبقات العليا للتربة يُشكّل خطرًا على البادرات التي تنمو في بيوت تنمية تجف فيها الطبقة العليا للتربة بسرعة أو أنها غير ثابتة مثل الرمال المتنقلة.

أطوال أمواج الضوء أيضًا، يوجد لها تأثير على الإنبات، وفي هذه العملية تشترك الصبغية فيتوكروم. وُجد أن هناك بذور تنبت فقط عندما نضيئها بأطوال أمواج الضوء الأحمر (حوالي 660 نانومتر)، ويُثبط إنباتها عندما نعرضها لضوء طول موجته حمراء - بعيدة (فوق 700 نانومتر).

للمزيد عن

الفيتوكروم والإزهار، انظروا صفحة 116.

ما هي الأفضلية للبذور التي تنبت في الضوءالأحمر فقط؟

في غابة كثيفة، يتم ابتلاع معظم الضوء الأحمر بواسطة الكلوروفيل الموجود في الأوراق، وهو لا يصل البذور التي تقع فوق سطح التربة. طالما الأشجار تحمل أوراقًا، فإنَّ البذور تتعرض إلى الضوء الأحمر البعيد أكثر من الضوء الأحمر وهي لا تنبت. بعد أن تتساقط الأوراق أو بعد احتراق الأشجار أو سقوطها في الغابة، تدخل جميع أطوال الأمواج حتى تلربة الغابة وتتشكَّل شروط إضاءة مطلوبة للإنبات ولتثبيت النبات الحديث السن في تربة الغابة.

من المهم أن نعرف أنه إلى جانب البذور التي يتأثر إنباتها من الضوء، يوجد أيضًا بذور كثيرة إنباتها لا يتأثر من الضوء بتاتًا.


في كل حالة، توجد للضوء أهمية في تطور البادرات الحديثة السن، سواءً كانت بحاجة إلى الضوء للإنبات ذاته أو لم تكن بحاجة إليه.

بذور مشمش ومانجو ذات

قشرة قاسية

آلبات تأخبل الإنبات

تستطيع البذور أن تنبت بعد مرور زمن طويل أيضًا، شهور أو سنوات، منذ إنتاجها وبعيدًا جدًا عن نبتة الأم أيضًا. في النباتات الحولية، يتم الإنبات بعد موت نبتة الأم. في ظروف بيئة محيطة مناسبة أيضًا، يمكن تثبيط الإنبات بسبب عوامل مختلفة، مثل: قشرة قاسية ومواد تُثبط الإنبات موجودة في الثمرة أو البذرة.



آلية أُخرى تُثبط الإنبات هي مواد لتثبيط الإنبات موجودة في الثمرة أو البذرة. أحد الأمثلة الأولى التي اكتُشفت فيه هذه الآلية هو غرة البندورة. البذور موجودة داخل الثمرة في ظروف بيئة محيطة رطبة وعلى ما يبدو سهلة للإنبات، لكن على الرغم من ذلك فإنها لا تنبت. اتضح أن عصير البندورة يحتوى على مواد تُثبط إنبات بذور البندورة وبذور أخرى أيضًا.

يوجد أنواع نباتات بذورها لا تنبت إلا بعد أن بقيت فترة معينة في درجة حرارة عالية، ويوجد أنواع نباتات أخرى بذورها تنبت فقط بعد أن تتعرض إلى درجة حرارة منخفضة.



🐒 سؤال ح -19

ما هي الأفضلية للنبتة من تثبيط الإنبات؟ اشرحوا.



و الله ع -20 سؤال

تحتاج بذور النباتات التي تنمو في مناطق فيها الشتاء بارد جدًا للبقاء مدة زمنية متواصلة في البرد قبل أن تنبت. ما هي الأفضلية التي تكسبها هذه الصفة لهذه النباتات في المناطق التي تنمو فيها؟ اشرحوا.

هورمونات في الإنبات

توجد للهورمونات أهمية كبيرة في مراقبة عمليات تطور النباتات ومن بينها عمليات الإنبات. يلخص الجدول ح-4 التأثيرات الأساسية للهورمونات التي تنظم النمو على الإنبات.

جدول ح-4: أمثلة لتأثير هورمونات في النبتة على الإنبات وعلى نهو البادرة


الهورمون	تأثيره في عمليات الإنبات وفي بداية نجو البادرة
أوكسين	يوجُّه نمو السويق إلى الضوء ونمو الجذور باتجاه عكسي لإتجاه الضوء.
جبريلين	ينشِّط بناء إنزهات تُحلِّل النشا (إحدى المواد الإدخارية في البذرة)، يحفز الإنبات.
חומצה אבציסית	يؤدي إلى دخول البذور إلى سبات ويثبط النهوض من السبات.
سيتوكنين	يحفز انقسام الخلايا وتمايزها إلى أنسجة.

ح2.4 النمو

كما ذكرنا سابقًا، يمكن أن نلاحظ سويق يتطور إلى ساق وأوراق وجُذير يتطور إلى جذر. بعد أن تتثبت البادرة الحديثة السن في التربة وتبدأ حياتها كنبات مستقل تستمر فيها عمليات انقسام الخلايا، تعاين إلى أنسجة وأعضاء وغو. وبذلك لا يوجد فرق بين النباتات وكائنات حية متعددة الخلايا التي فيها التمايز هو مميِّز مهم للتطور والنمو أيضًا.

تنمو وتتطور النباتات بشكل خاص، لأنه في أطراف الغصون والجذور يستمر إنتاج ووجود مريستيهات (الرسمة ح-3) - أنسجة خلايا لم تتمايز حتى الآن، يستمر منها تطور الأعضاء المختلفة بشكل متواصل، من ضمنها الأعضاء التناسلية. في النباتات متعددة السنوات تُحفظ هذه القدرة طيلة حية النبات، ومن هذه الناحية فهو لا يهرم (على الرغم من أقسام منه تهرم، تتساقط وتموت). ومع ذلك، الأشجار التي تعيش سنوات طويلة تموت أيضًا بسبب إصابات مختلفة (الحرائق، البرق) والأمراض. "التطور المستمر" هو صفة خاصة ومهمة للنباتات، تميِّزها عن سائر الكائنات الحية التي فترة حياتها الزمنية محددة بحسب برنامجها الوراثي.

بالإضافة إلى المريستيمات القممية، يوجد في النبتة مريستمة مهمة إضافية - الكامبيوم. يظهر الكامبيوم على شكل حلقة دقيقة من الخلايا المريستيماتية حول السيقان والغصون (الرسمة ح - 24). تتطور من خلايا الكامبيوم خلايا أنابيب النقل التي تُنقل فيها المواد في النبتة: تُنقل نواتج عملية التركيب الضوئي من الأوراق إلى سائر أقسام النبتة، والماء والأملاح المعدنية المستوعبة من التربة تُنقل من الجذور إلى أقسام النبتة العلوية. عكن أن نلاحظ في المقطع العرضي للساق حُزم مرتبة فيها معًا أنابيب جهاز (نظام) النقل.



الرسمة ح -24: كامبيوم وحزمة أنابيب نقل مقطع عرضي للساق

على مرّ السنين، تُضاف المزيد من طبقات أنسجة النقل إلى داخل الساق، ويثخن الساق ويصبح أكثر خشبًا. في النباتات التي تعيش سنوات كثيرة، يساهم الكامبيوم في ثخانة الجذع وإنتاج حلقات سنوية (الرسمة ح - 25).

تساهم المريستيمات الرأسية والكامبيوم معًا في نمو النبات للارتفاع، في تفرع الفروع والجذور وفي ثخانة السويق والجذع.

جدير بالمعرفة

حلقات سنوية

في المناطق المعتدلة التي يتغيَّر فيها المناخ حسب فصول السنة، تتغيَّر وتيرة انقسام خلايا النباتات مع تغيُّر فصول السنة: تكون نشطة في فصول النمو التي يكون فيها توافر الماء عالي وظروف درجة الحرارة والضوء مريحة، وتكون بطيئة في الفصول التي تتساقط فيها أوراق الشجرة أو عندما يكون نموها بطيء. يمكن أن نرى التغييرات في وتيرة انقسام خلايا الكامبيوم في مقطع

عرضي لجذع الشجرة كحلقات. هذه هي الحلقات السنوية (الرسمة ح - 25). قمثل كل حلقة أنابيب نقل تطورت خلال فصل واحد من النشاط. يُستعمل عدد الحلقات السنوية كتقدير دقيق جدًا لسن الشجرة. يُستعمل عرض كل حلقة كدليل للظروف التي كانت سائدة في تلك السنة. في سنة القحط يكون عرض الحلقة أصغر من عرض الحلقة أصغر من عرض الحلقة أو



الرسمة ح-25: حلقات سنوية في جذع شجرة مقطوع

ح5. جوانب النشوء والارتقاء في التكاثر التزاوجي للنباتات



أشنات وسرخسيات

التناسلية عند الحيوانات. النباتات البسيطة، مثل: الأشنات والسرخسيات لا يوجد لها بذور وهي تستطيع أن تتكاثر في تكاثر تزاوجي في بيئة محيطة رطبة أو مائية. يوجد لخلاياها التناسلية الذكرية أسواط وهي تتحرك في الماء إلى الخلية التناسلية الأنثوية الثابتة في مكانها. الجنين الذي يتطور في أعقاب الإخصاب، لا يكون "مرزوم" ومحمي في بذرة، لذا يتعرض إلى خطر الجفاف. فلا عجب في أن الأشنات والسرخسيات تنمو في بيون تنمية رطبة فقط: بجانب أودية، أنقوعات وبحيرات وفي مناطق تتسافق فيها الأمطار في كل فصول السنة.

تطور آليات التكاثر التزاوجي عند النباتات خلال النشوء والارتقاء، يوجد له عدة جوانب تشبه تطور الأعضاء

النباتات عكس الحيوانات، تكون ثابتة في مكانها خلال كل حياتها، ولا تستطيع أن تبحث بشكل فعًال عن ذكر أو أنثى للتكاثر. كما رأينا، تكاثر النباتات البسيطة متعلق ببيئة محيطة مائية أو رطبة تُتيح حركة الخلايا التناسلية الذكرية إلى الخلية التناسلية الأنثوية الثابتة في مكانها. لكن في نباتات اليابسة، تطورت خلال النشوء والارتقاء وسائل لنقل الخلايا التناسلية من نبتة إلى أخرى في بيئة محيطة جافة أيضًا. الكمية الهائلة للأزهار التي يحملها كل فرد وكيات جبيبات اللقاح هي صفات تشكّل ملاءمة

علم البيئة: تكافل من نوع مشاركة.

لضمان التلقيح والإخصاب. وسائل نشر الثمار والبذورة متعلقة أيضًا بكون النبات ثابت في مكانه، لأنها تزيد من احتمال بقاء العشيرة ومن نشرها إلى ببوت تنمية إضافية.

خلال النشوء والارتقاء، تطورت علاقة متبادلة بين النباتات والحبوانات. هذا النشوء والارتقاء الذي تتطور فيه نباتات وحبوانات بالموازاة ومن خلال التأثير المتبادل، نسميها تعاون- نشوء ارتقاء. إحدى الأمثلة الرائعة للتعاون - نشوء ارتقاء هو ملاءمة مبنى الزهرة للتلقيح بواسطة الحشرات والعصافير.

مثلًا: زهرة אחירותם החורש من عائلة الفراشيات، يوجد مبنى خاص لهذه العائلة. تَنْتج أوراق التويج "قارب" يجاوره "مجذافن" ويحمل فوقه "شراع".



איור ו-26: פרח מותאם להאבקה על ידי חרקים (אחירותם החורש) מימין: לפני ההאבקה, משמאל: אחרי ההאבקה

الأسدية والمتاع موجودة داخل القارب. عندما تزور الحشرة القارب، فإنها تجلس على "القارب". يندفع القارب إلى أسفل، وينفصل "المجذفان" منه، ونتيجة لذلك، يتحرر المتاع والأسدية بقوة من داخل "القارب" وتتوزع حبيبات اللقاح على جسم الحشرة. نرى في الرسمة ح- 26 زهرة אחירותם החורש قبل وبعد زيارة الحشرة. بعد الزيارة، تنفصل المجاديف والقارب ولا تكون الأسدية والمتاع مغطاة في القارب.

> مكن أن نرى مثال آخر للملاءمة في أزهار הדבורנית من عائلة السحلبيات. أزهار ال הדבורנית تشبه أنثى النحل (ومن هنا جائ اسمها)، وهي تنشر فرومونات تجذب إليها ذكورًا. الذكور التي تصل النحلة المقلدة تحاول التزاوج معها، وخلال ذلك، تلتصق حبيبات اللقاح بجسمها وهكذا تنتقل بن الأزهار المختلفة.



דבורנית

المواضيع الأساسية في الفصل

في نباتات كثيرة، تتم طريقيتين من التكاثر: تكاثر غير تزاوجي (تكاثر خضري) وتكاثر تزاوجي (جنسي). يمكن أن يتم التكاثر غير التزاوجي دون أي علاقة بسن النبتة وبفصل السنة.

يوجد نباتات حولية تتكاثر مرة واحدة فقط في دورة حياتها، نباتات أخرى متعددة السنوات وهي تستطيع أن تتكاثر مرات كثيرة خلال دورة حياتها.

في قمم النمو في أطراف الغصون وجذور النبات وإبطي الأوراق يوجد أنسجة خاصة - مريستيمات تتطور منها جميع أعضاء النبات.

يتم التكاثر غير التزاوجي بطرق متنوعة من أعضاء فوق سطح التربة وتحتها.

التكاثر التزاوجي للنبات يشبه من حيث المبدأ التكاثر التزاوجي في كائنات حية أخرى: تلتقي الخلايا التناسلية الهيبلوئيدية (جاميتات) وتتحد إلى زيجوت ديبلوئيدي خلال الإخصاب. يتطور جنين من الزيجوت ويتطور الجنين إلى نيات جديد. تحتاج مرحلة التكاثر في النباتات (مرحلة النمو الخضرية) إلى ظروف خاصة تتأثر من عوامل داخلية ومن عوامل البيئة المحيطة.

في نباتات معينة، الإزهار متعلق بدورية ساعات الضوء والظلام ونسميه التوقيت الضوئي. أقسام الزهرة مرتَّبة عادةً بحلقات (دوائر) تشتمل على الغلاف الزهري، الأسدية و/أو المتاع. يجب أن يتم التلقيح قبل الإخصاب.

تَنتُج الخلية التناسلية الذكرية في النبات من حبيبة لقاح فقط بعد أن تنبت حبيبة اللقاح على الميسم. مبنى الزهرة، لونه ومبنى حبيبة اللقاح ملائمة لطريقة التلقيح. الأزهار التي تُلقح بواسطة الرياح تكون عادةً صغيرة وغير ملونة، والأزهار التي تُلقح بواسطة حشرات تكون كبيرة أو صغيرة مرتبة في نورة وعلى الأغلب ملونة.

في التلقيح الذاتي، حبيبات اللقاح التي تنبت على الميسم تكون من نفس الفرد. في التلقيح الغريب، تصل حبيات القاح من فرد آخر من نفس النوع (species).

تَنتُج الخلية الأولى للأندوسبيرم من اتحاد الخلية التناسلية الذكرية (هيبلوئيدية) مع نواتين هيبلوئيديتين أُخرتين في البويضة. تنقسم هذه الخلية التربلوئيدية بالميتوزا ويتطور نسيج تُخزَّن فيه المواد الإدخارية. يتطور الجنين من الزيجوت الذي نتج من إتحاد خلية البويضة مع خلية واحدة من الخلايا التناسلية الذكرية.

تُتيح البذرة لجنين النبات أن يعيش في ظروف بيئة محيطة، لا يستطيع النبات البالغ أن يعيش فيها بتاتًا. البذرة هي وسيلة النبات لنشر الجيل لجديد في الفراغ والمكان أيضًا.

تتطور الثمرة من مبيض الزهرة، عادةً في أعقاب الإخصاب.

تشكِّل صفات الثمار والبذور ملاءمة لنشر النوع.

ال פרתנוקרפיה تطور ثار عدمة البذور.

يوجد في البذور آليات، مثل: القشرة القاسية والمواد التي تثبط البذور ولا تؤدي لإنبات البذور مباشرةً. الظروف السائدة أثناء نهوض البذرة من سباتها، مثل: توافر الماء، تركيز الأكسجين، شدة الضوء ونوعه ودرجة الحرارة المناسبة، تحدد عدى كبير جدًا نجاح الجيل الجديد.

إحدى الدلالات الأولى للإنبات هي انفجار غلاف البذرة وبوزغ الجُذير والسويق.

بَعد أن تتثبت البادرة الحديثة السن في التربة، تبدأ حياتها كنبتة مستقلة.

نهو النبات وثخانته هي نتيجة لإنقسام الخلايا في الأنسجة المريستماتية القممية والكامبيوم وتمايزها. خلال نشوء وارتقاء النباتات البذرية، وكما هو الأمر في نشوء وارتقاء الأعضاء التناسلية عند

الحيوانات، تطورت أعضاء وآليات خاصة متعلقة بالملاءمة للتكاثر في بيئة محيطة جافة.



مصطلحات مهمة في الفصل

نشوء وارتقاء إنبات

أسدية إنبات حبيبة لقاح

נחשון

طول النهار براعم التكاثر

إندوسبيرم سويق

بويضة متاع/قلم المتاع

نباتات بذرية أوراق الكأس

بصل أوراق التويج

جبريلين الضوئي

حبيبة اللقاح فيتوكروم

تلقیح فلقات

تلقيح ذاتي/غريب درنة

هورمونات في النمو زهرة

التبرعم زهرة ثنائية الجنس

إخصاب زهرة أحادية الجنس

إخصاب داخلي ثمرة

ملاءمة لانتشار البذور ميسم

تایز نبات نهار طویل

زیجوت نبات نهار قصیر

זיר צוمبيوم

بذرة تزاوجى

حولية تكاثر تزاوجي

חנטה متعددة السنوات

ملقح مبيض

دورة الحياة روافد

32,99

منع التلقيح الذاتي خلايا تكاثر (جاميتات)

مریستیمات سبات بذور



الفصل السابع: تدخُّل الإنسان في عمليات تكاثر الحيوانات والنباتات

تعلَّمتم في الفصل الرابع عن التدخُّل في عمليات تكاثر الإنسان، ورأيتم في أعقاب البحث وتطور التكنولوجيا أنه يوجد اليوم اقتراحات حلول مختلفة لمشاكل في أداء الجهاز التناسلي. تُتيح هذه الحلول لأزواج لا يوجد لديهم أطفال أن يكونوا والدين لأطفال أصحاء.

نتعلم في هذا الفصل عن تدخُّل الإنسان في عمليات تكاثر النباتات والحيونات في المزرعة. يهدف هذا التدخُّل إلى تحسين نواتج المزرعة وزيادة إنتاج الغذاء وهكذا يرتفع الربح أيضًا. يوجِّه البحث في مجالات الزراعة إلى تحقيق هذه الأهداف أيضًا.

علاقة بالموضوع علم البيئة: الزراعة - تدخُّل الإ

ح1. تدخُّل الإنسان في عمليات تكاثر الحيوانات

في الطبيعة تكاثر معظم الحيوانات في موسم معين في السنة - موسم التكاثر - فيه الظروف مناسبة لنمو الأفراد. في البلاد، تتم معظم الولادة وتفيس البيض في فصل الربيع، الفصل الذي فيه كثرة غذاء ودرجات حرارة مريحة لتطور الجيل الجديد. عند حيوانات المزرعة، كما هو الأمر عند الحيوانات في الطبيعة، تتلاءم للتغييرات الموسمية: بشكل طبيعي، تستوعب معلومات من البيئة المحيطة، وتُترجم إلى إشارات بيولوجية تُحرِّك عمليات متعلقة بالتكاثر. في المزرعة، موسمية التكاثر تحدد نسبة التكاثر، كمية الناتج (مثل: البيض والحليب) والفترة الزمنية التي نحصل فيها على الناتج. يتدخل المزارعون في الآلية الهورمونالية التي تنظم تكاثر حيوانات المزرعة، كي يتغلب على المحدودية التي تفرضها موسمية التكاثر. يتم التدخُّل بواسطة تغيير العوامل البيئية المحيطة - الخارجية، مثل مدة ساعات الإضاءة ودرجة الحرارة، أو بواسطة إعطاء إضافة هورمونات. نتيجةً لهذه العمليات، تستطيع البقرات أن تتكاثر وتُدر حليبًا خلال كل السنة، وتستطيع الدجاجات أن تضع بيضًا معظم أيام السنة.

لتدخل المزارعون في عمليات تكاثر الحيوانات يوجد انعكاسات على البيئة المحيطة، وقد تكون لها انعكاسات على صحة الحيوانات، لذا التدخُّل يُثير تساؤلات أخلاقية ومعارضة عند الذين يتناولون موضوع رفاهية الحيوانات (انظروا الصفحات 150-151).

مصطلحات تدجين الحيوانات

خلال حوالي الـ 10,000 سنة التي يمارس فيها الإنسان الزراعة، قام بتنمية وتحسين حيوانات، اختار أفرادًا بحسب صفاتها وبعملية الانتخاب الإصطناعي قام بتدحين الحيوانات حسب احتياجاته. الحيوانات التي تمَّ تدجينها، لا تستطيع عادةً أن تعود وتعيش في الطبيعة، لأنها ملائمة للحياة مع الإنسان الذي يزودها احتياجاتها.



ح1.1 تنظيم نظام الإضاءة وتأثيره على تكاثر الحيوانات

دورية ساعات الإضاءة وساعات الظلام خلال اليوم (التوقيت الضوئي) هي ظاهرة طبيعية متعلقة بشكل وطيد بفصول السنة وبشروط درجات الحرارة في المواسم المختلفة. كما هو الأمر عند النباتات، عند الحيوانات أيضًا توجد وسائل لإحساس التغييرات في عدد ساعات الإضاءة. قدرة الكائنات الحية على الرد للتغييرات في عدد ساعات الإضاءة والظلام خلال اليوم نسميها التوقيت الضوئي. يُتيح تغيير عدد ساعات الإضاءة في اليوم للمزارعين أن يوجِّهوا عمليات فسيولوجية تتأثر من عوامل في البيئة المحيطة.

النضوج الجنسي المبكر للأبقار هو مثال لتطبيق المعرفة البيولوجية في المزرعة، وهو يُتيح إنتاج حليب وعجول من الأبقار في مرحلة مبكرة من حياتهن عندما نزيد في فصل الشتاء عدد ساعات الإضاءة في اليوم إلى 16 ساعة، فإننا نؤدي إلى نضوج جنسي مبكر بشهر حتى ستة أسابيع. وأيضًا العلاج الهورمونالي يُتيح تبكير النضوج الجنسي فقط، بل يؤثر أيضًا على إنتاج الحليب، على ما يبدو بواسطة ازدياد إفراز هورمونات تؤثر على إنتاج الحليب.

يؤثر طول النهار على موعد الشبق أيضًا. مثلًا: تشبق الفرس عندما يطول النهار. عند الخراف والماعز، يبدأ الشبق الطبيعي بالذات في الفترة التي يقصر فيها النهار، وهي تلد في فترة الشتاء. يمكن أن نحث الماعز والخراف على الشبق خارج موسم التكاثر الطبيعي أيضًا بواسطة إضافة إضاءة اصطناعية خلال عدة أسابيع، وبعد ذلك، تقليل عدد ساعات الإضاءة.

توجيه موعد وضع بيض الطيور والتأثير على كمية البيض

موسم الإضاءة الطبيعي للطيور في البلاد هو فصلي الربيع والصيف، لكن المزارعون معنيون في إطالة الموسم كل السنة، كي يتمكنوا من تسويق البيض كل يوم. اتضح أن عملية وضع البيض، كما هو الأمر في تبكير النضوج الجنسى، هي عملية تتأثر من طول النهار.

تتم عملية وضع البيض في الطبيعة عندما يكون عدد ساعات الإضاءة أكثر من 14 ساعة. التكبير الإصطناعي والتدريجي لعدد ساعات الإضاءة في القن إلى 16-17 ساعة في اليوم، يؤدي للدجاحة أن تبيض بيضًا أيضًا في موسم، في السنة، يكون فيه عدد ساعات الضوء الطبيعي أقل من 14 ساعة.

تقوم الهورمونات بوساطة تأثير الضوء على وضع البيض. يُنقل محفز الضوء إلى الجهاز العصبي ومن هناك إلى الغدة النخامية في مخ الدجاجة. نتيجةً لتأثير تحفيز الضوء، تفرز الغدة النخامية الهورمون FSH الذي يؤدي إلى نضوج جُريبات في المبيض، إباضة ووضع البيض. هكذا بواسطة الإضاءة الإصطناعية نؤدي للدجاجات أن تضع بيضًا خلال كل السنة. تضع الدجاجة بيضو واحدة في كل مرة والمجموع الكلي من 1-5 بيضات في الأسبوع. في الظروف المثلى تستطيع الدجاجة أن تضع بيضة كل 26 ساعة، وهذه المدة الزمنية هي الفترة الزمنية بين إباضة لإباضة أخرى.

🕵 جدير بالمعرفة

البيض المخصب، البيض غير المخصب، ووضع بيض احتياطي

في قن التكاثر الذي يعيش فيه ديوك ودجاجات، البيوض التي تُضع تكون مخصبة. ينقل المزارعون البيض إلى المفرخة وهناك تُزود بشروط مناسبة لتطور الأجنة - درجة حرارة، رطوبة وتراكيز غاز مناسبة. في القن الذي يزوِّد بيض للأكل توجد إناث فقط، لذا البيض الذي يُضع فيها غبر مخصب.

ما هو الشرح "للبذل الكبير" في البيض غير المخصب؟

عند قسم من الطيور ومن بينها الدجاج البيتي، وضع البيض متعلق بالأساس بعوامل البيئة الحيطة، مثل: طول النهار، جودة الغذاء وتوافره ووجود عُش لوضع البيض. بعد عملية الإخصاب، تنتقل خلية البويضة في أنبوب البيض حتى تصبح البيض كاملة، سواءً كانت البيضة مخصبة أو غير مخصبة. لذا أيضًا في حالة عدم وجود ديك عند إناث هذه الطيور، كما يحدث في القن المعد لوضع البيض فقط، فإن هذه الإناث تضع بيضًا. نجد ظاهرة وضع البيض غير المخصب عند طيور إضافية مثل الببغاء. يوجد أنواع طيور تحتاج إاة وجود الذكر وهو محفز ضروري لوضع البيض. هذه الطيور لا تضع بيضًا دون وجود ذكر، وبالتالي لا تضع بيضًا غير مخصب.

في قسم من الطيور معروفة ظاهرة نسمِّيها وضع بيض احتياطي. عند النسور، على سبيل المثال، عندما تشعر الأنثى أن البيضة التي وضعتها افتُرست أو سقطت من الهش، فإنها تضع بيضة أخرى. يستغل المزارعون هذه الظاهرة التي تحدث عند دجاج البيت. فهم يأخذون البيض من قن الدجاجات، وهي تبيض بيض احتياطي. وبهذه الطريقة تستمر الدجاجات في وضع البيض كل يوم

1 - مؤال ح

اليوم يُباع في الحوانيت "بيض الحرية" الذي وضعته دجاجات تنمو وتعيش في ساحة مفتوحة وليس في قن مغلق وكثيف.

أ. هل أيضًا الدجاجات التي تنمو وتعيش في الساحة تضع بيضًا في معظم أشهر السنة؟ علَّلوا. ب. لماذا، حسب رأيكم، سعر "بيض الحرية" أعلى من سعر البيض العادى؟



🚮 سؤال ح - 2

في الطبيعة، المدة الزمنية لاحتضان البيض عند الدجاجات هي 21 يومًا. خلال هذه الأيام، لا تضع الدجاجة بيضًا إضافيًّا. إذا كان الأمر كذلك، فما هي الأفضلية للمزارع عندما ينقل البيض للاحتضان في المفرخة؟

ح 2.1 التخصيب (الزرع) الإصطناعي وتزامن الشبق عند الأبقار

عند البقرات، كما هو الأمر عند إناث ثدييات أخرى، يوجد نشاط دوري لجهاز التكاثر. عند البقرات توجد دورة شبق تستمر 21 يومًا، وفي نهايتها في اليوم الـ 21، تحدث تغيُّرات فسيولوجية وسلوكية تستمر من 8-24 ساعة. هذه هي فترة الشبق التي يوجد فيها استعداد بيولوجي للبقرة على التزاوج، بعد انتهاء



للمزيد عن

دورة الشبق في الفصل الخامس، صفحات 96-97. فترة الشبق، تحدث الإباضة وتخرج خلية البويضة من المبيض.

عكن أن غيِّز فترة الشبق حسب تصرفات البقرة: إثارة تُعبر عنها في المشي الكثير، فقدان الشهية وإفراز روائح خاصة تجذب الذكور. بشكل طبيعي، تحدث فترة الشبق عند كل بقرة في موعد خاص لها، لذا في قطيع كبير تكون عدة بقرات في شبق كل يوم. المزارعون المعنيون في تخصيب البقرات يجب عليهم أن عيزوا في كل يوم البقرات الموجودة في نهاية فترة الشبق والمستعدة للتخصيب. للمساعدة في التمييز الدقيق لفترة الشبق طُوِّر جهاز البيدومتر (بيدو - خطوة، متر - مقياس) - جهاز يُعلق على رِجل البقرة ويقيس عدد خطواتها. يُشر ازدياد عدد الخطوات إلى الشبق.

يتم تخصيب البقرات اليوم بالتخصيب الإصطناعي - ادخال مباشر لخلايا منوية أُخذت من ثور يحمل صفات مرغوبة إلى الجهاز التناسلي للبقرة. يُنفِّذ التخصيب الإصطناعي شخص مهني - زراع، في البداية، يجمع سائل منوي من الذكور، وفي موعد الإباضة الذي يبدأ في نهاية فترة الشبق، فإنه يُدخل الخلايا المنوية إلى عنق رحم الإناث لتخصيب خلية البويضة.

يوجد عدة حسنات للتخصيب الإصطناعي:

- 1. استغلال ناجع للخلايا المنوية كمية الخلايا المنوية التي يقذفها الذكر في المرة الواحدة كبيرة جدًا، حوالي عشر مليارات خلية منوية. في الإخصاب الطبيعي، تدخل جميع الخلايا المنوية إلى بقرة واحدة وفي الواقع جميعها تُهدرباستثناء خلية منوية واحدة تُخصب خلية البويضة. تجميع السائل المنوي يُتيح للمزارع أن يستعمل الخلايا المنوية التي قُذفت في مرة واحدة لتخصيب ثلاث مائة حتى ألف بقرة!
- 2. فحص سلامة الخلايا المنوية قبل زرعها (التخصيب) بمساعدة فحص ميكروسكوبي، يمكن فحص تركيز الخلايا المنوية، مبناها وحركتها. إذا كانت الخلايا المنوية سليمة ونشطة، فإنه يمكن استخدامها وقت الحاحة.

ازدادت قدرة التخصيب الإصطناعي عدة أضعاف بفضل تقنيات الحفظ والتخزين في تجميد عميق في نيتروجين سائل في درجة حرارة $^{\circ}$ 196- (كما ذا كرنا في الفصل الرابع، صفحة 66). بهذه الطريقة محكن استعمال خلايا منوية لثور محسَّن خلال سنوات كثيرة.

في معظم المزارع في البلاد، يعتمد المزارعون على دورة الشبق الطبيعية، لكن يستطيع المزارعون إنتاج تزامن (توحيد الموعد) لدورة الشبق في القطيع. يتم توحيد الزمن بواسطة الهورمون بروجسترون أو بواسطة المعالجة ببروستاجلاندين وهو مادة تُفرز بشكل طبيعي وتعمل مثل الهورمون. يؤدي البروجسترون إلى إطالة مدة بقاء الجُسَيْم الأصفر والبروجسترون يقصرها. للوصول إلى توحيد موعد إفراز الهورمونات الجونادوتروبينية (التناسلية)، وللوصول إلى شبق وإباضة في نفس الموعد عند جميع البقرات، يجب معالجة جميع البقرات. يُتيح تزامن دورة الشبق في القطيع إلى تقليل عدد زيارات المزارع المخصب، وهكذا يوفر المزارع زمنًا ونقودًا، لأن المزارع المخصب يستطيع أن ينفّذ العملية لجميع البقرات في نفس الموعد.

لتزامن دورة شبق البقرات في القطيع توجد حسنة عامة:

توفير التكاليف المتعلقة بعمل المزارع المخصب وبتجميع الخلايا المنوية.

زيادة النسبة المئوية للحمل الناجح.

توجيه ولادة كل القطيع إلى نفس الموعد، وهكذا تكون معالجة العجول في نفس الوقت. تزامن الولادة إلى موسم مُريح لتنمية العجول وللتسويق المركز للعجول المعدة للحم.



🚁 سؤال ح - 3

أ. اذكروا ثلاث صفات في الأبقار، يرغب المزارعون في نقلها بالوراثة إلى الجيل القادم.

- ب. استعمال الخلايا المنوية للثور الذي تمَّ اختياره لتخصيب بقرات كثيرة هو مرحلة في عملية الانتخاب الإصطناعي. اشرحوا.
- ت. استعمال الخلايا المنوية من عدد قليل من الأفراد المفضلة يقلص التنوع الوراثي. ما الخطر في تقليص التنوع الوراثي؟ اشرحوا.

ح3.1 حث الشبق عند الأبقار

حث الشبق هي عملية تُنفِّذ عادةً للبقرات صغيرات السن التي لم تصل حتى الآن النضوج الجنسي، وللبقرات التي أنجبت الآن ومعنيون في تقصير المدة الزمنية حتى تجدد دورة الشبق. بعد الولادة، تتجدد دورة الشبق بشكل طبيعي خلال 3-2 شهور. كما هو الأمر في التزامن، في حث الشبق تُستعمل هورمونات تؤثر على الجهاز التناسلي. تُتيح المعالجة بالهورمونين بروجسترون واستروجن تبكير الولادة الأولى للبقرات الصغيرة السن وتقصير الزمن لتخصيب البقرة، التي أنجبت، مرة أخرى. إذا كان الأمر كذلك، يُتيح حث الشبق من ازدياد نسبة الولادة في القطيع.



🥌 جدير بالمعرفة

كيف تستطيع البقرات إنتاج الحليب كل سنة خلال سنوات كثيرة

كما هو الأمر عند جميع الثدييات، يبدأ إنتاج الحليب في حلمة (درة) البقرة بشكل طبيعي بعد الولادة ويستمر طالما يؤثر تحفيز رضاعة العجل. في العالم الغربي، في قطيع بقر للحليب، عادة، يفصلون العجول عن أماتهم بعد الولادة مباشرة. إذا كان الأمر كذلك، فكيف يستمر إنتاج الحليب كل السنة خلال سنوات كثيرة؟

بَعد فصل العجول، يستمر تحفيز البقرة على إفراز الحليب مساعدة تحفيز الرضاعة الإصطناعية -الحلب المتكرر من 2-3 مرات في اليوم.

بعد حوالي 60 يومًا، تتجدد دورة الشبق وعندئذ يتم تخصيب البقرة. فقط في الولادة القادمة، يتوقف الحلب بشكل مطلق (خلال الحمل ينخفض إنتاج الحليب بشكل تدريجي). بعد مرور حوالي سنة على الولادة السابقة، تلد البقرة مرة أخرى ومكن العودة لإنتاج الحليب منها.

هذا العلاج بالبقرات يزيد بشكل كبر جدًا من إنتاج حليبها ونسبة تكاثرها، لكنه يقصر طيلة حياتهن بشكل كبير جدًا.



صراع ذهني

جوانب أخلاقية لتدخُّل الإنسان في تكاثر الحيوانات

بعض الطرق التي وُصفت حول تدخّل الإنسان في تكاثر حيوانات المزرعة، أثارت معارضة عند الهيئات التي تهتم برفاهة الحيوانات. تعتمد الرعاية الجيدة لحيوانات المزرعة على المبادئ الآتية:

منع العطش، الجوع، سوء التغذية.

تقليص عدم راحة الحيوانات، مثلا: تقليل الكثافة.

منع إصابات وأمراض.

منحها إمكانية التعبير عن تصرفاتها بشكل طبيعي.

لا يشددون في جميع مزارع الحيوانات على معالجتها بشكل جيد. مع مرور الوقت، قد تحدث مشاكل مختلفة لحيوانات المزرعة، مثل:

الحلب المكثف للبقرات يزيد من تكرارية الإلتهابات في الحلمة.

تسمين الطيور للحوم والإزدياد السريع في الوزن، يرافقهما تطور مشاكل في أرجل الطيور، وهذا قد يسبب لها الآلام.

وضع البيض يوميًا يرافقه إصابة في الأعضاء التناسلية للإناث التي تضع البيض، وظواهر مثل النقص في الكالسيوم.





في معظم مزارع الحيوانات، ينمون حيوانات في ظروف تختلف بشكل كبير جدًا عن الظروف الطبيعية، كي يحققوا أقصى الإنتاج. ما هما القيمتان المتضاربتان هنا؟ اشرحوا.

ح2. تدخُّل المزارعون في عمليات تكاثر النباتات

ح 1.2 تكاثر غير تزاوجي (خضري) عند النباتات

جميع الطرق التي تُستعمل في الزراعة والبساتين للتكاثر غير التزاوجي (خضري) للنباتات تعتمد على قدرة النبات على التجدد ونمو أعضاء جديدة من أقسام النبات المختلفة، مثل: الجذور، السيقان، الأوراق والأزهار. تنبع هذه القدرة من صفتين في النبات:

في أطراف الغصون توجد قمم نمو فيها مريستيمات تتطور منها غصون جديدة تحمل أوراقًا، أزهارًا

تود للنبات القدرة على التجدد، عندما نفصل عضوًا عن النبات أو نجرحه، مكن أن تتطور من الخلايا البالغة، في مكان الإنفصال أو الجرح، نسيج خلايا غير متمايزة - كالوس. نؤدى في منبت الأنسجة بشكل اصطناعي إلى إنتاج نسيج كالوس، حيث تتطور وتتمايز منه أعضاء جديدة، مثل: الجذور والسيقان.

الأفضلية الأساسية بالتكاثر غير التزاوجي في الزراعة هي الصفات المتماثلة للأفراد التي تُتيح حفاظ على الصفات الوراثية المرغوبة للمزارعين بشكل كامل ونثلها من جيل إلى آخر. مثال على ذلك، يُكثر المزارعون أصناف العنب بتكاثر غير تزاوجي خلال مئات السنين، وهكذا يحافظون على صفات العنب الذي يُنتجون منه نبيذا جودته عالية. حسب التفصيل في جدول ح-2 (صفحة 158)، نلاحظ أن كل عضو في النبات يمكن أن يُستعمل كمصدر لنبات جديد. وأيضًا الخلايا التي تمايزت يمكن أن تنقسم وتتمايز إلى أنسجة وأعضاء. ومع ذلك، إمكانية استخدام عضو معين للتكاثر متعلق بنوع النبات. من الخبرة المتعددة السنوات للمزارعين، الباحثين والبستانيون، تراكمت معرفة كثيرة حول الطريقة المناسبة لتكاثر كل نبات.

الفسيلة هي قطعة غصن أو ورقة أُخذت من نبتة الأُم وغُرست في وسط تنمية. في ظروف مناسبة تنمو جذور من الفسيلة ويتطو إلى نبات كامل يحمل أزهارًا وثمارًا. الفسيلة مماثلة من ناحية وراثية للنبات الذي أخذ منه وهذه أفضلية للمزارع. ليس كل نوع نبات مكن إكثاره يزاسطة الفسائل.

من خلايا قاعدة الفسيلة، تتطور جذور (الرسمة ح-1) تستوعب ماء وأملاح معدنية من التربة، ومن قمم النمو في أطراف الغصون ومن البراعم في السليميات تتطور غصون وأوراق.

في معظم الحالات، مصدر الفسيلة من قطعة غصن، לט בפ האפריקנית האפריקנית האפריקנית האפריקנית التي يمكن أن نُنْتِج منها نبات جديد كامل من ورقة واحدة! نقطف ورقة ونغرسها في وسط تنمية، من خلايا قاعدة الورقة تتطوِر جميع أقسام النبات الجديد: جذور وساق يحمل أوراقًا وأزهارًا (الرسمة ح -2).



الرسمة ح -1: فسيلة ال ١٥١٥٥ مَّت منها جذورًا في الماء





ועתשה ב-2: إكثار סיגלית אפריקאית יפושطة فسيلة من ورقة מن اليمين إلى اليسار: نبتة סיגלית אפריקאית، إنتاج الجذورمن فسيلة ورقة في الماء، فسيلة ورقة مغروسة في وسط تنمية.

يتأثر تطور الفسيلة من عوامل خاصة للفسيلة ذاتها - عوامل داخلية مثل كبر الفسيلة، عُمرها والهورمونات النباتية الموجودة فيها، وعوامل خارجية، مثل: الموسمية، نوع وسط التنمية وإضافة هورمونات. عرضنا العوامل وتأثيرها في جدول ح -1. مع ذلك، مفهوم ضمنًا أن جميع العوامل الخارجية التي تؤثر على تطور النبتة، مثل: الضوء، درجة الحرارة، الأملاح المعدنية والماء، تؤثر جميعها على تطور الفسيلة أيضًا.

ی تطورها	تؤتر عا	التي	للفسائل	خاصه	عوامل	:1-	جدول ح

الشرح	العامل	
من الأفضل اختيار فسيلة تشتمل، على الأقل، قاعدة ورقة واحدة في أبطها بُرعم.غالبًا نقص الأوراق إلى نِصفين، كي نقلل من فقدان الماء.	كبر الفسيلة	عوامل داخلية
من الأفضل أن نأخذ فسيلة من نبتة حديثة السن أو من غصن حديث السن. أحد الأسباب لذلك أن تركيز الهورمونات فيها عالي.	عُمرُ الفسيلة	
في مراحل مختلفة لتطور الفسيلة، يمكن إضافة أوكسين لتحفيز إنتاج الجذور والسيتوكنين لتحفيز تطور الغصون.	هورمونات النمو (التي يضيفها المزارع)	عوامل خارجية
في الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء، من الأفضل أن نأخذ فسائل في نهاية فترة الشتاء مع قدوم التوريق الذي يرتفع فيه تركيز الهورمونات.	فصل السنة (الموسمية)	
من المهم أن نغرس الفسيلة في وسط نمو فيه تهوية ورطب يحتوي أملاح معدنية.	نوع وسط النمو	

التركيب


التركيب هي طريقة تكاثر شائعة في تنمية الورد، أشجار الفاكهة والعنب، واليوم في النباتات الحولية أيضًا مثل البطيخ. يُستعمل التركيب لتكاثر أفراد ذات صفات مرغوبة للمزارعين. الطريقة معروفة ومستعملة منذ آلاف السنن ومصدرها على ما يبدو من الصن.

نُنْتِج في التركيب نبات جديد، من ناحية واحدة له صفات مرغوبة، ثمرة كبيرة، جميلة وعصيرية، ومن ناحية ثانية لديه القدرة على الصمود أمام أمراض في التربة، ويُتيح له نظام جذوره النمو جيدًا أيضًا في التربة التي يحمل فيها النبات الثمار أو الأزهار غير مناسب للنمو فيها.

في عملية التركيب، نربط قطعة من نبتة واحدة - فسيلة، على نبتة أخرى قريبة لها من ناحية وراثية. القسم المتجذر في التربة نسميه يرب والقسم المركب نسميه وراكب القطعة التي تُستعمل راكب لها رأس نهو أو برعم جانبي تتطور منه غصون جديدة. في عملية التركيب يَنتُج تواصل وطيد بين أنسجة الراكب وال הحدة عا في ذلك نسيج الكامبيوم الذي تتطور منه أنسجة نقل النبات. في أعقاب التركيب، يتحد نسيجي ال הحدة والراكب، وتعمل النبتتين فيما بعد طيلة حياتها كنبتة واحدة. يوجد عدة طرق لتنفيذ التركيب، لكن في جميع المبدأ نفسه. تصف الرسمة ح - 3 مراحل التركيب.



تفاح بَعد التركيب



الرسمة ح - 3: مراحل التركيب

- . تحضير فتحة على شكل T بواسطة قطع القشرة حتى منطقة الكامبيوم.
 - 2. إدخال الراكب تحت طرف مكان القطع.
 - 3. ربط وشد التركيب بشريط حتى يتحد كامبيوم ال הכנה والراكب.



التركيب في الحمضيات: ددة و 3 راكبون

كلما كان القرب الوراثي بين ال הכנה والراكب كبيرًا، فإن احتما نجاح التركيب يكون كبيرًا. على الأغلب ننفّذ التركيب بين أصناف من نفس النوع، لكن أحيانًا يمكن أن نركّب أنواعًا مختلفة لكنها قريبة (تنتمي إلى نفس النوع).

مصطلحات

الصنف

الصنف الذي نسمِّيه نوع ثانوي أيضًا (sub-species)، هو وحدة تصنيف في عالَم الطبيعة. هو يعرِّف عشيرة أفراد تنتمي لنوع معين (species) ويختلف بجميز معين عن عشيرة أخرى لأفراد من نفس النوع. مثال: הכלניות הלבנות והאדומות هي أصناف مختلفة لل *כלנית מצויה*. أصناف كثيرة هي نواتج رعاية نفَّذها الإنسان بعملية الإنتخاب الإصطناعي.

يوجد للتركيب عدة حسنات مهمة للمزارع:

- 1. يُتيح تنمية أصناف أشجار وعنب تحمل ثمار محسَّنة أيضًا في تربة غير مناسبة لهذه الأصناف (التي تحمل الثمار المحسَّنة).
- 2. يُتيح زيادة الثمار بواسطة استعمال בכנות لها قدرة على الصمود أمام أمراض وآفات زراعية.
- 3. في كروم الفاكهة، يُتيح تغيير صنف معين للثمار بصنف ناجح أكثر، من خلال تقصير المدة الزمنية حتى الحصول على ثمار (بالمقارنة للمدة الزمنية التي تمر حتى الحصول على ثمار من غرس جديد لأشجار حديثة السن.)
- 4. يُتيح إنتاج تراكيب نباتات لأهداف الزينة، مثلاً: تركيب أنواع صبار مختلفة على بعضها.



صبار مركَّب

זוטרים

חוטר هو غصن جانبي يتطور بشكل طبيعي من قاعدة جذع نباتات معينة مثل النخيل والموز. لإكثار أشجار النخيل، تُستعمل عادةً ال בחוטרים (الرسمة ح -4): يُغلف ال החוטר بكيس نشارة خشب، وعندما تتطور فيه جذور، يمكن فصله عن نبتة الأُم وغرسه في كرم جديد.



الرسمة ح -4: جذع نخيل مع חוטרים جاهزة للفصل



نبات الموز التي لا تتكاثر بطرية التكاثر التزاوجي بتاتًا، يُكثرونها عادةً بواسطة חוטרים، لكن اليوم شائعة طريقة التكاثر بواسطة مستنبت خلايا (ستتعلمون غنها في البند القادم)، وهو يحل تدريجيًّا مكان تكاثر ناتات الموز بواسطة ال חוטרים.

درنات وأبصال

النباتات التي لها أعضاء تخزين تحت سطح التربة، مثل: الدرنات والأبصال، يمكن إكثارها بواسطة هذه الأعضاء. معروفة لنا من المطبخ درنات البطاطا وأبصال بصل الحديقة.

بالطبع انتبهتم أن البطاطا الموجودة عدة أيام في البيت، في درجة حرارة الغرفة، تبدأ تنمو منها غصون

وأوراق من مناطق معينة في الدرنة (الرسمة ح -5). درنة البطاطا في الواقع هي ساق ثخين تحت سطح التربة وفيه براعم تكاثر. تُخزَّن في الدرنة مواد غذائية، والغصون التي تتطور من البراعم تستغل المواد الغذائية الموجودة في الدرنة وينمو نبات جديد. في الزراعة تُدفن درنات البطاطا، في التربة، ومنها تتطور نباتات جديدة ودرنات كثيرة إضافية.






الرسمة ح - 5: على اليمين - درنة بطاطا مع غصون جديدة تتطور من براعم التكاثر، على اليسار - نبتة بطاطا كاملة مع درنات كثيرة.

البصل هو ساق قصير وحوله أوراق ثخينة لحمية (الرسمة ح- 6). يوجد في الساق براعم تجدد تتطور إلى أبصال صغيرة، ومن قاعدة الأبصال الصغيرة تخرج الجذور. نفصل الأبصال الصغيرة عن نبتة الأم ومكن تنمىتها كنباتات حديدة.

نكثر نباتات ال درورو, ساس وغيرها بواسطة أيصال. عادةً، يتم جمع الأبصال الصغيرة وتُخزَّن المناب في مكان جاف وبارد وهكذا تُحفظ للموسم القادم، لكي نتمكن من تنميتها في كل موسم نباتات جديدة وبيعها في أصص في حوانيت الأزهار.








الرسمة ح -6: من اليمين إلى اليسار - مقطع تخطيطي في البصل تصوير مقطع في البصل، أبصال صغيرة إلى جانب بصل بالغ (חבצלת)

مستنبت نسيج

ليس كل نبات عكن إكثاره من فسائل، ليس كل نبات تنمو منه فسائل أو חוטרים، ليس كل نبات له أبصال أو درنات وليس كل نبات من السهل إكثاره من بذور. مع تطور العلم والتكنولوجيا، يزداد ويتوسع استعمال مستنبت النسيج للتكاثر غير التزاوجي.

مستنبت النسيج في الواقع هو שִיבּוּט نبات: نُنْتِج שֶבֶּט نباتات متماثلة كثيرة من خلية واحدة أو من عدة خلايا. تعتمد الطرية على صفة تجدد النباتات التي تُتيح تطور نبات كامل من قطعة صغيرة من النسيج وحتى من خلايا منفردة.



الرسمة ح -7: التكاثر في مستنبت نسيج

تتم تنمية الخلايا وأقسام النبتة على وسط اصطناعي في مختبر فيه يمكن تنظيم العوامل الخارجية: شدة الضوء، درجة الحرارة والرطوبة. يحتوي وسط النسيج على جميع المواد المطلوبة لتطور النبات (مواد عضوية وغير عضوية) وأيضًا هورمونات أوكسين وسيتوكينين.

عندما يتطور نبات في مستنبت نسيج، غيز عدة مراحل (الرسمة ح - 7): في المرحلة الأولى يتطور كالوس - كتلة خلايا غير متمايزة. في المرحلة الثانية - مرحلة التمايز - يبدأ تطوير الأعضاء المختلفة: الجذور، السيقان والأوراق. يمكن توجيه تطور الأعضاء بواسطة إضافة هورمونات أوكسين وسيتوكنين. ينشط الأوكسين تطور الجذور، وينشط سيتوكنين تطور الغصون، لذا تُضاف إلى وسط النسيج في مراحل مختلفة من التطور. النبتة الناتجة الصغيرة نسميها نبتة صغيرة.

وسط التنمية وهناك تمر مرحلة التكيف. فقط بعد ذلك، تُنقل النبات الحديثة السن إلى مكان نموها الثبات في المشتل أو الكرم.

خلال سنوات كثيرة، تم بحث الطرق المثلى لنمو النباتات في مستنبت نسيج، وفي معظم الحالات تُستعمل قمم النمو الموجودة في أطراف السيقان. ساهمت إمكانية إكثار ال $\sigma \pi d = 0$ بواسطة مستنبت النسيج كثيرًا في توسيع تسويق ال $\sigma \pi d = 0$ التي من الصعب لإكثارها بطريقة طبيعية.

توجد عدة حسنات لطريقة تكاثر النباتات بواسطة مستنبت نسيج:

- 1. إنتاج عدد كبير جدًا من الأشتال في وقت قصير في مختبرات تجارية، عكن تنمية آلاف وحتى ملايين النباتات في سنة واحدة من قطعة واحدة.
- 2. إنتاج نباتات من دون أمراض في النباتات معروفة أمراض تُسببها فيروسات، بكتيريا أو فطريات. عندما نُكثر نباتات بتكاثر خضري بإحدى الطرق آنفة الذكر، يمكن أن تنتقل إلى النباتات الجديدة. أما في مستنبت النسيج، فإننا نأخذ قطعة نبات من قمة فو ، لم تمر بعملية التمايز وعلى الأغلب نظيفة من الفيروسات.



נודה סחלב



- 3. توفير مساحات زراعية تتم تنمية النباتات في مستنبت نسيج بأدوات صغيرة، لذلك نحتاج مساحة صغيرة لتنميتها.
- 4. توفير في رش المواد الكيميائية تتم مراحل النمو الأولى للنباتات في ظروف معقمة ولا توجد حاجة لرشها بالمواد الكيميائية.
- 5. تنمية النبات خلال كل السنة بما أن المرحلة الأولى لنمو النبات تتم في المختبر أو الدفيئة في ظروف تخضع للمراقبة، يمكن تنميتها بشكل متواصل دون أي علاقة لفصول السنة، ويمكن ملاءمة موعد تسويق النباتات حديثة السن إلى مواسم فيها طلب كثير على النبات.

إلى جانب حسنات التكاثر بمستنبت النسيج، توجد سيئات أيضًا:

- 1. التكلفة الباهظة التنمية في مستنبت النسيج تلزمنا أن نستثمر في إعداد طاقم متخصص، في الأجهزة والمختبرات، وفي فحوصات كثيرة للنباتات، كي نتأكد من أنها غير ملوثة بالبكتيريا أو بالفيروسات، وفي البحث المستمر لتطوير طرق خاصة لكل نوع.
- 2. **الطفرات بتكرارية عالية** في النباتات التي تنمو في مستنبت نسيج، تَنتُج طفرات بتكرارية عالية بالمقارنة مع نباتات تنمو بطرق تكاثر خضرية أخرى. لذا يجب فحص صفات النباتات التي تنمو في مستنبت النسيج بشكل متكرر.

يجب إنتاج كمية كميات كبيرة جدًا من الأشتال أو إنتاج أشتال نباتات مطلوبة وسعرها عال في السوق، لكي تكون تنمية النباتات في المستنبت مربحة. ال הסחלב مثال لنبات مرموق لدى الناس وهم مستعدون أن يدفعوا مبلغًا عاليًا مقابله.

توجد في البلاد مختبرات تجارية تُنتج بطرق مستنبت النسيج نباتات مختلفة للتسويق في البلاد أو للتصدير، مثل: التوت الأرضى، الموز، أُشجار النخيل، عام ونباتات الزينة (الرسمة ح-8).



الرسمة ح -8: أشتال موز تطورت مستنبت نسيج

تكاّثر غير تز*اوجي* في



👣 سؤال ح-5

يفصل الجدول ح- 2 أمثلة لمزروعات نباتات يتم إكثارها بطرق غير تزاوجية.

جدول ح -2: أعضاء تُستخدم في الزراعة للتكاثر غير التزاوجي للنباتات

المزروعات التي نُكثرها من هذه الأعضاء	العضو المستخدم للتكاثر
יִשושו, כלנית	درنة
أزهار للزينة: פרזיה, גרקיס	بصل
نخیل، موز	חוטר
פלרגוניום، تين، במבוק	فسائل ساق
أشجار ثمار متساقطة الأوراق (مشمش، تفاح)، أشجار حمضيات (برتقال، ليمون، جريبفروت)، عنب، بندورة، باذنجان.	قطعة ساق/غصن يحمل برعمًا مركَّب على حدة
نباتات الزينة: סיגלית אפריקנית, פפרומיה	ورقة أو قطعة ورقة
موز، أشجار نخيل، توت أرضي، نباتات زينة، ציפורן	قطعة ورقة تنمو في مستنبت نسيج

أ. مَعَّنوا في الجدول واذكروا أي أعضاء نبات غير مناسبة للتكاثر غير التزاوجي؟ اقترحوا سببًا

ب. صنفوا الأمثلة التي وردت في الجدول إلى مجموعتين: في المجموعة الأولى - أشكال تكاثر موجودة في الطبيعة. في المجموعة الثانية - أشكال تكاثر ينفذها الإنسان فقط.

ح2.2 تدخّل المزارعون في دورة الحياة والتكاثر التزاوجي في النباتات

ناتج التكاثر التزاوجي في النباتات هو البذور التي يتطور منها الجيل الجديد. يتدخل المزارعون في عمليات مختلفة في جميع مراحل دورة حياة النبات، ابتداءً بالبذرة وإنباتها، عبر النمو والإزهار إلى إنتاج الثمار والبذور ونضوجها.

تخزين البذور

البذور هي جيل المستقبل لمحاصيل المزارع، ومن المهم الحفاظ عليها لمدة زمنية طويلة، وضمان إنباتها في موعد مناسب. تختلف المدة الزمنية للحفاظ على حيوية البذور من نوع واحد إلى نوع آخر، وهي تحدد بواسطة عوامل داخلية - وراثية وبواسطة عوامل خارجية - للبيئة المحيطة.

في أي ظروف بيئة محيطة من الأفضل الحفاظ على البذور لمدة زمنية طويلة؟

يجب أن تخضع ظروف تخزين البذور إلى المراقبة، كي نحافظ على حيوية البذور، وهذا يعني قدرتها على الإنبات في المستقبل، وكي نمنع إنبات مبكر للبذور. بالأساس، الظروف التي نخزِّن فيها البذور لمدة زمنية طويلة، يجب أن تقلل وتيرة العمليات الأيضية (تبادل المواد) في البذرة بشكل كبير جدًا، لكن دون أن نؤذي الجنين.

بالإضافة للحفاظ على شروط بيئة محيطة تثبط أو تمنع الإنبات، يجب حماية البذور من تطور البكتيريا والفطريات ومن الحيوانات التي تشكل البذور بالنسبة لها غذاءً جيدًا. قد تدخل العصافير والقوارض إلى المخازن، والحشرات مثل: ال חיפושיות ופרפרי עש قد تصل أحيانًا مع البذور مباشرةً من الحقل إلى المخزن.



🔐 سؤال ح -6

سُجِّل على أكباس غذاء تحتوي على بذور البقوليات أنه من الأفضل حفظها في مكان "مظلم، جاف وبارد. ما هو الأساس البيولوجي لهذه التوصية؟

كسر السبت في البذور وتنشبط الإنبات

رأينا في الفصل السادس أن هناك بذور لا تنبت في ظروف بيئة محيطة مريحة أيضًا، لأنها موجودة في حالة سبات يثبط الإنبات لمدة زمنية معينة. تُتيح آليات السبات، في الطبيعة، توزيه الإنبات في الوقت، وتوجد لذلك أفضلية في ظروف بيئة محيطة صعبة. لكن المزارعون معنيون في إنبات بذور في نفس الوقت وفي الموعد المريح لهم. لذا فهم يستغلون المعرفة التي تراكمت حول العوامل التي تؤدي إلى السبات. فيما يلي عدة أمثلة للعوامل التي تؤدي إلى سبات وللعلاج الذي يتم لكسر وتنشيط الإنبات.

1. قشرة قاسية وغير نفاذة للماء أو الغاز: يُتيح احتكاك قشرة البذرة بواسطة ورقة زجاجية في خلاط خاص إلى دخول الماء والأكسجين إلى البذور، وينشَط خروجها من حالة السبات. هناك طرق إضافية لإزالة حاجز القشرة القاسبة - معالجة كيميائية مساعدة حامض أو قاعدة (مثلا: بذور الزيتون) أو تلين البذور بواسطة غمرها بالماء.

2. مواد تثبط الإنبات في البذور:

الشطف بالماء - في معظم الحالات، شطف البذور في الماء يُبعد المواد المثبطة ويُبطل تأثيرها. في عدة نباتات صحراوية، وُجدت مواد تثبط الإنبات بكمية كبيرة وفقط شطفها بماء كثير مثل المطر القوى في الصحراء، يتم إبعادها.

البقاء في البرد في ظروف رطوبة - يوجد بذور، مثلًا: שיפון חורפי، تحتاج إلى برد في ظروف رطوبة لهدم المواد التي تثبط الإنبات. تُوضع هذه البذور في غرف تبريد في درجة حرارة $^{\circ\circ}$ لعدة شهور.

معالجة هورمونالية - في حالات معينة، السبات الذي يحدث بسبب المواد المثبطة، مكن إبطاله بواسطة إضافة جيبرلين أيضا (جدول ح -4، صفحة 138).

- 3. درجة تطور الجنين: يوجد بذور في سبات، لأن تطور الجنين فيها لم يكتمل. تعرض البذور إلى درجة حرارة عالية، مثل: بذور النخيل وال סחלב يؤدي إلى أكمال تطور الجنين والخروج من حالة سبات. تُشر الأبحاث أنه مكن استبدال التعرض لدرجة حرارة عالية معالجة بالهورمون جيريلن.
- 4. التعرض للضوء: في البذور التي تحتاج إلى ضوء للإنبات، يستطيع المزارع تنشيط الإنبات بواسطة تعرض البذور للضوء بطريقة إصطناعية. مثلا: مكن تحفيز إنبات بذور الدخان والخس بواسطة تعريضها للضوء لعدة ثواني. في بذور أخرى، هناك حاجة لمدة إضاءة أطول. يوجد نباتات تحتاج إلى توقيت ضوئي (دورية ساعات الضوء والظلام) معين فيه نهار قصير أو طويل. عندما تستجيب البذور للضوء، تشترك صبغية الفيتوكروم الذي تعرفنا عليه في الفصل السادس في سياق تأثيره على الإزهار والإنبات.
 - 5. تهوية البربة: إن رفع تركيز الأكسجين في البيئة المحيطة للبذور يؤدى في حالات كثيرة إلى تنشيط الإنبات. أعدَّت معالجة التربة في الحقول الزراعية إلى تهوية التربة أيضًا، ولإتاحة تبادل غازات ناجع بن وسط الإنبات والجنين في البذرة. تبادل الغازات الناجع مطلوب لاستخراج الطاقة بالتنفس الخلوى، ولكي يُتيح إنبات سريع أكثر بالمقارنة مع تربة دون تهوية.



أرض معالجة



أعشاب برية ونباتات زراعية

الأعشاب البرية الكثيرة التي تنمو في حقول زراعية، تنبت جيدًا أيضًا في تربة من دون تهوية وفيها تراكيز عالية لثاني أكسيد الكربون. تُتيح هذه الصفة لها أن تتنافس بنجاح مع مزروعات زراعية.

في قسم من البذور، يحدث السبات نتيجة لأحد الأسباب آنفة الذكر، وفي بذور أخرى لعدة أسباب، ووفقًا لذلك تتم المعالجة المناسبة لإخراج البذور من السبات. في بذور النخيل، على سبيل المثال، لإخراجها من السبات، يمكن استعمال جبريلين، كما يجب معالجة القشرة القاسية بالاحتكاك، في يُتاح للهورمون الدخول إلى البذرة.

جدير بالمعرفة

إنبات أقدم بذرة وُجدت في العالَم

في سنة 1963 وُجِدَت في الحفريات الأثرية في ميتسادا عدة بذور لشجرة النخيل. حسب الأبحاث التي أُجريت، قُدِّر عُمرها حوالي 2,000 سنة. في سنة 2005 قرروا ن يزعوا خمس بذور من البذور التي وُجِدَت في كيبوتس قاطورة في النقب. نُقعت البذور في مياه ساخنة، غُمست في الجريلين وفي هورمون مسؤول عن إخراج البذور، وزُرعت في أصص أُضيف لها سماد كيماوي. نُقلا الأُصص إلى غرفة معزولة ورُبطت بجهاز الرى. بعد مرور سبعة أسابيع، نبتت بذرة واحدة منها.

اندهش الباحثون من مشاهدة إنبات وتطور أحد البذور إلى شجرة نخيل. وقد سُمِّيت الشجرة "متوشلاح" على اسم متوشلاح المذكور في التوارة والذي عاش حوالي 1,000 سنة (وما زال أصغر من بذرة النخيل). هل الشجرة "متوشلاح" ذكر أم أنثى؟ سيعرف الباحثون ذلك، عندما تُزهر الشجرة وأنتم تعلَّمتم في السابق لماذا.






سؤال ح - 7

تعرض الرسمة ح-9 نتائج التجربة التي خُزِّنت فيها بذور البطاطا في درجة حرارة °C خلال عدد مختلف من الأيام. بعد ذلك، تمَّ إنباتها في درجة حرارة °C وحسبوا النسبة المئوية للإنبات. أ. ما هو المتغرِّر غير المتعلق في التجربة؟

- ب. ما هو عدد الأيام الأدنى المطلوب لإبقاء البذور في درجة حرارة ℃ 5 ، كي تنبت البذور؟
- ت. تناقش بيولوجي ومزارعة في السؤال الآتي: كم من الوقت من الأفضل الحفاظ على البذور في درجة حرارة ℃ . ادعى البيولوجي أن المدة الزمنية المطلوبة على الأقل 80 يومًا، أما المزارعة فقد ادعت أنه يكفي 65 يومًا. ماذا كانت اعتبارات كل واحد منهما، التى أدت إستنتاج مختلف؟



الرسمة ح -9: تأثير مدة البقاء في البرد ($^{\circ}$ C) على النسبة المؤية للإنبات

توجيه موعد الإزهار

تغيير عدد ساعات الضوء خلال اليوم

تؤثر دورية ساعات الضوء والظلام - التوقيت الضوئي - على موعد الإزهار في النباتات. كل عام، يقصر ويطول النهار في دورية ثابتة. المعرفة عن التوقيت الضوئي، واستجابة النبات للتغييرات في عدد ساعات الضوء والظلام تساعد المزارعين في توجيه موعد الإزهار حسب احتياجات السوق، مثلًا: قبل الأعياد عندما يكون طلب كبير على الأزهار. في الدفيئات يغيِّر المزارعون عدد ساعات الإضاءة بواسطة إضاءة اصطناعية، وهكذا يستطيعون تسويق أزهارًا، مثل: ال عنوادن الاحتادات الضائية في كل فصول السنة دون علاقة لطول النهار الطبيعي.



سؤال ح -8

كيف، حسب رأيكم، يمكن تغيير موعد الإزهار الطبيعي لل הליזיאנטוס، بحيث تُزهر كل السنة ويمكن تسويقها في الشتاء أيضًا؟



التوقيت الضوئي في النبات، انظروا الفصل السادس،

صفحة 116. في الحيوانات،

الفصل الخامس صفحة

ליזיאנטוס

تأثير درجة الحرارة على الإزهار

رأينا في الفصل السادس أن هناك نباتات يتأثر إزهارها من درجة الحرارة. يوجد نباتات بحاجة إلى وجبة برد - تسلسل عدد أيام أدنى (صغير جدًا) في درجة حرارة منخفضة، وهي تُزهر فقط بعد أن تتعرض لوجبة البرد المناسبة.

يستغل المزارع هذه المعرفة عندما يريد اختيار المزروعات وفقًا لمجال درجات الحرارة في المنطقة التي تتواجد فيها مزرعته. تحتاج أشجار الفاكهة المتساقطة الأوراق، مثل: التفاح والخوخ إلى تسلسل عدة أيام في درجة حرارة منخفضة ($^{\circ}$ 5 حتى $^{\circ}$ 5)، وهي تُزهر فقط بعد أن تعرضت إلى هذه الوجبة من البرد. لكن الكرز بحاجة إلى فترة مستمرة من درجة الحرارة المنخفضة ($^{\circ}$ 2 حتى $^{\circ}$ 5) وهو لا يُزهر في معظم أقسام البلاد. لذا تتم تنمية الكرز في مناطق يتراوح ارتفاعها من 800-1,000 متر فوق سطح البحر وتسودها درجات حرارة منخفضة خلال أيام كثيرة بشكل متسلسل، مثل: هضبة الجولان، جبال الخليل، منطقة القدس والجليل الأعلى.

تكبير نسبة التلقيح

تَنْتُج الثمار والبذور التي في داخلها في أعقاب التلقيح الذي يتم بواسطة الرياح أو الحشرات والعصافير. لتحسين احتمال التلقيح، يستطيع المزارع أن يضع خلايا نحل في الكرم أو ينفذ **تلقيح اصطناعي:** ينشر لقاح بالقرب من الأزهار بشكل يدوى. هكذا يتم، على سبيل المصال، في كروم النخيل: فقط عدد قليل من أشجار الكرم تحمل أزهارًا ذكرية، ولتحسين احتمال التلقيح، ينشر المزارع لقاح بشكل موجَّه إلى جانب الأزهر الموجودة على الأشجار الأنثوية.

🥞 سؤال ح - 9

تُعتبر دولة سيريلنكا في جنوب آسيا من الدول الرائدة في العالم في تصدير القهوة. في السنوات العشر الأخيرة، انخفض فيها محصول القهوة بشكل كبير جدًا. حاول المزارعون في سيريلنكا أيقاف انخفاض محصول القهوة بعدة طرق: غُرست جنبات (شجيرات) القهوة بكثافة عالية، وُسعت مساحات كروم القهوة على حساب الغابات من حولها ورشوا، في كثير من الأحيان، الكروم مواد رش ضد الآفات الزراعية. لم تساعد جميع هذه العمليات على حل المشكلة.

أ. اختاروا طريقتن من الطرق التي استعملها المزارعون واقترحوا شرحًا لفشل كل منها.

في البحث الذي أجرى لفحص الظاهرة، تمَّ فحص كرميْ قهوة متجاورين، بينهما وُضعت خلايا نحل للعسل. في الكرم أ غُطيت الجنبات (الشجيرات) بشبكة، أما الجنبات في الكرم ب لم تُغطى. بعد جني الثمار، اتضح أن جنبات القهوة في الكرم ب أثمرت أكثر من الجنبات في الكرم أ.

ب. ما هو الإستنتاج من التجربة؟

ت. على ضوء نتائج التجربة: ما هو الشرح لفشل العمليات الأولى التي نفَّذها المزارعون؟

ث. كيف مكن شرح الحقيقة أنه في الكرم أ نَتَجت ثمار أيضًا؟

توجيه تطور الثمرة ونضوجها

كما ذكرنا سابقًا، بداية تكوين الثمرة نسمِّيها عقد الثمرة وهي مرحلة حساسة جدًا في تطور الثمرة. لا

تتطور جميع الأزهار إلى ثمرة، ويتساقط قسم منها قبل عقد الثمرة. في الظروف المثلى أيضًا لا تصل النسبة المئوية لعقد الثمار إلى 100% بل إلى عدة عشرات بالمئة على الأكثر. مع تطور الثمرة، تصل خلايها مواد غذائية كثيرة نتَجت في الأوراق خلال عملية التركيب الضوئي وتكبر الثمرة.

وُجِد أن ارتفاع مستوى منظمات النمو أوكسن وجبريلن توجِّه تدفق المواد المغذية إلى الثمرة. يتم تحديد كبر الثمرة بواسطة معطيات وراثية، لكنه يتأثر أيضًا من عوامل البيئة المحيطة. مثلا: يؤثر توافر المياه - مطر أو ري - على كبرها، وزنها وتركيز السكر في الثمار العصرية.



عقد څرة المشمش

النسبة المئوية لعقد الثمار العالى غير مرغوب بالضرورة للمزارعين، لأنه في هذه الحالة تَنْتَج ثمار كثيرة وصغيرة والطلب عليها يكون قليل. لذا المزارعون معنيون في تقليل

عدد الثمار والحصول على ثمار كبيرة. فهم ينفذون ذلك بطريقتين:

- تفرید الثمار المعقودة (تقلیل عددها) بشكل یدوی أو بواسطة رشها بأوكسین اصطناعی.
 - 2. تحفيز نهو الثمرة بواسطة الرش بالجبريلن.





نافذة البحث

في التجربة التي أُجريت في البلاد، تمَّ تفريد (تقليل عدد) عقد ثمار وثمار في أشجار التفاح. نُفُّذ التفريد بعدة مواعيد، ابتداءً من ذروة الإزهار (موعد 1) وحتى 60 يومًا بعد ذروة الإزهار (موعد 5). في هذه المواعيد نُفِّذ التفريد بمستويين: تفريد بمستوى عال، حيث بقيت فيه 200 ثمرة على الشجرة، وتفريد بمستوى منخفض، حيث بقيت فيه 400 ثمرة على الشجرة. في قطع الأراضي الضابطة، لم يُنفَّذ تفريد بتاتًا.

فيما يلى مكتشفان من التجربة:

مُّ مُكْتَشَف 1: محصول كل الثمار في كل الأحجام كان عاليًا في قطع الأراضي الضابطة التي لم يُنفَّذ فيها التفريد: حوالي 140 كغم بالمقارنة مع 30-80 كغم في قطع أراضي التجربة.


مُكتشَف 2: محصول الثمار الكبيرة - أكثر من 7 سم - في قطع أراضي التجربة وفي قطع الأراضي الضابطة معروض في الرسمة ح - 10.

أ. ماذا كان سؤالي البحث؟

ب. ماذا كانت المَتغيِّرات غير المتعلقة في التجربة؟

ت. ماذا يمكن الإستنتاج من النتائج المعروضة في الرسمة ح - 10؟ اشرحوا.

ث. اقترحوا شرحًا ممكنًا للكمية القليلة للثمار الكبيرة في قطعة الأرض الضابطة.




الرسمة ح -10: محصول الثمار الكبيرة في تجربة التفريد موعد 1: ذروة الإزهار، موعد 5: 60 يومًا بعد ذروة الإزهار

في عملية نضوج الثمرة يتغيَّر لونها، مذاقها، رائحتها ومدى قساوتها. خلال النضوج، يتحلل الكلوروفيل، تبرز مواد صبغية أخرى في الثمرة وتصبح لينة.

تتأثر وتيرة النضوج من الهورمون إثلين. اتضح أن الثمرة الناضجة تُفرز غاز الإثلين الذي يؤثر على نضوج ثمار أخرى في بيئته المحيطة. يستمر إفراز الإثلين في الثمار بوتيرة متزايدة بعد عملية القطف أيضًا. يوجد ثمار تُقطف قبل نضوجها وهي تنضج بَعد القطف في عملية نسمِّيها إنضاج. أمثلة لثمار تمر في عملية الإنضاج: الأفوكادو، الأفرسمون والموز. يقطف المزارع الثمر قبل نضوجها ويخزِّنها في ظروف تثبط الإنضاج.

يصل الأفوكادو السوق عندما يكون غير ناضج، ولتنشيط إنضاجه نوصي بتغليفه ووضعه بالقرب من ثمار أخرى. بهذه الطريقة يرتفع تركيز الإثلين حول الثمرة وتُكمل الثمرة عملية الإنضاج خلال عدة أيام. ثمار الحمضيات لا تستمر في النضوج بعد قطفها، لكن الإثلين يؤثر على تغيير لونها، لذا تُقطف ثمار الحمضيات عندما تكون خضراء، وبعد ذلك يتم تغيير لونها بواسطة كشفها للإثلين.



قصة اكتشاف

اكتُشف تأثير الإثلين على نضوج الثمار بالصدفة في الصين القديمة، عندما انتبهوا على نضوج الثمار المبكر في الغرف التي أشعل فيها البخور. شُوهدت ظاهرة شبيهة في الولايات المتحدة في غرف أشعلت فيها أفران النفط أو الغاز، لكن ليس في الغرف التي استُخدمت فيها أفران كهربائية. استنتجوا من ذلك أن الحرارة لا تؤدي إلى النضوج، بل الغاز المنبعث من الأفران - غاز الإثلين.

التأثير على النمو بواسطة التقليم

إحدى العمليات التي ينفَّذها الزارعون في الكرم، البستان وحديقة الزينة أيضًا هي تقليم الغصون. تُنفَّذ عملية التقليم قبل التوريق والإزهار وتأثيرها ملحوظ مع تجدد النمو. يوجد للتقليم عدة أهداف: 1. تصميم شكل النبات، كي لا يتضرر من الرياح القوية ولكي نسهل معالجته وقطف ثماره.

- 2. إبعاد غصون جافة وهرمة وتحفيز تطور غصون جديدة في موسم النمو القادم، وفي أعقاب ذلك، تتأثر جودة المحصول وكميته.
 - 3. التعرض الأمثل لغصون الشجرة للضوء.

ح3.2 تدخُّل المزارعون في مراحل مختلفة في دورة حياة النبات

يعرض الجدول ح -3 تلخيصًا للطرق المختلفة التي يؤثر فيها المزارعون على عمليات في دورة حياة النبات. هدف العمليات التي ينفُذها المزارعون هو زيادة كمية المحصول وتحسين جودته. لذلك تؤثر عملياتهم على تطور النباتات وتنميتها وعلى عمليات التكاثر التزاوجي.



جدول ح -3: تدخُّل المزارعون في دورة حياة النبات

أمثلة للتطبيق	الهدف	العملية التي ينفِّذها المزارع	المرحلة في دورة الحياة	
بذور البقوليات، بذور النجيليات.	الحفاظ على حيوية البذور، منع إنبات البذور ومنع إصابتها بواسطة الآفات الزراعية.	الحفاظ على البذور في شروط ظلام، درجة حرارة منخفضة وجافة، ومعقمة.	البذرة (مرحلة قبل الإنبات	
زيتون	تنشيط الإنبات	احتكاك، تليين كيميائي أو سحق القشرة القاسية.	والإنبات)	
بابايا	إبعاد مثبطات (معيقات) الإنبات.	شطف		
بذور أشجار ثمار متساقطة الأوراق، مثل: التفاح، الأجاص، الكرز، البرقوق.	تنشيط إنبات البذور التي تحتاج للبقاء في درجة حرارة منخفضة.	البقاء في البرد		
الخس	تحفيز إنبات	إضافة هورمونات (مثلًا: إيثلين).		
الخس، التبغ	تنشيط الإنبات لبذور تحتاج إلى ضوء أو ظلام	التعرض لشروط إضاءة مناسبة		
جميع المزروعات الزراعية	تحسين النمو	الري، التزبيل والتسميد	مرحلة النمو	
التنمية في الدفيئات	ازدياد عملية التركيب الضوئي وتحسين النمو	تنظيم درجة الحرارة، شدة الضوء وتركيز CO_2		
فسائل	إخراج جذور من الفسائل وتوجيه النمو.	معالجة بهورمونات مختلفة، مثل: الأوكسين والجبريلين.		
أشجار الزينة، أشجار الفاكهة والعنب	تأثير على تطور الغصون	تقليم		
موز، اسكدنيا	منع أضرار بواسطة العصافير والحشرات.	تغطية الكرم بشبكة	مرحلة التكاثر	
أزهار الزينة في الدفيئة	توجيه موعد الإزهار حيب احتياجات السوق	تنظيم درجة الحرارة وعدد ساعات الإضاءة		
أشجار الفاكهة	تقليل المنافسة بين الأزهار والثمار (مصدر ابتلاع).	تفريد (تقليل عدد) الأزهار والثمار يدويًا أو بواسطة هورمونات.		
حمضيات، أفوكادو	l	إضافة خلايا نحل		
نخيل	ازدياد نسبة التلقيح وتوجيهها	تلقيح اصطناعي		
موز، أفوكادو، افرسمون	توجيه مدة إنضاج الثمار	تنظيم مستوى الإثلين وال CO ₂	تخزين منتوجات	
أزهار للتصدير، تفاح، موز، بندورة.	إبطاء عمليات طبيعية، مثل: الإزهار والنضوج، تثبيط الإنضاج.	تخزين في درجة حرارة منخفضة.	المزرعة لمدة زمنية طويلة	
حمضيات، فلفل	حماية الثمار من الفطريات والآفات الضارة.	شطف، تعقيم وتغليف بالمشمع.		
عدس، قمح، כוסמת	الحفاظ على بذور تُستعمل كغذاء من العفن.	تخزين في ظروف الظلام، درجة حرارة منخفضة، وجفاف		



المواضيع الأساسية في الفصل



يتدخُّل المزارعون بطرق مختلفة في عمليات تكاثر الحيوانات والنباتات.

التدخُّل في تكاثر الحيوانات

الإضاءة الإصطناعية تؤدى للدجاجات أن تضع بيضًا خلال كل السنة.

يستطيع المزارعون توجيه موعد الشبق. أحيانًا يُنفِّذون تزامن لموعد الشبق في كل القطيع وأحيانًا يحثون الشبق كي يكون مبكرًا.

يوجد عدة حسنات لتزامن دورات شبق البقرات في القطيع، من بينها: توفير التكاليف المتعلقة بعمل الشخص الذي يخصب البقرات، التوفير في تكاليف البذرة، الولادة، في نفس الوقت، التي تُتيح معالجة العجول في نفس الوقت، تزامن الولادة إلى موعد مريح لتنمية العجول وللتسويق المركز للعجول المعدَّة للحوم.

حث الشبق في البقرات يُتيح ولادة في سن مبكر أكثر ويقصر الزمن بين ولادة واحدة والتي تليها. إحدى الطرق للحصول على أفراد مرغوبة/ محسّنة هي التخصيب (الزراعة) الإصطناعي. بعض الطرق التي يستعملها الإنسان للتدخُّل في تكاثر الحيوانات في المزرعة تُثير معارضة عند الهيئات التي تهتم في رفاهية الحيوان.

التدخُّل في تكاثر النباتات

تعتمد جميع الطرق المُستعملة في الزراعة والبساتين للتكاثر غير التزاوجي (الخضري) على قدرة النباتات أن تُجدد جميع أقسام النبات.

الأفضلية الأساسية للتكاثر الخضري للزارعة هي الحفاظ على الصفات المرغوبة للمزارعين بشكل كامل ونقلها من جيل إلى جيل.

كستنبت النسيج هو سِهداى النبات: إنتاج سِهى نباتات كثيرة متماثلة من خلية واحدة أو من عدة خلايا. تعتمد الطريقة على صفة التجدد الموجودة عند النباتات والتي تُتيح تطور نبات كامل من خلايا منفردة. لطريقة تكاثر النباتات بواسطة مستنبت نسيج يوجد عدة أفضليات مهمة، لكن توجد بعض السئات أنضًا.

يتدخَّل المزارعون في عمليات مختلفة في جميع مراحل دورة حياة النبات ومن ضمنها في جميع مراحل التكاثر التزاوجي: الإزهار، التلقيح، نضوج الثمار وتخزين البذور.



حيوانات

بلوغ جنسي إضاءة اصطناعية دورة الشبق اباضة تخصيب اصطناعي موسم التكاثر بيضة وضع البيض بروجسترون جونادوتروبينات (هورمونات) توجيه موعد الشبق عند الأبقار (تزامن) جُسَيم أصفر حث الشبق



نباتات

أوكسين وجبة برد

طول النهار وسط نمو

تخزين البذور مريستيمات

إثلين إنبات

بصل براعم تكاثر

جيبرلين موسم تكاثر

تقليم التوقيت الضوئي

تفرید څار (تقلیل عدها) فیتوکروم

تلقيح اصطناعي درنة

إضاءة اصطناعية سيتوكنين

إنضاج نبات صغير

نضوج كالوس

تركيب قمة النمو

تمايز كامبيوم


بذرة راكب

חוטרים שיבוט

حيوية البذور مرحلة التكيف

فسائل مستنبت نسيج

כנה שיום יגפּת





الفصل الثامن: نظرة تلخيص على تكاثر النباتات والحيوانات

تعرفنا في الفصول السابقة على تفاصيل تميِّز عمليات تكاثر الإنسان، الحيوان والنبات. نعرض في هذا الفصل نظرة علوية تلخيصية على عمليات التكاثر في الطبيعة من خلال التركيز على النشوء والارتقاء لعمليات التكاثر، على تكاثر عشائر ومبادئ مشتركة لعمليات التكاثر في مستويات التظيم ابتداءً من الخلية إلى النظام البيئي.

خ1. جوانب النشوء والارتقاء لعمليات التكاثر

جميع مميزات أجهزة التكاثر، الخلايا التناسلية وعمليات الإخصاب تدعم الفرضية التي تعتمد على دلائل كثيرة أن بداية الحياة كانت في الماء وهناك كانت الكائنات الحية محمية من التأثير الضار للأشعة فوق بنفسجية (أشعة كال) للشمس. في معظم الكائنات الحية، في البحر واليابسة أيضًا، عدد الخلايا التناسلية أكبر بكثير من عدد الأفراد. قد تكون هذه الحقيقة دلالة مهمة إلى أنه في الماضي البعيد تطورت وعاشت جميع الكائنات الحية في الماء، وقد تمّت جميع عمليات التكاثر في الماء. كانت تُطلق الخلايا التناسلية إلى الماء والإلتقاء بينها كان عشوائيًا بشكل كبير جدًا. يضمن هذا العدد الهائل أن يكون التقاء بين الخلايا المنوية وخلايا البويضات من نفس النوع البيولوجي، على الرغم من أن احتمال التقاءها قليل. عند الكائنات الحية التي تعيش في الماء، ومن ضمنها الأسماك والطحالب، هذا هو الوضع اليوم أيضًا.

مع مرور الوقت تطورت أنواع تعيش في اليابسة. تطورت إمكانية الحياة على اليابسة بعد أن نتجت، في الغلاف الجوي، طبقة الأوزون التي تقلل بشكل كبير جدًا الأشعة فوق البنفسجية الضارة والتي تصل إلى سطح الكرة الأرضية. تثبيت أنواع الكائنات الحية على اليابسة كان يرافقه تطور الإخصاب الداخلي وظهور تنوع وسائل الحماية على الخلايا التناسلية من الجفاف، حيث تُتيح لهم الإلتقاء في بيئة محيطة مائية أو رطبة محمية من الجفاف. حسب الفرضية المقبولة، تغييرات النشوء ةالإرتقاء التي حدثت منذ ذلك الحين، شملت فيما بينها تطور أعضاء خاصة، أعضاء التزاوج، لنقل الخلايا المنوية إلى داخل جسم الأنثى عبر فتحات جنس خارجية، ولإلتقاء خلية منوية مع الخلية التناسلية الأنثوية في بيئة محيطة محمية من الجفاف. في أعقاب هذه التغييرات، انخفضت بشكل ملحوظ أهمية العدد الهائل للخلايا التناسلية، بالأساس عند الأنثى. مع ذلك أيضًا، في الإخصاب الداخلي عدد الخلايا المنوية هائل والنسبة المئوية للخلايا المنوية التي تصل خلية البويضة هي صفر! في النباتات أيضًا، تطورت مباني تُتيح حدوث إخصاب داخلى في ظروف اليابسة، مباني، مثل: حبيبات اللقاح والبويضات.

هناك تطور إضافي متعلق بالحياة على اليابسة وهو الوسائل المختلفة لحماية الأجنة ولتزويد احتياجاتها خلال التطور الجنيني (جدول ب-1، صفحة 28). في البيئة المحيطة المائية، تتطور الأجنة داخل بيضة ذات قشرة لينة، ويتم تبادل الغازات وإفراز الفضلات بطريقة الديفوزيا (الانتشار). أما في البيئة المحيطة على اليابسة، تضع الزواحف والطيور بيوضًا تُتيح للجنين داخل البيئة المحيطة في البيضة أن يقوم بجميع على اليابسة، من ضمنها التنفس الخلوى وإفراز الفضلات. البيوض تحمى الجنين من الإصابات أيضًا.



في الثدييات، يتطور الجنين داخل بيئة محيطة مائية في رحم الأُم، وهناك يكون محميًا وتُزوَّد جميع احتياجاته. تُتيح هذه الوسائل لأجنة الزواحف، الطيور والثدييات التي تعيش على اليابسة أن تتطور في بيئة مائية محمية مثل تطور أجنة الأسماك والكائنات الحية الأخرى التي تعيش في الماء.

التكاثر التزاوجي للنباتات عديمة البذور (طحالب، أشنات وسرخسيات - لم نتعمق بها في هذا الكتاب) متعلق بشكل مُطلق ببيئة محيطة مائية فيها فقط تستطيع الخلايا المنوية أن تمر وتصل خلية البوية وأن تخصبها، لذا فهي تعيش بالأساس في بيئة محيطة مائية أو رطبة. في النباتات البذرية (ذات البذور)، يتم الإخصاب في بيئة محيطة رطبة موجودة داخل المبيض. لكن خلافًا لمعظم الحيوانات، تطور الجنين إلى نبات غير متواصل ومع مرور الوقت الذي يمر من الإخصاب حتى إنبات البذرة، فإن الجنين والمواد الإدخارية في البذرة تكون محمية من الجفاف ومن إصابات البيئة المحيطة حتى تَنْتُج الظروف المريحة للإنبات.

خ2. هل أفراد قليلة أم كثيرة؟ إستراتيجيات التكاثر

عندما يتكاثر فرد ويُنجب أفرادًا، فإنّ الأمر يؤثر على استمراره وعلى العشيرة كلها. بودنا أن نذكركم أن العشيرة هي مجموعة أفراد من نوع واحد (species) تعيش معًا في منطقة معينة.

على ما يبدو من المعقول أنْ نفكر أنّ العدد الكبير للأفراد هو أفضلية للنوع والعشيرة. بالأساس صحيح الأمر، في الظروف التي تبقى فيها الأفراد على قيد الحياة أيضًا وتتكاثر وتساهم في استمرار نمو العشيرة. لكن يتضح من التمعُّن في ما يحدث في الطبيعة، في الظروف المثلى، أن جميع الأفراد لا تبقى على قيد الحياة. فحص باحثون العلاقة الممكنة بين عدد الأفراد وبين الإستثمار الذي يُبذل في إنتاجها ونموها، وقد وجدوا في معظم الأحيان أن هناك علاقة عكسية بين عدد الأفراد والإستثمار الذي يبذله الوالدين في تتمية الأفراد. وصف الباحثون إستراتيجي تكاثر مختلفة عن بعضهما من ناحية تخصيص الموارد:

إستراتيجية أ: أفراد كثيرة وبذل استثمار قليل في إنتاجها، تنيمتها وحمايتها. تبقى فقط نسبة مئوية صغيرة جدًا من الأفراد على قيد الحياة.

إستراتيجية ب: عدد قليل من الأفراد وبذل استثمار كبير في إنتاجها، معالجتها وحمايتها. تبقى نسبة مئوية كبيرة من الأفراد على قيد الحياة.

مصطلحات إستراتيجية

أخذ المصطلح إستراتيجية من عالم مصطلحات الإنسان: " دمج عمليات لتحقيق غرض معين". ولكن هذا لا يعني أن الكائنات الحية لديها إمكانية تحديد أهداف والعمل بحسبها. (التعريف حسب: אבן-שושן, א. (תשמ"ח) המילון החדש, הוצאת קרית ספר בע"מ, ירושלים).

لفهم العلاقة بين عدد الأفراد وبذل الاستثمار في إنتاج الأفراد ومعالجتها، يجب التذكر أولًا أنه في كل بيت تنمية في الطبيعة، كمية الموارد المطلوبة لتنمية وتكاثر جميع أنواع الكائنات الحية هي عامل

علاقة بموضوع

علم البيئة:


• عوامل تؤثر على كبر العشيرة.

• الموارد كعامل محدد.

للمزيد عن

عدد الأفراد التي تبقى على قيد الحياة نسبة لعدد الأفراد في جيل الوالدين، انظروا الفصل الثاني، صفحات 29-30.

محدد يؤثر على قدرة نهو وبقاء الأفراد وعلى تعداد العشرة. في معظم بيوت التنمية، لا تستطيع العشائر أن تنمو بشكل غير مراقب حتى إلى ما لا نهاية. لذا لا نجد أنواعًا، في الطبيعة، تستطيع أن تُنجِب أفرادًا كثيرة وأن تزوِّد جميعها بالغذاء والحماية لمدة طويلة. وبالمثل لا نجد أنواعًا تُنجِب عدد قليل من الأفراد، لكنها لا تزوِّدها بالغذاء والحماية. تعرض الرسمة ح -1 العلاقة بن عدد الأفراد وبذل الإستثمار فيها.



الرسمة ح -1: العلاقة بين استثمار الوالدين بعدد الأفراد وبين استثمار الوالدين بمعالجة الأفراد

على الرغم من وجود فرق جوهري بين الإستراتيجيتين، عندما لا يكون تغيير كبير في بيت التنمية والنظام

- موارد في بيت التنمية. توازن دينامي (متغيًر) في
- النظام البيئي.

البيئي موجود في توازن دينامي، فإنّ النتيجة النهائية متشابهة: عدد الأفراد الذين يبقون على قيد الحياة مساو لعدد الأفراد في جيل الوالدين ويبقى تعداد العشيرة ثابت.



👣 سؤال ح-1

أ. اذكروا ثلاثة موارد في بيت التنمية مكن أن تشكّل عامل محدد لتعداد عشيرة نباتات، وثلاثة موارد مكن أن تكون عامل محدد لتعداد عشيرة حيوانات.

ب. اختاروا موردًا واحدًا من الموارد المطلوبة للنبات وموارد واحد من الموارد المطلوبة للحيوانات واشرحوا، كيف مكن أن يحدد المورد نسبة التكاثر؟

الاستثمار في الأفراد

ليس صدفة استعملنا الكلمة "استثمار" عندما تناولنا عدد الأفراد وتنميتها. تحتاج عملية التكاثر ذاتها إلى موارد كثيرة: يبذل جيل الوالدين موادًا وطاقة في إنجاب الأفراد، لكن بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى طاقة للبحث عن زوج أو زوجة، للإتصال بين الزوجين، للحصول على غذاء للأفراد ولحمايتها من المفترسين. بما أن الموارد محدودة في كل بيت تنمية، فإنَّ كل تكبير في عدد الأفراد يكون "على حساب" الاستثمار والمعالجة في كل فرد. وبالعكس - عدد قليل من الأفراد يُتيح استثمار مواد وطاقة أكثر في تنمية الأفراد. في النباتات التي لا تستطيع أن "تفتش" عن قرين للتكاثر، يوجد استثمار كثير في جذب مُلقحات بواسطة أزهار كثيرة جدًا، أزهار ذات رائحة وملونة، كما تُقدم رحيقًا حلوًا "كمكافأة"



الفكرة المركزية

النشوء والارتقاء: العلاقة المتبادلة بين النبات وملقحاته هي مثال للمشاركة في النشوء والارتقاء. للملقحات، أو تُقدم لها حبيبات لقاح كثيرة وغنية بالبروتينات، أما الحيوانات التي تنشر الثمار، فإنها "تكافئها" بثمار عصيرية ومغذية. بالإضافة، تُستثمر في النباتات مواد وطاقة في "رزم" الجنين أيضًا مع مواد إدخارية ضرورية لإنباته وتثبيته.

نفصِّل قليلًا مما هو معروف حول الكائنات الحية وإستراتيجيات تكاثرها.

إستراتيجية أ: أفراد كثيرة واستثمار قليل في تنميتها

الإستراتيجية أ شائعة عند الكائنات الحية التي تتكاثر بسن صغير، تتطور أجنتها خارج جسم الأم، يوجد لديها أفراد كثيرة صغيرة ويستثمر الوالدين قليلًا في تنميتها وحمايتها. في هذه الإستراتيجية، النسبة المئوية للأفراد التي تبقى على قيد الحياة، من بين الأفراد، صغيرة جدًا. كثير منها تُستخدم غذاء لكائنات حية أخرى أو تُصاب من التعرض لعوامل لا أحيائية غير مناسبة. فيما يلي أمثلة لكائنات حية: أسماك، برمائيات ونباتات حولية. الحيوانات التي يمكن تصنيف تكاثرها كإستراتيجية أ شائعة في بيوت تنمية مائية، فيها قد تجرف تيارات الماء البيض أو الأفراد الحديثة السن إلى أماكن غير مناسبة لنموها. في بيوت تنمية كهذه، لا توجد أماكن للاختباء والأفراد معرضة للافتراس كل الوقت. نجد في اليابسة كائنات حية كهذه في بيوت تنمية تحدث فيها تغييرات متكررة والمجتمع فيها لا يزال غير متأسس (مثل: حقل مهجور مؤخرًا، غابة محروقة، بيت تنمية جديد تمامًا، نتَج في أعقاب تعبيد شارع أو بناء سد). في بيوت تنمية كهذه، تتغيّر الظروف (الأحيائية واللاأحيائية) في كثير من الأحيان ولا يوجد فيها تنافس شديد داخل النوع. في الواقع، أفراد كثيرة لا تبقى على قيد الحياة، لكن الاستثمار في كل فرد قليل أيضًا.

إستراتيجية ب: أفراد قليلة واستثمار كثير في تنميتها

الإستراتيجية ب تُعيِّز الأنواع التي تتكاثر فيها الأفراد في مرحلة متأخرة في حياتها. العدد القليل للأفراد يُتيح للوالدين استثمار موارد كثيرة فيها. نجد هذه الإستراتيجية في بيوت تنمية ثابتة، مثل: غابة مكونة من أشجار كبيرة ذات بذور كبيرة، عند الطيور وعند الثدييات الكبيرة ومن بينها الإنسان. ليس الأمر كما هو في الإستراتيجية أ، يركِّز الوالدين موارد كثيرة في أفراد قليلة. خسارة أفراد طيور في أعقاب افتراس، النقص في الغذاء أو تغيير متطرف في ظروف البيئة المحيطة هي ضربة قاسية للوالدين اللذين فقدا في نفس الوقت موسم كامل من الجهد في التكاثر.

جدول خ -1: مقارنة بين إستراتيجيتي التكاثر

إستراتيجية ب	إستراتيجية أ	الصفة
صغير	كبير	عدد الأفراد
بالغ	شاب	السن الذي يبدأ فيه الكائن الحي في التكاثر
کبیر	صغير	كبر الأفراد حديثة السن
يوجد، تستمر مدة زمنية كثيرة	لا يوجد	الاعتماد على الوالدين
ثابت، قريبة من قدرة تحمل بيت التنمية.	في المدى القصير: تقلبات كثيرة وأقل ثباتًا	تعداد المجموعة
طويل	قصير	مدة الحياة
ثابت ويمكن تنبوئه	متغيِّر، من الصعب تنبوئه	نسبة الوفيات
تنافس شديد داخل النوع على الموارد، ظروف بيئة محيطة ثابتة.	تنافس منخفض على الموارد، في المدى القصير، ظروف البيئة المحيطة غير ثابتة (تتغير في كثير من الأحيان).	شروط البيئة المحيطة
طيور، ثدييات	بحرية: صدف، مرجان، أسماك يابسة: حلزونات، سلاحف	حيوانات
أشجار كبيرة	أعشاب حولية	يع لباتات گئے۔

وصفنا أعلاه إستراتيجيتين مختلفتين جدًا عن بعضهها، لكن يجب أن نعرف أنه بين هذين الطرفين توجد حالات وسطية كثيرة، وفي الواقع يمكن أن نجد في الطبيعة تنوع كبير لإستراتيجيات تكوِّن تسلسل بين الحالتين المتطرفتين. يمكن أن نجد تنوعًا في إستراتيجيات التكاثر بين أنواع مختلفة من نفس الطائفة أيضًا. في طائفة الطيور، مثلًا: يوجد أنواع تنمي صيصان والاستثمار في معالجتها قليل، ويوجد أنواع تستثمر كثير في الفراخ حتى تصل الاستقلالية (الفصل الخامس، صفحات 94-95). نجد مثالًا إضافيًا في طائفة الثدييات: الثدييات الصغير مثل الفئران، تتكاثر عدة مرات في السنة، ويوجد لديها عدد كبير من الأفراد التي يستمر الاعتناء بها مدة زمنية قصيرة. أما الثدييات الكبيرة مثل الجمل، فإنها تتكاثر مرة واحدة في السنة، أو حتى مرة واحدة كل عدة سنوات، وعلى الأغلب يوجد لديها فرد واحد في كل ولادة، والاعتناء به مستمر. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أنه في ظروف ثابتة يكون عدد الأفراد في العشرة ثابتًا أكثر أو أقل من جيل إلى جيل، سواءً كان التكاثر بإستراتيجية أو بإسترايجية ب.




على الرغم من وجود فرق جوهري بين الإستراتيجيتين، عندما لا تكون تغييرات كبيرة في ظروف البيئة المحيطة، فإنَّ النتيجة النهائية متشابهة: عدد الأفراد التي تبقى على قيد الحياة مثل عدد الأفراد في جيل الوالدين والعشيرة لا تكبر ولا تصغر. اشرحوا.



ح 3. مبادئ مشتركة في مستويات التنظيم

الفكرة المركزية

يتم التعبير عن ا**لتجانس والتباين** في عمليات تكاثر في الطبيعة. افتتحنا النقاش حول موضوع التكاثر في هذا الكتاب من خلال عرض العمليات التي يوجد فيها تجانس كثير موجود في الطبيعة: الأساس الخلوي لعملية التكاثر غير التزاوجي يعتمد على الميتوزا والأساس الخلوي لعملية التكاثر التزاوجي يعتمد على الميوزا (الفصل الأول). يوجد تجانس كبير في المبادئ المشتركة لعمليات التكاثر (الفصل الثاني) أيضًا: الإخصاب، التمايز، تأثير عوامل البيئة المحيطة والمراقبة على جميع عمليات التكاثر بواسطة الهورمونات. عرضنا التباين في عمليات تكاثر الحيوانات في الماء واليابسة وتنوع طرق التكاثر في النباتات في الفصلين الخامس والسادس. تعرض الرسمة خ - 2 الجوانب الأساسية للتجانس والتباين في طرق التكاثر في الطبيعة.



الرسمة خ -2: جوانب أساسية لتجانس وتباين عمليات تكاثر في الطبيعة

الفصل بين النقاش حول تكاثر الإنسان، الحيوانات والنباتات قد يؤدي إلى إخفاء المبادئ المشتركة للتكاثر في المجموعات المختلفة للكائنات الحية. يتركز التلخيص فيما بعد (جدول خ - 2) في الأشياء المشتركة لتكاثر جميع الكائنات الحية. يبدأ من الأسس المشتركة في مستوى تنظيم الخلية، يستمر في مستوى الكائن الحي وملاءمة طرق التكاثر للبيئة المحيطة الحياتية، ويتقدم إلى المبادئ المتعلقة بمعنى التكاثر في مستويات تنظيم العشيرة والمجتمع.

علاقة موضوع

علم البيئة: مستويات التنظيم في الطبيعة.

جدول خ -2: مبادئ في التكاثر

المبادئ المشتركة	الموضوع	مستوى التنظيم
انقسام النواة وتكاثر غير تزاوجي فيه تُنْتُج الخلايا الابنة وأفراد متماثلة لبعضها في المعلومات الوراثية ومتماثل لخلية الأُم أو الوالد الوحيد الذي نتَجت منه.	الميتوزا	الخلية
الميوزا والإخصاب هما الأساس الخلوي للتكاثر التزاوجي. الميوزا هو انقسام خليه في أعقابه تَنْتُج خلايا ابنة هيبلوئيدية، تختلف بشحنها الوراثية عن خلايا المصدر. المشاركون في التكاثر التزاوجي هم خلايا من نوعين: خلية تناسلية ذكرية ذات قدرة على الحركة المستقلة، وخلية تناسلية أنثوية تنقصها القدرة على الحركة المستقلة. عند الإخصاب تتحد نواتين هيبلوئيديتين نتجتا في الميوزا، وتَتْتُج نواة ديبلوئية ذات شحنة وراثية خاصة.	ميوزا، خلايا تكاثر وإخصاب	
نحصل في التكاثر غير التزاوجي على أفراد متماثلة لبعضها ومهاثلة للوالدين اللذين نتجا منهما. التكاثر غير التزاوجي توجد له أفضلية في ظروف بيئة محيطة ثابتة. في التكاثر التزاوجي، الأفراد تشبه الوالدين، لكنهم غير مماثلين لهم وغير متماثلين فيما بينهم. التكاثر التزاوجي توجد له أفضلية في ظروف بيئة محيطة متغيِّرة وهو يزيد من احتمال الأفراد القليلة أن تبقى على قيد الحياة حتى إذا تغيَّرت ظروف البيئة المحيطة (انتخاب طبيعي).	طريقة التكاثر	الكائن الحي
يتم تحديد مرحلة التكاثر في حياة الكائن الحي بطريقة وراثية: الكائنات الحية التي تعيش مدة زمنية قصيرة، تتكاثر في سن صغير، أما الحيوانات التي تعيش مدة زمنية طويلة، فإنها تتكاثر مرحلة متأخرة في حياتها. توجد في النباتات إمكانية التطور المتواصل الذي يستمر لعدة سنوات كثيرة بواسطة المريستيمات التي تتحلى خلاياها بالقدرة على الإنقسام، التمايز والتطور إلى أعضاء.	توقيت التكاثر في دورة الحياة	
يتم التكاثر على الأغلب في موسم فيه ظروف البيئة المحيطة مناسبة لنمو الأفراد وفيه احتمال كبير لبقاء الأفراد على قيد الحياة. يتأثر توقيت التكاثر من إشارات في البيئة المحيطة، مثل: الضوء، درجة الحرارة، توافر الموارد (الغذاء) ويتم تنظيمه بواسطة الهورمونات.	موسمية التكاثر	
في الكائنات الحية البسيطة لا نجد دامًا أعضاء معرَّفة مُعدَّة للتكاثر. في الكائنات الحية المتطورة يوجد أعضاء خاصة مناسبة لأدائها كأعضاء تناسلية: أعضاء تَنتُج فيها الخلايا التناسلية، أعضاء تُنقل فيها الخلايا التناسلية وفتحة تخرج عبرها خلايا تناسلية أو أفراد إلى البيئة المحيطة. في الكائنات الحية التي إخصابها داخلي، يوجد أعضاء خاصة لنقل الخلايا المنوية من الذكر إلى الأنثى ولإلتقاء الخلايا التناسلية. في الكائنات أفراد ذكرية وبين أفراد أنثوية وبالتناظر - بين أعضاء تكاثر أنثوية وبين أعضاء تكاثر ذكرية. في معظم الحيوانات فيّز بين أفراد ذكرية وبين أفراد أنثوية والأنثوية في نفس الفرد.	أعضاء التكاثر	
يكن أن يتم الإلتقاء بين الخلايا التناسلية في التكاثر التزاوجي فقط في بيئة محيطة مائية أو رطبة. عندما يكون بيت التنمية ذاته مائي، يمكن أن يكون الإخصاب داخلي، ويوجد لديها أعضاء مائي، يمكن أن يكون الإخصاب داخلي، ويوجد لديها أعضاء وآليات مناسبة لحماية الخلايا التناسلية ومكان الإلتقاء بينهما من الجفاف. تعود البرمائيات إلى البيئة المحيطة المائية للتكاثر والإخصاب خارجي على الرغم من أن حياتهم البالغة تكون على اليابسة.	البيئة المحيطة للتكاثر وطريقة الإخصاب	
يتطور الجنين من الزيجوت وهو بداية الكائن الحي المستقل. في البيئة المحيطة المائية يتطور الجنين خارج جسم الأُم وأحيانًا يكون محمية في بيضة. في الكائنات الحية التي تعيش على اليابسة، الجنين محمي من المفترسين ومن الجفاف بواسطة أغلفة، مثل: قشرة البذرة الثمرة، البيضة أو رحم الأُم. تُسخدم المواد الموجودة في البذرة والبيضة مصدر غذاء للجنين. في الثدييات، يتطور الجنين داخل جسم الأم ومنها يحصل على غذائه. يوجد حيوانات، مثل: الأسمال والزواحف التي המשריצים تلد أفرادًا حية تطورت في بيضة داخل جسم الأم. يُرافق تطور الجنين تمايز خلايا إلى أنسجة ذات مبنى وأداء معرَّفين.	من الزيجوت (اللاقحة) إلى كائن حي متعدد الخلايا	
الانتقال من كائن حي صغير السن إلى بالغ، يمكن أن يكون متواصل ويكبر الكائن الحي الصغير ويتطور تدريجيًّا لكائن حي بالغ. في النباتات، الانتقال من جنين إلى نبات غير متواصل، والمدة الزمنية حتى الإنبات يمكن أن تستمر وقت كثير. نجد التطور غير المتواصل من صغير السن إلى بالغ في الحيوانات التي يوجد فيها تحوُّل (ناقص أو كامل).	من صغير السن إلى البالغ	



المبادئ المشتركة	الموضوع	مستوى التنظيم
التكاثر هي الطريقة لإستمرار وجود العشيرة وغوها. العشيرة التي فيها نسبة التكاثر أقل من النسبة الموت قد تتعرض إلى الإنقراض.	معنى التكاثر	العشيرة
النسبة بين عدد الأفراد وبين الاستثمار فيها هي على الأغلب نسبة عكسية: عندما يكون عدد الأفراد كبير جدًا، فإنَّ الاستثمار فيها يقل، وتصغر النسبة المئوية للأفراد الذين يبقون على قيد الحياة. عندما يكون عدد الأفراد صغير، فإن الاستثمار في تغذيتها وحمايتها يكون كثيرًا واحتمال بقاؤها عال. بين هاتين الإستراتيجيتين المتطرفتين، يوجد في الطبيعة حالات وسطية كثيرة.	الاستثمار في التكاثر (إستراتجية التكاثر)	
تتعاون أنواع كائنات حية مع أنواع كائنات حية أخرى في موسم التكاثر، مثلًا: نباتات وحيوانات تُلقحها أو تنشر ثمارها وبذورها. يتم التعبير عن هذه الطرق للتعاون بالمشاركة - في النشوء والإرتقاء للمباني والعمليات.	العلاقة المتبادلة في التكاثر	المجتمع
يتدخل المزارعون في عمليات تكاثر النباتات والحيوانات، كي يزوِّدوا الإنسان بغذاء محسَّن ولزيادة كميته، من خلال تطبيق مبادئ التكاثر التزاوجي وغير التزاوجي. التكاثر التزاوجي هو قاعدة الانتخاب الإصطناعي الذي يتم بعملية التدجين ورعاية أصناف جديدة في الزراعة. أهداف تدخُّل الإنسان في التكاثر هي إتاحة استمرار الأجيال بين الوالدين والأفراد ومنع إنجاب أفراد مصابون.	تدخُّل الإنسان	



المواضيع الأساسية في الفصل

تقدم تطور أعضاء التكاثر وعمليات التكاثر خلال النشوء والإرتقاء بعدة خطوط متوازية للانتقال من الحياة في الماء إلى الحياة على اليابسة: من إخصاب خارجي إلى إخصاب داخلي، من أفراد (أجنة) غير محمية إلى أجنة محمية جيدًا، من عدم الاعتناء بالأفراد إلى الاعتناء المستمر بالأفراد.

مَيِّر في الطبيعة بين إستراتيجيتي تكاثر مختلفتين بشكل جوهري عن بعضهما بعدد الأفراد وبالاستثمار في نموها. الإستراتيجية أ: أفراد كثيرة واستثمار قليل في تنميتها والإستراتيجية ب: أفراد قليلة واستثمار كثير في تنميتها.

على الرغم من وجود فرق جوهري بين الإستراتيجيتين، عندما لا يكون تغيير كبير في شروط البيئة المحيطة، فإن النتيجة النهائية متشابهة: عدد الأفراد التي تبقى على قيد الحياة مثل عدد الأفراد في جيل الوالدين ويبقى تعداد (كبر) المجموعة ثابت.

يوجد في الطبيعة تنوع كبير لإستراتيجيات تكوِّن نوعًا من التسلسل بين الإستراتيجيتبن المتطرفتين. يوجد أشياء كثيرة مشتركة لتكاثر جميع الكائنات الحية، وهو يبدأ عبادئ مشتركة في مستوى تنظيم الخلية ويتقدم إلى المبادئ المتعلقة معنى التكاثر في مستويات التنظيم للعشيرة والمجتمع.



النشوء والارتقاء

مصطلحات مهمة في الفصل

الاستثمار في نمو الأفراد موارد

إستراتيجيات تكاثر

مستويات التنظيم

عامل محدد

قاموس مصطلحات

المصطلحات البارزة داخل التعريف، تظهر في قاموس المصطلحات أيضًا. تظهر المصطلحات اللاتينية في نهاية قاموس المصطلحات.

أشرنا إلى المصطلحات العامة **بالأسود**.

أشرنا إلى المصطلحات الخاصة بالنبات بالأخضر.

أشرنا إلى المصطلحات الخاصة بالحيوان بالأحمر.

النشوء والارتقاء אבולוציה (evolution) - عملية تدريجية لتغيُّر الأنواع. تغيُّرات وراثية تتراكم خلال الأجيال، وقد تؤدى إلى تطور أنواع جديدة من أنواع سبقتها (انظروا أيضًا: الانتخاب الطبيعي).

سداة אבקן (stamen) - عضو التناسل الذكري في النباتات، بما في ذلك הזיר الذي يحمل في رأسه الملقح الذي تَنْتُج فيه حبيبات اللقاح.

أوكسيتوتسين אוקסיטוצין (oxytocin) - هورمون يُفرز في إناث الثدييات، يؤدي إلى انقباض عضلات الرحم أثناء الولادة وإلى إفراز الحليب. يُنتُج الأوكسيتوتسين في الهيبوثالموس ويُفرز من الغدة النخامية.

أوكسين אוקסין (auxin) - هورمون نباتي ينظِّم نمو الخلايا ويشترك في مراقبة تغييرات نمو النبات.

سائل السلى אמניון (amnion) - انظروا أيضًا: السلى.

إندوسبيرم אנדוספרם (endosperm) - نسيج في بذور قسم من النباتات كاسيات البذور. يغلّف النسيج الجنين ويُستخدم كمجمَّع للمواد إدخارية. في معظم الأحيان، يَنْتُج الإندوسبيرم في أعقاب الإخصاب بواسطة إتحاد خلايا التكاثر الذكرية مع نواتين هيبلوئيديتين في البويضة.

إستروجينات אסטרוגנים (oestrogens) - مجموعة هورمونات تَنْتُج في الذكور وإناث الثدييات. في الجنسين، تؤثر هذه الهورمونات على ظهور العلامات الجنسية الثانوية، وفي الإناث على الإباضة وتطور רירית الرحم.

إستراتيجية التكاثر אסטרטגית רבייה (reproductive effort / strategy) - تعبير لطريقة التكاثر بواسطة النسبة بين عدد الأفراد ومدى استثمار الوالدين في إنتاجها والإعتناء بها. عندما يكون عدد الأفراد كثير، فإنّ الاستثمار في عناية الأفراد يكون قليل وبالعكس.

أكروسوم אקרוזום (acrosome) - שלפוחית في مقدمة رأس الخلية المنوية في الحيوان. تحتوي على إنزيات تُتيح للخلية المنوية أن تدخل عبر أغلفة خلية البويضة.

خصية אשך (testis) - عضو تكاثر ذكري عند الحيوان، تَنْتُج فيه خلايا منوية. في الفقريات، تَنْتُج هورمونات تناسلية أيضًا. على الأغلب، في الحيوانات يوجد خصيتين.

إِثْلِين אַתִּילֹן (ethylene) - هورمون نباتي غازي، فعَّال في عمليات كثيرة، مثل: نضوج الثمار، إزهار، الهرم وتساقط الأوراق والثمار.

بلوغ جنسي בגרות מינית (sexual maturity) - العُمر أو المرحلة في حياة الكائن الحي الذي يستطيع فيه أن يتكاثر بطريقة التكاثر التزاوجي. يتم التعبير عن البلوغ الجنسي بتطزر الأعضاء التناسلية وبإنتاج خلايا تناسلية (جاميتات).

إباضة ביוץ (ovulation) - إطلاق أو خروج خلية البويضة من المبيض.

بيضة ביצה (egg) - مبنى يتطور في أنواع حيوانات، عادةً في أعقاب الإخصاب، وفيها يتطور الجنين بعد وضع البيضة في البيئة المحيطة الخارجية. البيضة مغلَّفة بقشرات وتحتوي على كمية كبيرة من الماء والمواد الغذائية التي يستخدمها الجنين. في حالات قليلة، تتطور البيوض داخل جسم الأم (انظروا أنضًا: השרצה).

بويضة ביצית (ovule) - في النباتات، مبنى في المبيض فيه يبدأ انقسام الميوزا التي في أعقابها تَنْتُج خلية اليويضة (جاميتا).

بويضة ביצית (oocyte) - انظروا أيضًا: خلية البويضة.

نباتات بذرية בעלי זרע, צמחים (seed plants) - نباتات أجنتها محمية في مبنى له قشرات - البذرة.

ذات مشيمة تولان שליה (placental mammals) - ثدييات أجنتها تتطور في الرحم، وبواسطة المشيمة تحصل من الأم على غذاء وأكسجين وتُبعد من جسمها CO_2 وفضلات.

ذات السلى בעלי שפיר (amniota) - طوائف الفقريات(زواحف طيور وثدييات) التي يتطور فيها الجنن داخل ببئة محيطة مائية - سائل السلى.

انتخاب طبيعي בּרֵירה טבעית (natural selection) - عملية تحدد المساهمة النسبية للأفراد المختلفة في العشيرة للجيل القادم. الأفراد الملائمة أكثر، من الأخرى إلى البيئة المحيطة، تضع أفرادًا أكثر خصوبة وتبقى على قيد الحياة. نتيجة لذلك ترتفع في العشيرة تكرارية الأفراد ذوي الصفات الوراثية الملائمة للبيئة المحيطة.

جونادوتروبينات גונדוטרופינים (gonadotrophin) - مجموعة هورمونات تُثير نشاط المبيض والخصيتين. تتم مراقبة إفراز الجونادوتروبينات بواسطة الهيبوثالموس (انظروا أيضًا: GnRH).

جُسَيْم أصفر גופיף צהוב (corpus luteum) - مبنى في مبيض ثديبات وهو يتطور من الجُريب بعد الإباضة ويُفرز بروجسترون. إذا لم يتم الإخصاب، فإنّ الجسيم الأصفر يضمر. إذا تمّ الإخصاب، فإنّ الجسيم الأصفر يستمر في البقاء والعمل في بداية الحمل.

جبريلين د'تدرنور (gibberelin) - هورمون ينظّم استطالة السُليميات في الساق، الإزهار وتحليل المواد الإدخارية خلال إنبات البذور.

جاميتا (gamete) - انظروا أيضًا: خلية تناسلية.

جين در (gene) - وحدة أساسية وراثية تحمل معلومات من جيل إلى جيل. مقطع من ال DNA المتعلق بتعبير صفة معينة.

حبيبات اللقاح גרגר אבקה (pollen grain) - مبنى في النبات، تُنقل بواسطتها الخلايا، التي تتطور منها الخلايا التناسلية الذكرية، إلى الميسم الذي يقع في رأس قلم المتاع.

ثنائي الجنس، زهرة דו־זוויגי, פרח - انظروا أيضًا: الزهرة.

برمائيات דו־חיים (amphibian) - طائفة فقريات تعيش على اليابسة كبالغة، لكن وضع البيض وتطور الأجنة والأفراد يتم في بيت تنمية مائي.

ديبلوئيدية דיפלואיד (diploid) - نواة، خلية أو كائن حي يحتوي على نسحتين من كل كروموسوم (باستثناء الكروموسومات الجنسية). نرمز عادةً إلى عدد الكروموسوماتالديبلوئيدية بالتعبير 2n (انظروا أيضًا: هيبلوئيدية).

تلقيح האבקה (pollination) - نقل حبيبات لقاح (بواسطة رياح، حيوانات، ماء) من أسدية الزهرة إلى الميسم في رأس المتاع.

تلقيح غريب האבקה זרה - يتم التلقيح بين أفراد مختلفة.

تلقيح ذاتي האבקה עצמית - يتم التلقيح في نفس الفرد.

تلقيح اصطناعي האבקה מלאכותית - نقل حبيبات لقاح من زهرة ذكرية إلى زهرة أنثوية بواسطة الإنسان.

إنضاج הבחלה (after ripening) - معالجة بوسائل اصطناعية هدفها أن تؤدي إلى نضوج هُرة قُطفت قبل نضوجها.مثال: معالجة بغاز الاثيلين.

هورمون הורמון (hormone) - مادة تنقل معلومات بين الخلايا في النباتات والحيوانات. يؤثر على عمليات داخل الخلايا المستهدفة التي يوجد لها مستقبلات مناسبة.

التخصيب الإصطناعي הזרעה מלאכותית (artificial insemination) - نقل خلايا منوية بواسطة الإنسان إلى رحم الأنثى.

وضع البيض הعراة (egg laying) - خروج البيضة من جسم الأُم. بعد وضع البيض، يستمر الجنين في تطوره خارج جسم الأُم.

الغدة النخامية היפופיזה (בלוטת יותרת המוח) (hypophysis) - غدة في مخ الفقريات. تقع في المخ تحت الهيبوثالموس وتُفرز هورمونات مختلفة من بينها هورمونات متعلقة بالتكاثر.

الهيبوثالموس היפותלמוס (hypothalamus) - منطقة في مخ الفقريات، وهي تقع فوق الغدة النخامية، ينظّم جهاز الإفراز الداخلي بواسطة تنظيم إفراز الهورمونات من الغدة النخامية.

الولادة המלטה (giving birth) - خروج مواليد ثدييات من جسم الأُم. عادةً المواليد غير مستقلين الولادة המלטה (إنصاد التغذية، العناية وإشراف الوالدين (انظروا أيضًا: השרצה).

تبرعم הנצה (budding) - طريقة تكاثر غير تزاوجية في نباتات وحيوانات معينة. تنمو أفراد جديدة على الأم، تنفصل عنها وتستمر حياتها بشكل منفرد.

هيبلوئيد הפלואיד (haploid) - نواة أو خلية فيها نسخة واحدة من كل كروموسوم، الخلايا التناسلية هي خلايا هيبلوئيدية. نرمز عادةً إلى عدد الكروموسومات الهيبلوئيدية بالحرف n (انظروا أيضًا: ديلوئيدية).

الإخصاب הפריה (fertilization) - اتحاد خليتي تكاثر (هيبلوئيديتان) وإنتاج خلية ديبلوئيدية - زيجوت. يتم في بيئة محيطة مائية أو رطبة دامًا. عندما يتم الإخصاب خارج جسم الكائن الحي ،فإننا نسميه "إخصاب خارجي". وعندما يتم داخل جسم لكائن الحي، فإننا نسميه "إخصاب دخلي".

إخصاب خارج الجسم הפריה חוץ־גופית (IVF - In Vitro Fertilization) - تخصيب خلية البويضة بواسطة خلية منوية، حيث يتم خارج جسم الأُم بطريقة إصطناعية. الزيجوت الذي يَنْتُج يمر عدة إنقسامات، والجنين الذي يَنْتُج يُنقل إلى الرحم، وهناك يكتمل تطوره.

إخصاب مزدوج הפריה כפולה (double fertilization) - عملية خاصة لنباتات ذات أزهار. اتحاد خليتان تناسليتان ذكريتان مع نواتين مع بويضة في المبيض. نواة ذكرية واحدة تتحد مع نواة خلية البويضة لإنتاج زيجوت، والنواة الذكرية الثانية تتحد مع نواتين إنثويتين لإنتاج الإندوسبيرم.

تركيب הרכבה (grafting) - اندماج ينفنه الإنسان بين نباتين مختلفين يؤدي للحصول على نبات كامل. النبتة التي تُنتُج توجد لها هيئة (نظام) جذور ملائمة للتربة وتصمد أمام أمراض مصدرها من أحد النباتات، وנצר (أوراق وأزهار) له صفات مرغوبة مصدرها من النبات الثاني.

حث الشبق השריית ייחום (oestrus induction) - إنتاج اصطناعي لدورة الشبق بواسطة هورمونات، كي يكون نضوج الجُريب والإباضة مبكرين.

השרצה (livebearing) - خروج مواليد مستقلة تطورت في بيوض داخل جسم الأُم. موجودة عند أسماك القرش وأنواع من الزواحف (انظروا أيضًا: الولادة).

ة ايز התמיינות (דיפרנציאציה) (differentiation) - عملية تكتسب فيها الخلايا شكل، مبنى وأداء خاص. هذه العملية عَيِّز مرحلة التطور الجنيني.

حيض ٢٥١ - انظروا أيضًا: دورة الحيض.

جنس تااتد (sex) - جميع الصفات التي تميِّز بين الذكر والأنثى.

زيجوت זיגוטה (zygote) - خلية ديبلوئيدية تَنْتُج في أعقاب الإخصاب. في أعقاب انقسام هذه الخلية انقسامات ميتوزا، تَنْتُج جميع الخلايا التي تكوِّن الكائن الحي المتعدد الخلايا.

זיר - انظروا أيضًا: سداة.

جُريبِ זקיק (follicle) - مبنى في مبيض إناث حيوانات، وهو مكون من خلية بويضة مُحاطة طبقة واحدة أو أكثر من الخلايا. بعد خروج خلية البويضة في عملية الإباضة، فإنَّ الجُريب يتحول إلى جُسَيْم أصف.

بذرة זרע (seed) - مبنى في النبات يشتمل على جنين، نسيج تغذية ومغلفات البذرة.

حولي، نبات חד-שנתי, צמח (annual) - نبات يعيش موسم واحد أو سنة واحدة قط وعر المرحلتين الأساسيتين في دورة الحياة (مرحلة النمو ومرحلة التكاثر) مرة واحدة فقط وعوت مباشرة بعد مرحلة التكاثر (انظروا أيضًا: متعدد السنوات، نبات).

أحادي الخلية، كائن حي חד־תאי, אורגניזם (unicellular organism) - كائن حي كل جسمه خلية واحدة، مثلًا: البراميسيوم (انظروا أيضًا: متعدد الخلايا، كائن حي).

فقريات חולייתנים (בעלי־חוליות) (vertebrates) - مجموعة حيوانات لها هيكل داخلي مصنوع من عظم أو غضروف (تشمل الطوائف الآتية: الأسماك، البرمائيات، الزواحف، الطيور والثدييات).

مادة وراثية חומר תורשתי - انظروا أيضًا: DNA.

انقسام اختزالي חלוקת הפחתה - انظروا أيضًا: ميوزا.

انقسام خلية חלוקת תא - انظروا أيضًا: ميتوزا.

صفار البيض חלמון (yolk) - المخزون الغذائي الموجود في البيضة لمعظم الحيوانات. مكوَّن بالأساس من بروتين ودهنيات ويُستخدم لتغذية الجنين.

عقد الثمار חנטה (fruit set) - مرحلة في حياة النبات، يبدأ فيها تطور المبيض إلى ثمرة في أعقاب الإخصاب.

عديمة المشيمة، ثدييات חסרי שליה, יונקים (monotrems) - مجموعة صغيرة من الثدييات التي تعيش في إستراليا، حيث تتطور أجنتها في البيضة التي تُضع في البيئة المحيطة الخارجية.

قناة فالوب חצוצרה (infundibulum) - انظروا أيضًا: أنبوب ينقل خلايا البويضة.

طوسطسطرون מסטוסטרון (testosterone) - هورمون تكاثر ذكري، يَنْتُج في الخصية. يؤثر على ظهور العلامات الجنسية الثانوية وعلى إنتاج الخلايا المنوية.

شدييات الجورب יונקי כיס (marsupials) - مجموعة تنتمي إلى طائفة الثدييات، توجد لها مشيمة ذات مبنى بسيط. تبقى الأجنة فترة زمنية قصيرة في الرحم، وبعد الولادة يكتمل التطور الجنيني في جلد مزدوج يشبه الكيس على بطن الأم من خلال الرضاعة المستمرة من الأم (انظروا أيضًا: عدمة المشيمة، ثدييات).

ثدييات ‹‹دوره (mammalia) - مجموعة فقريات تتميَّز بصفتين مَيِّزهما عن سائر الفقريات: شعر يغطي الجسم وغدد حليب بواسطتها تغذي الأُم أفرادها حديثي السن.

شبق "חום (oestrous) - فترة (أو فترات) خلال موسم التكاثر الذي فيه إناث ثدييات (باستثناء الإنسان وأنواع قرود معينة) مستعدة للتزاوج (انظروا أيضًا: دورة الحيض، دورة الشبق).

فسيلة ייחור (cutting) - قطعة من نبتة (غصن، ورقة، جذر) في ظروف مناسبة تستطيع أن تتطور إلى نبات جديد مع جميع مكوِّناته. يستعمل المزارعون الفسائل كطريقة للتكاثر غير التزاوجي.

كورين حداد (chorion) - كيس الجنين الخارجي في الفقريات. في الثدييات ذات المشيمة يشكّل الكوريون جزء من المشيمة.

كروموسوم ברומוזום (chromosome) - مبنى في نواة الخلية مكوَّن من DNA وبروتينات. في النواة التي ليست في عملية انقسام تكون الكروموسومات منشورة كالخيوط الدقيقة. قبل انقسام الخلية تنتظم في مباني مضغوطة ويمكن تمييزها بواسطة ميكروسكوب (مجهر) ضوئي. كل نوع في الطبيعة، يَيِّره عدد معين من الكروموسومات.

كروموسومات متماثلة (homologous chromosomes) - زوج من الكروموسومات المتماثلة لبعضهما في الطول، مكان السنتروم ونوع المعرفة الوراثية الموجودة فيهما. وهي موجودة في لبعضهما في الطول، مكان العروموسومات المتماثلة أحدهما مصدره من الأب والآخر من الأم.

مُلقح معدم - انظروا أنضًا: سداة.

طفرة מוסציה (mutation) - تغيير في تسلسل القواعد في ال DNA.

دورة الحيض מחזור וסת (menstrual cycle) - دورة شهرية في إناث الإنسان وعند عدة أنواع من القردة وهي مراقبة بواسطة هورمونات. خلال دورة الحيض، تصبح רירית الرحم ثخينة كتحضير لاستيعاب خلية البويضة المخصبة. إذا لم يتم تخصيب، تُفرز רירית الرحم مع خلية البويضة غير المخصبة وهذا نزيف الحيض (انظروا أيضًا: دورة الشبق).

دورة الشبق מחזור ייחום (oestrous cycle) - ظاهرة دورية في إناث الثدييات باستثتاء الإنسان وأنواع معينة من القردة). دورة الشبق مراقبة بواسطة الهورمونات وهي تشمل شبق، نضوج الجُريبات والإباضة (انظروا أيضًا: دورة الحيض).

معلومات وراثية - انظروا أيضًا: DNA.

ميوزا (انقسام اختزالي) מיוזה (חלוקת הפחתה) - عملية تسبق إنتاج خلايا تناسلية (جاميتات). تشمل العملية عمليتي انقسام متتاليتين لنواة ديبلوئيدية وفي نهايته نحصل على أربع نوى هيبلوئيدية. الميوزا هي مرحلة خاصة وضرورية في التكاثر التزاوجي.

ميتوزا (mitosis) - انقسام نواة، في نهايته تَنْتُج نواتين من نواة واحدة، حيث تكون هيئة الكروموسومات في كل نواة مماثلة لهيئة الكروموسومات الأخرى ومماثلة لهيئة الكروموسومات التي كانت في نواة المصدر. الميتوزا يرافقها عادةً انقسام الخلية.

نوع מין (species) - وحدة تصنيف: مجموعة أفراد تتكاثر في الطبيعةة فيما بينها وتُنجب أفرادًا خصبة.

كاسيات البذور، نباتات מכוסי זרע, צמחים (angiospermae) - نباتات ذات أزهار بويضاتها موجودة في المبيض. بعد التلقيح والإخصاب يتطور المبيض إلى ثمرة فيها بذور.

وجبة برد מנת קור (vernalization) - البقاء في درجة حرارة منخفضة لمدة زمنية في الحد الأدنى. وهي مطلوبة لنباتات معينة لحث قدرة الإزهار، أو لتنشيط الإزهار. مريستيمات מריסטמה (meristem) - نسيج خلايا غير متمايز، تنقسم خلاياه وتُنْتِج خلايا ابنة، لكنها تحافظ على قدرة انقسامها. تقع على سبيل المثال في البراعم وفي أطراف السويق والجذور. (انظروا أيضًا: قمة النمو، كامبيوم).

التغذية المرتدة משוב (feedback) - آلية شائعة في عمليات بيولوجية كثيرة فيها ناتج أو نتيجة عملية يؤثر على شدة العملية: في التغذية المرتدة السالبة، نتيجة العملية تثبط (تعيق) العملية، وفي التغذية المرتدة الموجبة، ناتج العملية ينشِّط أو يؤدي إلى زيادة العملية.

إنبات נביטה (germination) - بداية نمو ونشاط أيضي للجنين في البذرة، تؤدي إلى خروجه عبر قشور البذرة. استيعاب الماء يسبق الإنبات.

سائل السلى נוזל השפיר - انظروا أيضًا: السلى.

נחשון (pollen tube) - امتداد طويل يتطور عندما تنبت حبيبة لقاح على الميسم وتنمو داخل قلم المتاع حتى المبيض. تصل الخلايا التناسليةالذكرية البويضة بواسطة ال הנחשון.

المهبل נרתיק (vagina) - مبنى في جهاز تكاثر الأنثى عند قسم من الحيوانات. يربط بين الرحم والفتحة الخارجية لجهاز التكاثر.

العلامات الجنسية الثانوية סימני זוויג משניים (secondary sexual characteristics) - صفات خارجية (مثل: مبنى العضلات والعظام، وكثرة الشعر)، تميِّز الذكور أو الإناث. تدل على نضوج جنسي، لكنها ليست مرتبطة مباشرةً بعملية التكاثر.

الجنين עובר (embryo) - فرد حديث السن يتطور عادةً من الزيجوت خلال سلسلة انقسامات ميتوزا. في النباتات، يتطور الجنين في البيضة أو البنورة، في الحيوانات، يتطور الجنين في البيضة أو داخل جسم الأُم.

متاع يراه (pistil) - عضو التكاثر الجنسي عند النباتات. مبني من مبيض وميسم وعادة من عمود أيضًا يربط بينهما (قلم المتاع).

البروستتا، غدة ערמונית, בלוטה (prostate gland) - غدة مساعدة في جهاز التكاثر الذكري للإنسان وهي تشترك في إنتاج السائل المنوي.

التوقيت الضوئي פוטופריודיזם (photoperiodicity) - ردود فعل تطور النباتات والحيوانات إلى الدورية اليومية للضوء والظلام (انظروا أيضًا: نباتات نهار طويل، نباتات نهار قصير).

العائل פונדקאות (surrogate motherhood) - الحمل في أنثى لست الأُم البيولوجية للجنين الذي تحمله في رحمها. يَنْتُج الجنين خلال تخصيب خارج الجسم.

فيتوكروم פיטוכרום (phytochrome) - صبغية في نبات تشترك في عمليات، مثل: **الإنبات** والإزهار اللتان يشكّل فيهما الضوء إشارة من البيئة المحيطة.

فلقة طعرد (cotyledon) - ورقة أولية وهي جزء من جنين النبات في البذرة. في نباتات معينة تُخزَّن فيها مواد ادخارية يستعملها الجنين خلال الإنبات. عادةً، يختلف شكل الفلقات عن الشكل العادي للأوراق. يوجد نباتات أُحادية الفلقة ويوجد نباتات ثنائية الفلقة.

درنة פקעת (corm) - قسم من الساق يقع تحت سطح التربة وهو يشمل سُليمية واحدة أو عدة سُليميات للساق الذي أصبح ثخينًا. تحمل جذورًا وبراعم تجدد.

بروجسترون طرائم الله الموجود في مبيض الجنين الجُسَيْم الأصفر الموجود في مبيض الثدي، ويؤثر على الرحم الذي يمر تحضير لاستيعاب الجنين وللحمل. في وقت لاحق في فترة الحمل، يتم إفراز البروجسترون بالأساس من المشيمة.

برولكتين פרולקטין (prolactin) - هورمون يُفرز من الغدة النخامية وينشِّط إفراز الحليب من غدد الحليب في الثديبات.

فرومون פרומון (pheromone) - مواد خاصة للنوع البيولوجي، تُستعمل للاتصال بين أفراد من نفس النوع: يُفرزها أحد الأفراد إلى البيئة المحيطة، تستوعبها أفراد أخرى وتُثر فيها رد فعل.

زهرة פרח (flower) - مبنى في النباتات البذرية يحتوي على أعضاء تناسلية. في كاسيات البذور، الزهرة مبنية من أوراق كأس، أوراق تويج، أسدية و/ أو متاع.

زهرة ثنائية الجنس פרח דרדוויגי (dioecious) - زهرة فيها أعضاء تناسلية ذكرية (أسدية) وأيضًا أعضاء تناسلية أنثوية (מוع).

زهرة أحادية الجنس (monooecious) - زهرة فيها أعضاء تناسلية ذكرية (أسدية) أو أعضاء تناسلية أنثوية (متاع).

هُرة وרن (fruit) - العضو الذي يتطور من مبيض (وأحيانًا من أقسام أخرى إضافية) الزهرة، عادةً بعد الاخصاب، يُستعمل وعاء للبذور ويساعد في انتشارها.

وحررداددته - انظروا أيضًا: التكاثر العذري.

التكاثر العذري פרתנוקרפיה (parthenocarpy) - عملية إنتاح ڠرة دون تخصيب. تنقص الثمرة بذور، لأنه لم يتم الاخصاب.

أنبوب ينقل خلايا البويضة צינור מוביל תאי ביצה (oviduct) - جزء من جهاز التكاثر الأنثوي. مبنى يشبه الأنبوب وهو ينقل خلايا البويضة من المبيض إلى الرحم أو ينقل البيض إلى البيئة المحيطة الخارجية. في الإنسان نسمِّيه قناة فالوب على اسم مكتشفها الإيطالي غابرييل فالوبيو، الذي اشتهر باسمه اللاتيني فآلُوْپْيُس. في الحيوانات التي يوجد فيها اخصاب داخلي، فإنَّ الاخصاب الداخلي يتم في هذا الأنبوب.

أنبوب ينقل خلايا منوية צינור מוביל הזרע (צינור הזרע) (spermiduct) - جزء من جهاز التكاثر الذكري. أنبوب تمر عبره خلايا منوية من الخصيتين إلى البيئة المحيطة الخارجية (عبر فتحة جنس خارجية أو عبر البربخ).

ميسم عطهر (stigma) - قسم من جهاز التكاثر الأنثوي في النباتات ذات الأزهار. القسم العلوي للمتاع الذي تصله حبيبات اللقاح "وتنبت" عليه.

نبات صغیر צמחון (plantlet) - نبات صغیر یتطور فی مستنبت نسیج.

نباتات نهار طویل צמחי יום ארוך (long day plants) - نبات تُزهر فقط عندما یکون عدد ساعات الظلام المتتالى أصغر من قیمة عتبة معینة.

نباتات نهار قصير צמחי יום קצר (short day plants) - نبات تُزهر فقط عندما يكون عدد ساعات الظلام المتتالى أكبر من قيمة عتبة معينة..

قمة النمو קדקוד צמיחה (apical meristem) - منطقة **مريستيماتية** في طرف الجذر، في أطراف السيقان وفي إبط الأوراق والغصون.

كامبيوم קמביום (cambium) - نسيج مريستيماتي يقع حول السيقان والجذور التي خلايها تنقسم وتُنْتِج خلايا جهاز النقل في النبات. يؤدي نشاط الكامبيوم إلى ثخانة السيقان والجذوع (انظروا أيضًا: مريستيما).

غشاء السلى קרום השפיר - انظروا أيضًا: السلى.

شرغوف ראשן (tadpole) - المرحلة الأولى في عملية التطور (التحول) **البرمائيات**. يعيش الشرغوف في الماء ومبناه مناسب للأداء في بيت تنمية مائي.

تكاثر غير تزاوجي (تكاثر غير جنسي) רבייה אל־זוויגית (רבייה אל־מינית) (asexual reproduction) إنتاج كائن حي جديد من والد واحد دون إنتاج خلايا تناسلية (جاميتات). المبنى الوراثي للأفراد في التكاثر غير التزاوجي مماثل للوالد (انظروا أيضًا: تكاثر تزاوجي).

تكاثر تزاوجي (تكاثر جنسي) רבייה זוויגית (רבייה מינית) (sexual reproduction) - إنتاج كائن حي جديد في أعقاب إنتاج جاميتات واتحاد جاميتتان مختلفتان في عملية الاخصاب. عادةً، تختلف أفراد التكاثر التزاوجي في مبناها الوراثي عن بعضها وعن الوالدين (انظروا أيضًا: تكاثر غير تزاوجي).

تكاثر عذري רביית בתולים (פרתנוגנזה) (parthenogenesis) - تكاثر غير تزاوجي يتطور فيه الفرد من خلية بويضة غير مخصبة. نجد التكاثر العذري في أنواع معينة للحيوانات والنباتات.

متعدد السنوات (معمرة) نبات רב־שנתי, צמח (perennial) - نبات يعيش أكثر من سنة واحدة ويتكاثر أكثر من مرة واحدة خلال حياته (انظروا أيضًا: حولي، نبات).

متعدد الخلايا، كائن حي רב־תאי, אורגניזם (multicellular organism) - كائن حي جسمه مبني متعدد الخلايا، كائن حي الخلية، كائن حي). من خلايا حقيقية النواة كثيرة منظمة في أنسجة وأعضاء (انظروا أيضًا: أُحادي الخلية، كائن حي).

الرحم רחם (uterus) - عضو في الجهاز التكاثري الأنثوي للثدييات الذي تتطور فيه الأجنة.

..... الرحم רירית הרחם (endometrium) - التغطية الداخلية للرحم. يتغير سمكها خلال دورة الحيض.

التباين الجيني (التباين الوراثي) שונות גנטית (שונות תורשתית) (genetic variation) - فروق وراثية بين أفراد العشيرة، تنبع هذه الفروق من طفرات ومن إنتاح تراكيب جديدة للمعلومات الوراثية في عملية التكاثر التزاوجي. يمكن أن يكون للتباين الوراثي تأثير على سير النشوء والارتقاء (في علم الإحصاء، المصطلح "تباين" يوجد له معنى آخر).

סיובש שחלה (ovary)

- في الحيوانات בבעלי חיים عضو في الجهاز التكاثري الأنثوي، تنضج فيه خلايا البويضة وتُفرز منه هورمونات التكاثر.
- في النباتات كاسيات البذور בצמחים מכוסי־זרע القسم السفلي في المتاع، يحتوي بويضة واحدة أو عدة بويضات. بعد الاخصاب يتطور المبيض إلى ثمرة.

عبور مادة وراثية שחלוף (crossing over) - تبادل مقاطع بين كروماتيدات كروموسومات متماثلة خلال الميوزا.

..... שיבוש (cloning) - تكنولوجيا لإنتاج فرد بشكل اصطناعي من خلية ليست خلية تناسلية (خلية جسمية) تحتوي على نواة ديبلوئيدية. الفرد مماثل من ناحية وراثية للكائن الحي الذي أُخذت منه نواة الخلية.

مضاعفة ال سحواط (DNA replication) - مرحلة في دورة الخلية، يتم فيها بناء جزيء DNA موجود. مرحلة المضاعفة تسبق انقسام الخلية.

المشيمة שליה (placenta) - عضو خاص يتطور في إناث معظم الثدييات أثناء الحمل. يستوعب الجنين غذاء وأكسجين بواسطة المشيمة من دم الأم وتُبعد فضلات الجنين. تَنْتُج في المشيمة هورمونات الحمل، وعي تُطلق من جسم الأم بعد الولادة مباشرةً.

السلى שפיר (amnion) - الغشاء والسائل اللذان تتطور داخلهما أجنة الفقريات البرية (زواحف، طيور وثدييات) في جسم الأُم أو داخل البيضة (انظروا أيضًا: أكياس خارج الأجنة).

أكياس خارج الأجنة שקים חוץ־עובריים (extraembryonic membranes) - كيس الصفار، كيس بول أنثوي (النتوئيس)، السلى والكوريون اللذان يتطوران مع الجنين في بداية تطوره.

كيس الصفار שק חלמון (yolk sac) - يزوِّد تغذية لجنين الأسماك، الزواحف، الطيور والثدييات التي تنقصها مشيمة.

كيس بول جنيني שק שתן עוברי (allantois) - يُستخدم لحفظ مواد إفراز نيتروجينية ولتبادل الغازات - أكسجين و CO_2 في بيوض الزواحف والطيور. في جنين الإنسان، في جنين الإنسان، كيس البول الجنيني مختصر وهو جزء من الحبل السري.

خلية بويضة תא ביצה (ovum) - خلية تناسلية أنثوية. عند النساء نسمِّيها بويضة أيضًا.

خلية منوية תא זרע (sperm) - خلية تناسلية ذكرية.

خلية تناسلية תא רבייה (gamete) - خلية أو نواة هيبلوئيدية تَنْتُج في الكائنات الحية التي تتكاثر بطريقة التكاثر التزاوجي ويمكن أن تشترك في عملية الاخصاب.

مستنبت نسيج תרבית רקמה (tissue culture) - تكنولوجيا لإكثار نباتات من خلايا أو أنسجة على وسط غذائي في المختبر في ظروف تخضع للمراقبة.

سبات بذور תרדמת זרעים (dormancy) - توقف مستمر لنشاط البذرة، النهوض متعلق بعوامل داخلية في البذرة وبعوامل بيئة محيطة خارجية مثل الضوء ودرجة الحرارة.

Deoxyribo Nucleic Acid) **DNA** (Deoxyribo Nucleic Acid) - جزيء يحمل الصفات الوراثية للكائن الحي، لذا نسمِّية "المادة الوراثية". حسب تسلسل القواعد في ال DNA يتم تحديد مبنى البروتينات في الخلايا (انظروا أنضًا: مضاعفة ال DNA).

FSH (هورمون يحفز الجُريب הרמון מעורר זקיק) - هورمون يحفز الجُريب הרמון מעורר זקיק (Follicle Stimulating Hormone) - هورمون يَنتُج في الغدة النخامية، يؤدي في كل دورة إلى تطور عدة جُريبات في المبيض، حيث يصل واحد منها إلى درجة جُريب ناضج.

Gonadotropin Releasing Hormone) GnRH) - هورمون يُفرز من الهيبوثالموس. ينظّم إفراز الهورمونات الجونادوتروبينية (التناسلية) التي تُفرز من الغدة النخامية.

human Chorionic Gonadotropin) hCG) - هورمون يُفرز بواسطة الجنين والمشيمة في الإنسان في بداية الحمل. يُستوعب الهورمون في المبيض ويثبط (يعيق) اضمرار الجُسَيْم الأصفر.

LH (هورمون الإصفرار הורמון ההצהבה Luteinzing Hormone) - هورمون يَنْتُج في الغدة النخامية. يؤدي إلى الإباضة وإنتاج جُسَيْم أصفر في المبيض.

دليل المصطلحات

في نهاية الدليل، يوجد مصطلحات نكتبها، عادةً، بطريقة مختصرة بأحرف إنجليزية.



نشوء وارتقاء 20, 29-31, 88

- في ثدييات بحرية 87
 - الإنسان 59
- طرق تكاثر الفقريات 101
- التكاثر التزاوجي عند النباتات 140
 - عمليات تكاثر 170

أسدىة 118-119, 122

ادوارس، روبرت 66

الحصبة الألمانية، فيروس 52

أوزون في الغلاف الجوى 170

عشيرة بنو البشر، تعداد 60-61

إولتراساوند 69

اوكسيتوسين

- في الولادة 77,85

- وإفراز الحليب 59

أوكسين 138, 165

- تأثير على التطور في مستنبت نسيج 156
 - تأثير على تطور فسائل 153
 - تأثیر علی تطور ثمار 162,134 162

ضوء، تأثير على الإنبات 137, 159

ضوء، تأثير على التكاثر 28

طول النهار

- تأثير على وضع البيض 147
- تأثير على الشبق والبلوغ الجنسي 147
 - تأثير على الإزهار 161,117-116 161
 - تأثير على التكاثر عند الحيوانات 82

إشارة خارجية من البيئة المحيطة: انظروا: عوامل خارجية

من البيئة المحيطة

تجانس وتباين 17, 24, 155

تخزین بذور وثمار، ظروف 165

عدم ملاءمة ذاتية (في النبات) 126

أعضاء تخزين في النبات 113

أعضاء تزاوج 88, 90, 91, 170 أعضاء حسية 28-29

أعضاء تكاثر انظروا: جهاز التكاثر

اتحاد جاميتات انظروا: اخصاب (اتحاد خلايا تناسلية) ايدس 74 غشاء بول جنيني 93

السَّلى: انظروا السَّلى

وسائل لمنع الحمل 74-75 اندوسبيرم 130-127

استروجن 38, 44-44, 75, 75, 150

- في الحمل 52

استراتیجیات تکاثر 171-174, 177

صوص انظروا أيضًا: فراخ 93-95, 174

- مقارنة بن الفراخ 94, 95

أكروسوم 41, 50

خصية 36, 39, 85

نافذة البحث 11, 95, 104, 124, 135, 163

إثلين 163, 164-165



بلوغ جنسي 38, 80

- مبكر عند الأبقار 147

فحوصات الحمل

- فحص الحمل 53
- فحص سائل السّلى 53, 69, 71
- فحص خملات كوريون 69-70, 71

إباضة 42, 44, 48, 76

- مشروطة 97

تدجين حيوانات 146

بيضة 27-28, 89, 170

- وخلية بويضة، مقارنة 89
- دجاجة، تطور ومبنى 92
- بيضة، مقارنة مع الرحم 88

- عبر مخصية 148

بويضة

- في الإنسان انظروا خلية بويضة
- في النبات 170,128, 170, 170
 - تبرع... 68

غدة

- حليب و5, وو
- مساعدة 36, 40



+ 72-71 داون، أعراض 72-71 داون، أعراض 72-71 101,86-85 تالله و 94 121 ثنائي المسكن، نبات 121 ثنائي المنس، زهرة 121 برمائيات - تحوُّل في ... 87 - تكاثر في ... 87 - تكاثر في ... 87 - تكاثر في ... 88 - 101,86

ثنائية الفلقة، بذرة 130 الغشاء الحاجب 74 تفريد أجنة 73 تفريد ثمار وأزهار 162, 165 نزيف الحيض 44, 45 ديبلوئيد، خلية 15, 50



تلقيح 114, 122, 127

- غريب (متبادل) 124-123
 - اصطناعي 165, 165
 - بواسطة حيوانات 122
 - بواسطة رياح 122
 - ذاتي 126-123
 - طرق 122

إضاءة اصطناعية

- تأثير على وضع البيض 147
- تأثير على النباتات في الدفيئة 161, 165

نضوج وإنضاج، ثمار 114, 163

معالجات تؤدى إلى نضوج جُريبات 73

محاكاة فوق صوتية (اولتراساوند) 69

اتزان بدنی 48

والدان بيولوجيان 67

هورمونات تكاثر عند الإنسان

- جوناندوتروبينات انظروا أيضًا: GnRH, FSH, LH
- جنس: انظروا أيضًا: استروجن، طوسطسطرون، بروجسترون 38-39

هورمونات انظروا حسب أيضًا: حسب أسماء الهورمونات

- أعضاء مستهدفة و3
- في الإنبات ودورة حياة النبات 138

- بروستتا 36, 40 - كوفير 40 بنك خلايا منوية 66 مشاكل خصوبة 64 كاسيات البذور 115 مشيمة انظروا أيضًا: مشيمة 100 بصل 112, 113, 115 نشوء تلقائي 11 انتخاب طبيعي انظروا أيضًا: نشوء وارتقاء 30

طهور 37



غو 11, 53, 139 فراخ انظروا أيضًا: صوص 94, 174 جولد، ستيفن 59 جوناندوتروبينات انظروا: هورمونات التكاثر عند الإنسان

جوناندوتروبينات انظروا: هورمونات التكاثر عند الإنسار جُسَيْم أصفر 42, 45, 52, 149

جُسَيْم متقطب 42, 43, 50

عامل محدد 172

عوامل خارجية - بيئة محيطة 28, 80, 82, 114, 115

- تأثير على تطور الفسائل 152, 153

عوامل داخلية - وراثية 80, 114, 115

جيوفيتات 113

الذروة 44, 45 LH

جيبرلين

- تأثير على تطور الثمار 162
- تأثير على الإنبات 159,138
 - تأثير على النمو 165
 - وتوقف السبات 160

تقليم 165-164

سن البلوغ (عند الإنسان) 35, 37-38, 44,40

تحوُّل في البرمائيات 87

أقراص لمنع الحمل 75

جاميتا، انظروا: خلايا تناسلية

- أنثوية: خلية بويضة

حبيبة لقاح 170-120, 170

- وميسم، تعارف 127

تركيب 153-154 خُنثى 25, 26 إعاقة الإنبات انظروا أيضًا: سبات بذور 28, 138 بذل جهد في تنمية النسل: انظروا استراتيجيات التكاثر حث الشبق (عند الأبقار) 150

التفريخ 86, 88

- في الزواحف 89 تثبيت الجنين في الرحم 51 ملاءمة بين الأداء والوظيفة

- التلقيح 22, 125-126, 141

- نشر البذور (بواسطة الرياح والحيوانات) 132, 133

- البيئة المحيطة الحياتية 30

- مبنى الرحم 35, 88, 89

- مبنى الخلية المنوية 41

بلوغ جنسي 38

اتحاد خلايا تناسلية: انظروا: الإخصاب

تمايز 53, 139

- في مستنبت نسيج 156

تدخُّل الإنسان

- في عمليات تكاثر الحيوانات 146-151, 177

- في عمليات تكاثر النباتات 134, 151-165

- في عمليات تكاثر الإنسان 4-66

- جوانب أخلاقية 72-74, 90, 106, 151-150

تطور

- مستمر (في النباتات) 111, 139

- جنين انظروا أيضًا: جنين 53-55, 98, 176

- جنين في البيضة 93

- ڠار 128, 131-132, 162

جهاز داخل الرحم 75



تنظيم هورمونالي انظروا: هورمونات مردودية بواسطة الحيض انظروا: دورة الحيض



جنس (زوج) 10

- تحديد ال. (في الإنسان) 25-25

زواحف 101

زيجوت 24

إنتاج في الإنسان 49-50

- إنتاج في النبات 127

- إفراز من المخ **29,28**

- إفراز من المشيمة 52

- معالجة في... 64, 149, 152-153, 159, 162, 163-164, 165

-إنتاج في المبيض 34-35

- تنظيم بواسطة... 28-29, 46

- تزامن الشبق 149

الزرع (التخصيب) الاصطناعي في الأبقار 148-149

وضع البيض، تأثير طول النهار 147

وضع بيض احتياطي 148

جوانب أخلاقية: تدخُّل الإنسان، جوانب أخلاقية

تعارف بين الخلية المنوية وخلية البويضة 26

تعارف بين الميسم وحبيبات اللقاح 123, 126, 127

الغدة النخامية 38-40, 44

هيبوثالموس 38, 39, 44

انفصال غير متعلق للكروموسومات 17, 18, 19, 24, 24

حمل 45, 51-57, 70

- متعدد الأجنة 57

- فحص 53

- في الثدييات المختلفة 98

ىقاء أفراد 30

توجيه موعد الشبق عند الأبقار 148

انقراض ثدييات كبيرة 60

مضاعفة DNA 5, 15

ولادة 88

استمرارية النوع (species) 176, 10

تبرعم 103-102

ارضاع 95, 99

اجهاض اصطناعي انظروا أيضًا: توقف الحمل

هيبلوئيدية، خلية 15

توقف الحمل (اجهاض) 72

نشر ثمار وبذور 114

إخصاب (اتحاد خلايا تناسلية) 13, 24, 26, 50, 114, 176

- في الإنسان 45, 48-50

- في النبات 127

- خارج الجسم 66-68, 73

- خارجى 27, 85, 86

- مضاعف 128

- ذاتي انظروا: تلقيح ذاتي

- داخلي 27, 86, 88, 170

- داخلي (في النبات) 171,128

إخصاب في الأنبوبة 65

تجميد خلايا تناسلية وأجنة فائضة 66,73

عاريات البذور، ثمار 134 عدمة المشيمة، ثدى 101 قناة فالوب (الإنسان) انظروا: قناة تنقل خلابا البويضة عاريات البذور 132



تاي زکس 68, 69 حلقات سنوىة 140-139 طحسات 140 معالجة النسل 94-95, 99-100, 173-173 معالجة هورمونالية انظروا: هورمونات، معالجة في ... معالجة الخصوبة 57 تلومر 106 طوسطسرون 38, 40, 19



ثدييات الكيس 100 ثدييات 6و, 98, 99 البربخ (في الإنسان) 37, 40 البربخ (في الدجاج) 91 الغدة النخامية 38 وحدة الانتشار 132 النسبة بين عدد النسل وبذل الجهد 173-172 العلاقة المتبادلة، نباتات وحيوانات 141, 177 الشبق عند الحيوانات 97-96 - تأثير طول النهار 147 - تصرفات (سلوكيات) 149 - التزامن والحث في الأبقار 148-150 فسائل 112, 152-153, 165 وليد (إنسان) 35, 88 کبر المخ
 کبر المخ قدرة النبات على التجدد 151,111 أيام مضمونة 76 رضاعة 95, 150



كوريون 51, 93 - فحص خملات... 70 - خملات 1 كيس هواء (في البيضة) 93 <u>کنه</u> 153 خبط السُداة 122,119 صنف 154 جُرىب 50

- ناضج 43-41

- أولى 35, 44-41

- معالجة لإنضاج.. 73

بذرة 27, 28, 130-129

- تخزين 158, 165

- ثنائي الفلقات /أحادى الفلقة 130

- إعاقة الإنبات 28

- مبنی 130-129

- النهوض من السبات وتنشيط الإنبات 159

- الحفاظ على الضرورية 158, 165



الحبل السرى 52, 58 أحادي المسكن، نبات 121 أحادي الجنس، زهرة 121 أحادي الفلقة، بذرة 130 حولية، نبات 110 أحادية الخلية، تكاثر في.. 102,20-103 تبقى في العش 94, 99 حوطار 112, 154 فقريات 81,80 حامض الابستيك 138 مادة وراثية 13, 14, 49 مادة إدخارية 28 - في البذرة 131, 136 مواد تُعيق الإنبات 138, 159, 165 قانون العائلة (اتفاق حمل الأجنة) 67 حيوية البذور 165, 165 حيوية الخلايا المنوية 49 المغازلة (في الحيوانات) 84-83 حليب، في الأبقار 150 حليب، إنتاج (في الإنسان) 59 انقسام اختزالي (ميوزا): انظروا أيضًا: ميوزا 15 انقسام خلية (ميتوزا): انظروا أيضًا: ميتوزا 102 صفار وبروتين (في بيضة الدجاجة) 91, 92 صفار في خلية البيضة (في الإنسان) 41 أكسجين، في الإنبات 137 عقد الثمرة 131, 162

عاريات البذور، نباتات 115

متوزا 13-14, 53, 102, 103, 111, 176

- في بويضة النبات 121

- في الجنبن 50

نوع بيولوجي (species) 10, 26, 26

نوع في خطر الانقراض 86, 90

كاسيات البذور 132

آليات تعارف في النبات 123

آليات تنظيم واتصال 28

آليات مردودية (موجبة وسالبة) انظروا: تغذية مرتدة

منع التلقيح الذاتي 126-125

منع الحمل 74-75

وجبة برد 161

عدد النسل والاستثمار، النسبة بينهما 173-173

انتقال مواد بين الأم والجنين 52

تدخُّل الإنسان، جوانب أخلاقية انظروا تدخُّل الإنسان

جوانب أخلاقية

غلاف شفاف 41, 50

مثبطات (معيقات) الإنبات، مواد 138, 159, 165

جهاز التكاثر 28, 29, 176

- في الإنسان انظروا أيضًا: مبيض، خصية 37-35

- في الأسماك 85

- في النباتات انظروا أيضًا: سُداة، بويضة 121-118

- في الدجاجة/الديك 91

وسط تنمية (اصطناعي) 156

مريستيما 111, 139, 151

الموارد كعامل محدد 171-172

مردودية (تغذية مرتدة):

- موجبة 29, 44, 46, 46, 59, 59

- سالبة 29, 39, 44, 45, 46, 46



الإنبات 114, 136-138

- والفيتوكروم 137

- والهورمونات 138

- إعاقة/تثبيط/تنشيط 138, 159, 165

- ظروف تؤثر 136-137

إنبات حبيبات اللقاح 127

مضادات، انتقال من الأم إلى الجنين 52

السائل المنوى (في الإنسان) 37, 40, 48, و4

نحشون 127, 128

براعم التكاثر 112, 155

كروموسوم 21 71

کروموسومات جنسیة (X,Y) و 26-25

كروموسومات 13-13

- في الجنين، فحص 69-70

- متماثلة 15, 19

- مضاعفة 14

- انفصال غير متعلق 24, 18, 19, 24

كروماتيدات أخوية 14-15



ولادة 57-85, 98



ملقحات 118

متك 119

مبنى البيضة (طير) انظروا: بيضة، مبنى

الثورة الصناعية، وازدياد تعداد السكان 60

المخ 28

طفرة 20, 31

طفرة وتباين وراثى 20

الاستعداد للتكاثر 29

دورة الحيض 38, **96, 44-44, 48, 69**

- والإباضة، مدتها ودوريتها 47

- الأيام المضمونة 76

- تزامن (الإنسان) 67

دورة حياة 114, 176

- النبات، تدخُّل الإنسان 165-158

دورة الشبق **96-97, 149-148**

- ودورة الحيض، مقارنة 97

دورة جنسية انظروا أيضًا: دورة الحيض ودورة الشبق96

مرض وراثي في الجنين، تحديدها 68-71

مرض جنسی 74

ماء السلى انظروا: السلى، سائل

معلومات وراثية 13

ميوزا 13, 15-16, 18, 24, 24, 43, 45, 176

- في النبات 121, 120, 121

- وميتوزا، مقارنة 18-19

- وتباين وراثي 17

- في إنتاج خلايا تناسلية 24

- مراحل 16

ظظ

خلل وراثي، تحديده في الجنين 129 تركيب ضوئي 129 -- وتطور الثمرة 162 التوقيت الضوئي

. - في الحيوانات 147

- في النباتات 161,115

العائلة 67

خصوبة الرجل، تأثيرات ضارة على ... 36

خصوبة، مشاكل 64 فيتوكروم

- وإنبات 37, 159

- وإزهار 116

قضيب 36, 37

هٔار انظروا: هُرة

باستور، لويس 11-12

فلقات 130-129

درنة 113-112, 155

بروجسترون 38, 44-45, 75

- في الحمل 25, 59

- في التزامن وحث الشبق عند الأبقار 149, 150

برولكتين 95, 99

فرومون 84

بروستجلندين 149

زهرة 115, 118, 122

- ثنائي الجنس / أُحادي الجنس 25, 121

ثمرة

- نضوج وإنضاج 164-163

- لنتشار 133-131

- تطور انظروا أيضًا: عقد الثمار 128, 132-131, 162

- عديمة البذور (ثمار عذرية) 134, 135

إزهار 114, 115-118

- توجيه موعد ال... 161, 165

- تأثير درجة الحرارة 161,118

- تأثير دورية ساعات الضوء 161-117, 161

فتحة جنسية خارجية 85, 91, 170

جدائل بروتينات في بيضة الدجاجة 92

2

النسل، التباين والتجانس في ... 13, 17, 20, 24, 123 غدد رحيق، أزهار 118, 122 سويق 139, 136, 129 المهبل 35, 48-49 حامل، الأليل 69 تنفس خلوي، في الإنبات 136 تساقط، أزهار، وثمار 128



بيئة محيطة جافة، تكاثر في .. 101, 100 بيئة محيطة مائية، تكاثر في.. 85 -87, 170 بيئة محيطة مائية/رطبة للإخصاب ولتطور الجنين 27, 88, 93 , 101, 128, 140

دلالات جنسية

- أولية وثانوية في الإنسان 37-38, 40

- ثانوية في الحيوانات 83-82

دلالات ذكرية وأنثوية انظروا: دلالات جنسية

خملات كوريون (خملات المشيمة) 52, 70-71

تزامن الشبق عند الأبقار 148-149

تزامن دورة الحيض (في الإنسان) 67



المتاع 118, 120, 127 الجنين 28-27, 101, 101

- في الإنسان 52

- في النبات 129

- تزويد الأكسجين إلى ... 28, 58

- فحص سلامة الحمل 69

- حماية .. 27-28, 88, 170

- إفراز فضلات **52, 93, 101**

- التطور في البيضة 93

- التطور في الرحم 98

أغشية (أكياس) 51, 93

أجنة زائدة، تجميد 66, 73

أجنة، تكاثر، وتفريد 73, 73

يترك العش 94, 99

موسم التكاثر / موسمية 81-82, 96, 146, 176

طيور، تكاثر في. 90-95

ضروع 99

تثبيط الإنبات 38, 159, 165, 165

أوراق الغلاف الزهري(تويج، كأس) 118

بروستتا، غدة 36, 40



تكاثر على اليابسة (حيوانات) 88-101

- في الثدييات 97-101

- في الطيور 90-96

تكاثر في بيئة محيطة مائية 85, 170

- في الثدييات البحرية 87

تكاثر ورقى انظروا: تكاثر لا جنسي

تكاثر تزاوجي (جنسي) 12, 13, 15, 20, 24-26, 30, 110, 113

- وتباين وراثى 24, 29-31

- في الإنسان 33-59

- في الحيوان 80-129

- في النبات 129-115

- حسنات 30

تكاثر، موسمية انظروا: نبات يوم قصير/نبات يوم طويل,82-81

96, 146, 176

- أشكال 176,12

تكاثر عذرى 130-104, 130

تجدد انظروا: القدرة على التجدد

الرحم 27-28, 48, 35, 51, 55, 171

- ملاءمة بين المبنى والأداء 35

- مخاط (في الإنسان) 35, 44, 45, 51

مستويات تنظيم (خلية، كائن حي، عشيرة، مجتمع) 176-175

رد فعل (الوليد) 58

أنسجة جنينية انظروا: مريستيما



النهوض من سبات البذور، طرق ل... 159

تباین وراثی/ جینی 13, 17, 19, 24, 30

- وطفرات 20

- في أعقاب التلقيح الذاتي/الغريب 123

القناة البولية التناسلية (في الإنسان) 37

جذر 112

جُذير 139, 136, 139

مبيض

- في الإنسان 35, 39, 44

- في النباتات 131,127 وفي النباتات

- في الأسماك

- في الطيور 91

عبور 18, 19, 24

كلونة 105

طرق تكاثر 12-13, 176 طرق سيتوكنين

- في الإنبات 138

- تأثير على التطور في مستنبت النسيج 156

- تأثير على تطور الفسائل 153

أنبوب البيض، دجاجة 91

أنبوب البويضات انظروا: أنبوب ينقل خلايا البويضة

أنبوب ينقل خلايا منوية 36, 37, 40, 85, 90, 19

أنبوب ينقل خلايا البويضة 35, 42, 48, 49, 15, 85

أنابيب نقل (في النبات) 139

آلام الولادة 57

- مردودية موجبة في ... 58

ميسم 120, 122

نبات نهار طويل/ نهار قصر 116-117

نبات، القدرة على التجدد 151

نبات صغير (في مستنبت نسيج) 156

غو 114, 139-140

- تأثير التقليم على... 164



كالوس 156,151

تحديد الجنس 26-25

حمى القش 123

قمم النمو 151,111

مشاركة - في النشوء والارتقاء، نباتات وحيوانات 141

العازل الذكري 74

كامبيوم 153, 139

جذمور 113,112

غشاء السّلى انظروا: السّلى

غشاء بول جنيني 93

أغشية (أكياس) الجنين 51, 93

الاحتلام 41

أشهة فوق بنفسجية 170

بداية الحياة 170

شرعوف 87,86

متعدد السنوات، نبات 110

متعدد الخلايا 15

تكاثر غير تزاوجي (لا جنسي أو خضري) 12-14, 20, 106-106

158 ,113-111 ,110

- في الزراعة 158-151,113

- إنتاج وتطور (في الإنسان) 38, 40-43 - التقاء بين .. 48-49, 86, 88 معدل الحياة (الإنسان) 60 - وبلوغ جنسى 80 تغذية، طفل 59 طفل الأنبوبة انظروا أيضًا: اخصاب خارج الجسم 66 تخطيط العائلة 61, 74-75 ظروف البيئة المحيطة، تغيُّر ونشوء وارتقاء 30 عوارض داون 71-72 فترة الشبق 96, 149 اتصال بين الجنسين 83-84 مستنبت نسيج (في النبات) 105, 157-156 مستنبت خلایا انظروا: مستنبت نسیج سبات بذور 159 تبرع بويضات 68 ديك البيت، تكاثر في ... انظروا: طيور، تكاثر في

> 147 ,45 ,44 ,41-38 FSH 45 ,44 ,41-38 LH 18 ,15 ,14 ,13 DNA 44 ,41 ,39 ,38 GnRH 52 وحمل hCG

مرحلة التكيف، للنباتات الصغيرة مراحل (خضري وتناسلي) في دورة حياة النبات 114, 114 115, 114 115, 114 مراحل (خضري وتناسلي) في دورة حياة النبات 114, 115 وافد 112 125, 70 70,52-51,28 مشيمة 100 - بسيطة 100 مثانة السائل المنوي 40 مثانة السائل المنوي 40 93,88 51 السّلى 15,88 199 - في بيضة الطيور 93 71,69 كيس الصفار 93 29, 10 أكياس اللقاح 119 أكياس البعنين 15 أكياس البعنين 15 أكياس البعنين 15 أكياس البعنين 15 أكياس البعنين 140 سرخسيات 140



خلية ديبلوئيدية 50, 40 خلية هيبلوئيدية 15, 15 توأم 55, 56 خلية بويضة 25

- في الإنسان 35, 41-43, 48-50, 55, 76

- في السمكة 85

- في الطيور 91

- في النبات 120-121, 127, 128

- وبيضة، مقارنة 89

خلایا تزاوج (خلایا جنسیة) انظروا: تکاثر

خلايا منوية 25, 37, 40, 41, 48, 85

- في الإنسان 36, 49

- إعدادها 49

- تأثير درجة الحرارة 36

- دخول خلية البويضة 50

- ضرورية 94, 76

إنتاج وتطور (في الإنسان) 36, 40

خلايا تكاثر 13, 25

- فروق في إنتاجها (في الإنسان) 43

- التعارف بن 26

- تجميد 66

- مكوِّنات وراثية 31, 24

- إتحاد (في الإنسان) 49-50

- وطفرات 20

- في النبات 128, 128

مصادر الصور

نشكر الأشخاص والمنظمات الذين منحونا موافقتهم استعمال الصور.

We thank all organizations and individuals who granted us permission to reproduce their materials in this book

اسم المصور (المصدر*)	اسم الصورة	صفحة
G. Seguin (wiki comm)	تكاثر عنزة	10
Dontworry (wiki comm)	بذرة أفوكادو تنبت	27
Deutsche Fotothek: r.Rossing (wiki comm)	صوص يخرج من البيضة	27
د. فرنکل	توأم	56
البيولوجيا بحث الحياة، كراسة و، صفحة 541 المركز الإسرائيلي لتدريس العلوم (1976).	مراحل خروج الجنين	57
مختبر الإخصاب خارج الجسم، مشفى هداسا عين كارم.	أوعية لحفظ أجنة وبويضات	66
مختبر الإخصاب خارج الجسم، مشفى هداسا عين كارم.	حقن خلية منوية داخل خلية بويضة	67
National human research Institute (USA) (wiki comm)	هيئة كروموسومات سليمة من خلية رجل	70
Aleksandra Banic (sxc)	أقراص دواء	74
Irineu I Degasperi (sxc)	العازل الذكري	
J. Couperus (wiki comm)	سمكة سلمون يأكلها دب	81
N.Eaton Jr.	أسماك سلمون تسبح في مرتفع الوادي	81
ج. بن آفي	القرون كدلالة جنسية ثانوية	83
C. Anderson (wiki comm)	ذكر الفريجتا	84
KrzysztofB (sxs)	طاووس ذکر	84
Janepfeifer at de.wikipedia (wiki comm)	"تزاوج" العلجوم	86
Professor Dr.habil. UweKils (wiki comm)	سمكة سلمون تخرج من البيضة	86
M. Catanzariti (wiki comm)	حوت	87
F. Meir (France) (wiki comm)	دولفين	87
البيولوجيا بحث الحياة، كراسة و، صفحة 825 ، المركز الإسرائيلي لتدريس العلوم (1976)	تحوُّل البرمائيات	87
Ukanda (Wikipedia)	سلحفاة البحر	90
Grass Routes Journey (Flicker)	أنثى السلحفاة تضع بيضًا في الحفرة	90
M. Hellstrom (wiki comm)	أنثى النعامة	92

^{*} سُجِّل المصدر باختصار:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File: - (wiki.comm) http://www.sxc.hu/photo/ - (sxc) http://www.flickr.com/photos/ - (flickr)

1	I	
	بيضة نعامة	Raul 654 (wiki comm)
	صوص يخرج من بيضة	greatchickencoops هوافقة موقع
94	ركود أنثى الحمام الرقطي	Timwindsor (Flicker)
95	فراخ جائعة	benjamint 444 (Wikipedia)
99	عِجل يرضع من أمه	S. van der Wel (wiki comm)
99	قطة وجراء	keith levi (sxc)
100	قردة وجروها	Lee Le Fever (Flicker)
100	كنغر	Martyman (Wikipedia)
104	دافنی	P. Hebert (wiki comm)
110	بيسوم	ش. دور حاییم
112	<u>نيتسنيت</u>	Crazy D (wiki comm)
114	دورة حياة النبات	أ. كارمن
118	مقطع عرضي تخطيطي في الزهرة	أ. كارمن
118	بيتونيا	Maja Dumat (Flicker)
119	حبيبات لقاح	remf.dartmouth.edu; D. Barthel (Wikipedia)
124	ايستيس متسوي	د. ليفي
128	خيارة مع بقايا أوراق التويج	أ. سده
132	ڠرة اسبست	أ. سده
133	بذور هردوف	أ. سده
133	ڠَارة <u>حفتسلت</u> الشاطئ	د. عتصمون
134	بطیخ دون بذور	أ. سده
138	بذور مشمش ومانجو	ر. أمير
140	طحبيات وسرخسيات	ر. نوسینبوس
141	زهرة <u>احيروتم</u> (قبل التلقيح)	Sarah Murray (Flicker)
141	زهرة <u>احيروت</u> م (بعد التلقيح)	Daryl Mitchel (Flicker)
141	دفورنیت	lan Capper
152	نبتة سيجليت كاملة	Sonja McAllister (Flicker)
152	ورقة <u>سيجليت</u> في الأصيص	Commonguy (Flicker)
152	ورقة <u>سيجليت</u> في مرطبان ماء	Judi Cox (Flicker)
153	تركيب في التفاح	ط. سيجلر رحمه الله (هوافقة نشرة المزارع)
154	تركيب في الحمضيات	أ. تجاري
154	صبار مرکّب	أ. سده
154	جذع نخيل مع <u>حوتريم</u>	ط. سيجلر رحمه الله (موافقة نشرة المزارع)
156	نبتة <u>السحلب</u> .	Wildfeuer (wiki comm)
157	أشتال موز من مستنبت نسيج	ط. سيجلر رحمه الله (موافقة نشرة المزارع)
160	تربة محروثة	IJsendoom Poul
160	متوشلاح	أ. سولووي Elaine Solowey
161	ليزيانتوس	Andrew Dunn (Wikipedia)

مصادر الصور 199

صُوِّرت الصور الآتية على يد ر. أمير (حسب رقم الصفحة):

10: بادرات، 25: زهرة ثنائية الجنس، (عائلة السوسنيات)، 26: أشجار نخيل، 58: رد فعل الإمساك باليد، 95: صوص حجل، 110: شجرة المل، 111: الورقة التي سقطت على التربة أنبتت جذورًا، 112: بطاط، عشب أخضر، يركا 113: عمود إزهار الحتساف، 115: أجفا مع عمود إزهار، 117: زيجوككتوس، 118: هيبوسكسو، 118: يعرا ايطالية، 122: أزهار شجرة المل، 122: حرتسيت، 125: أزهار خروب ذكري وأنثوي، 129: بذور فاصولياء، 130: البذور كمكون في الغذاء، 131: افوكادو، رمان، فلفل 131: عقد ثمار سولونوم سعير فاصولياء، 130: البذور كمكون في الغذاء، 131: عوزرار، 133: سكوتش، 134: ثمار دون بذور (موز، 132: يروقات الحمار، انتشار بواسطة الرياح، 132: عوزرار، 133: سكوتش، 134: ثمار دون بذور (موز، افرسمون)، 140: مقطع في جذع مع حلقات سنوية، 152: فسائل تجذرت في الماء، 155: درنة بطاطا مع غصون جديدة، 155: بصل حفتسلت مع أبصال صغيرة + بصلل بنفسجي

بذلنا كل جهدنا كي نجد ونذكر أسماء أصحاب جميع الحقوق على الصور التي تظهر في الكتاب. نعتذر مسبقًا على كل خطأ أو حذف، وإذا زودتمونا بهذه المعلومات فسوف نقوم بتصحيحها في النسخة القادمة. Every effort has been made to locate and credit all copyright holders. In case of omission or mistake, please contact the publisher for correction in future editions.