

מדינת ישראל
משרד החינוך

דولة إسرائيل
وزارة المعارف

סוג הבחינה: א. בגרות לבתי"ס על-יסודיים
ב. בגרות לנבחנים אקסטרניים
מועד הבחינה: חורף תשע"ג
מספר השאלון: 035002, 302
תרגום לערבית (2)

نوع الامتحان: أ. بجروت للمدارس الثانوية
ب. بجروت للممتحنين الخارجيين
موعد الامتحان: شتاء 2013
رقم النموذج: 035002, 302
ترجمة إلى العربية (2)

הצעת תשובות לשאלות
בחינת הבגרות

اقتراح حلّ لأسئلة
امتحان بجروت

מתמטיקה

الرياضيات

שאלון ב'

النموذج "ب"

הוראות לנבחן

تعليمات للممتحن

- א. מועד הבחינה: שעה וחצי.
 - ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה:
בשאלון זה שש שאלות.
לכל שאלה – 25 נקודות.
מוותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך,
אך סך הנקודות שתוכל לצבור לא יעלה על 100.
 - ג. חומר עזר מותר בשימוש:
 1. מחשבון לא גרפי. אין להשתמש באפשרויות התכנות במחשבון הניתן לתכנות. שימוש במחשבון גרפי או באפשרויות התכנות במחשבון עלול לגרום לפסילת הבחינה.
 2. דפי נוסחאות (מצורפים).
 - ד. הוראות מיוחדות:
 1. כתוב את כל החישובים והתשובות בגוף השאלון.
 2. לטייטה יש להשתמש בדפים שבגוף השאלון (כולל הדפים שבסופו) או בדפים שקיבלת מהמשגיחים. שימוש בטייטה אחרת עלול לגרום לפסילת הבחינה.
 3. הסבר את כל פעולותיך, כולל חישובים, בפירוט ובצורה ברורה ומסודרת.
חוסר פירוט עלול לגרום לפגיעה בציון או לפסילת הבחינה.
- א. מועד الامتحان: ساعة ونصف.
 - ב. מבني النموذج وتوزيع الدرجات:
في هذا النموذج ستة أسئلة.
لكل سؤال – 25 درجة.
يُسمح لك الإجابة عن عدد أسئلة كما تشاء، لكن مجموع الدرجات التي تستطيع تجميعها لن يزيد عن 100.
 - ج. مواد مساعدة يُسمح استعمالها:
 1. حاسبة غير بيانية. لا يُسمح استعمال إمكانيات البرمجة في الحاسبة التي يمكن برمجتها. استعمال الحاسبة البيانية أو إمكانيات البرمجة في الحاسبة قد يؤدي إلى إلغاء الامتحان.
 2. لوائح قوانين (مرفقة).
 - د. تعليمات خاصة:
 1. اكتب جميع الحسابات والإجابات في نموذج الامتحان.
 2. لكتابة مسودة يجب استعمال الصفحات التي في نموذج الامتحان (بما في ذلك الصفحات التي في نهايته) أو الأوراق التي حصلت عليها من المراقبين. استعمال مسودة أخرى قد يؤدي إلى إلغاء الامتحان.
 3. فسر كل خطواتك، بما في ذلك الحسابات، بالتفصيل وبوضوح وبترتيب.
عدم التفصيل قد يؤدي إلى خصم درجات أو إلى إلغاء الامتحان.

التعليمات في هذا النموذج مكتوبة بصيغة المذكر وموجهة للممتحنات وللممتحنين على حد سواء.

نتمنى لك النجاح!

בהצלחה!

السؤال 1

معطى قطع مكافئ تصفه الدالة $f(x) = x^2 + 4x + 6$.

أ. جد إحداثيات رأس القطع المكافئ.

ب. فسّر لماذا الرسم البياني للدالة لا يقطع المحور x .

ج. هل توجد قيم x تكون الدالة بالنسبة لها سالبة؟ علّل.

(بإمكانك أيضاً الاعتماد على رسم ملائم.)

حلّ السؤال 1

$$أ. \quad x_{\text{رأس}} = -\frac{b}{2a} = -\frac{4}{2 \cdot 1} = -2 \quad \Leftarrow \quad x_{\text{رأس}} = -\frac{b}{2a}$$

نعوض $x = -2$ في معادلة القطع المكافئ ونحصل على $y_{\text{رأس}} = 2$. $(-2, 2)$


ب. توجد للقطع المكافئ نقطة نهاية صغيرة فيها $y = 2$ ، لذلك لا يمكن أن تتواجد نقطة بالنسبة لها $y = 0$.

(أو أنّ للمعادلة $x^2 + 4x + 6 = 0$ لا يوجد حلّ حقيقي.)

ج. لا، حسب البند "ب" $y \geq 2$ لكل قيمة x ، ولذلك لا توجد قيم x تكون الدالة سالبة بالنسبة لها.

ملاحظة:

يمكن تعليل البندين "ب" و"ج" بواسطة رسم ملائم:



الرسم البياني للدالة لا يقطع المحور x ، ويتواجد فوقه لكل قيمة x

\Leftarrow لا توجد قيم x تكون الدالة سالبة بالنسبة لها.

السؤال 2

- ادّخر يوسف 10,000 شيقل في برنامج توفير نسبة فائدته السنوية ثابتة .
بعد مرور 10 سنوات ارتفع المبلغ المالي إلى 20,000 شيقل .
أ . بكم ضعف ارتفع المبلغ المالي في برنامج التوفير كل سنة؟
(دقق حتى رقمين بعد الفاصلة العشرية .)
ب . ما هي النسبة المئوية التي ارتفع بها المبلغ المالي في برنامج التوفير كل سنة؟
ج . ما هو المبلغ المالي الذي كان بحوزة يوسف بعد مرور 5 سنوات منذ بداية التوفير؟
د . كم كانت النسبة المئوية للربح الذي جناه يوسف بعد 10 سنوات منذ ادّخاره الأولي؟
اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات التي أمامك، وعلّل اختيارك .
- (1) 200%
(2) 50%
(3) 100%

حلّ السؤال 2

أ . نرمز بـ q إلى كم ضعف يزداد المبلغ المالي في سنة واحدة: $20,000 = 10,000 \cdot q^{10} \Leftrightarrow q = \sqrt[10]{2} = 1.07$

ب . نرمز بـ p إلى النسبة المئوية: $1.07 = 1 + \frac{p}{100} \Leftrightarrow p = 7\%$

أو: $q = 1.07 \cdot 100 = 107\%$ بالنسب المئوية \Leftrightarrow النسبة المئوية للزيادة السنوية: $107\% - 100\% = 7\%$

ج . $10,000 \cdot (1.07)^5 = 14,025.51$ شيقل

د . (3) 100%

تعليل: بعد مرور 10 سنوات تضاعف المبلغ المالي، أي أنّ المبلغ المالي الذي أُضيف (الربح) يساوي 100% من المبلغ الابتدائي .

السؤال 3

- الحدّ الثالث في متوالية هندسية هو 36 والحدّ الخامس هو 81 .
أ. جد الحدّ الثاني في المتوالية إذا كان معطى أنّ أساس المتوالية موجب .
ب. جد الحدّ الثاني في المتوالية إذا كان معطى أنّ أساس المتوالية سالب .
ج. جد مجموع الحدود الثمانية الأولى في المتوالية التي أساسها موجب .

حلّ السؤال 3

$$36q^2 = 81 \quad \text{نساي ونحصل على} \quad a_1 = \frac{36}{q^2}, \quad a_1 = \frac{81}{q^4} \Leftrightarrow a_1q^2 = 36, \quad a_1q^4 = 81 \quad \text{أ.}$$

$$q = \pm 1.5 \Leftrightarrow q^2 = \frac{81}{36} \Leftrightarrow$$

$$q = 1.5 \Leftrightarrow q > 0 \quad \text{معطى أنّ}$$

$$a_2 = \frac{a_3}{q}$$

↓

$$a_2 = 24$$

$$\text{ب. معطى أنّ:} \quad a_2 = -24 \Leftrightarrow q = -1.5 \Leftrightarrow q < 0$$


$$\text{ج.} \quad q = 1.5, \quad a_1 = \frac{a_2}{q} = 16 \Leftrightarrow S_8 = \frac{16(1.5^8 - 1)}{0.5}$$

↓

$$S_8 = 788 \frac{1}{8}$$

/ يتبع في صفحة 5 /

السؤال 4



في المثلث المتساوي الساقين ABC ($AB = AC$) BD هو ارتفاع على الساق (انظر الرسم).

معطى أن: $BD = 8$ سم

طول القاعدة BC أكبر بـ 2 سم

من طول الارتفاع على الساق.

أ. جد زوايا المثلث ABC .

ب. جد طول ساق المثلث ABC .

ج. جد مساحة المثلث ABC .

حل السؤال 4

أ. $BD = 8$ سم $BC = 10$ سم

في المثلث BDC :

$$\sin \angle C = \frac{BD}{BC}$$

↓

$$\angle C = 53.13^\circ$$

(زاوية قاعدة في مثلث متساوي الساقين) $\angle ABC = \angle C$

↓

$$\angle ABC = 53.13^\circ$$

↓

$$\angle A = 180^\circ - 2 \cdot 53.13^\circ = 73.74^\circ$$

ب. $\angle A = 73.74^\circ$ $BD = 8$ سم

في المثلث ABD :

$$\sin \angle A = \frac{BD}{AB}$$

↓

$$AB = \frac{BD}{\sin \angle A} = \frac{8}{\sin 73.74^\circ} = 8.33 \text{ سم}$$

ج. BD ارتفاع على الساق AC $\Leftrightarrow S = \frac{1}{2} \cdot BD \cdot AC$ (مساحة المثلث ABC)

↓

$$S = 33.33 \text{ سم}^2$$

السؤال 5

يتعلم في جامعة كبيرة طلاب وطالبات. 60% من مجمل الذين يتعلمون فيها هم طالبات. نختار بشكل عشوائي 3 من الذين يتعلمون في الجامعة.

- أ. ما هو الاحتمال بأن نكون قد اخترنا 3 طالبات؟ فضل حساباتك.
ب. ما هو الاحتمال بأن نكون قد اخترنا طالبين وطالبة واحدة؟ فضل حساباتك.
ج. ما هو الاحتمال بأن نكون قد اخترنا طالباً واحداً على الأقل؟ فضل حساباتك.

حل السؤال 5

أ. $P(\text{طالبة}) = 0.6$

↓

$$P(\text{3 طالبات}) = 0.6^3 = 0.216$$

ب. $P(\text{طالب}) = 0.4$

↓

الطريقة "أ"

$$P(\text{طالبة واحدة وطالبين}) = 0.4^2 \cdot 0.6$$

توجد 3 إمكانيات لاختيار طالبة واحدة (وطالبين)

(طالب، طالب، طالبة)


(طالب، طالبة، طالب)

(طالبة، طالب، طالب)

$$3 \cdot 0.4^2 \cdot 0.6 = 0.288 \Leftarrow$$

الطريقة "ب" (حسب مخطط الشجرة)

من أجل تبسيط المخطط، نكتب بدل الطالبة بنتاً وبدل الطالب ولداً.



$$3 \cdot 0.4^2 \cdot 0.6 = 0.288 \Leftarrow$$

ج. $P(\text{طالب واحد على الأقل}) = 1 - P(\text{3 طالبات}) = 0.784$

السؤال 6

- معدّل علامات طالب معيّن في خمسة امتحانات هو 72 .
امتّحن الطالب بامتحان آخر (امتحان سادس) وحصل فيه على العلامة 90 .
(لجميع الامتحانات نفس الوزن .)
- أ . ما هو معدّل علامات الطالب في الامتحانات الستّة؟
ب . امتّحن الطالب بامتحان آخر (امتحان سابع)، وارتفع معدّل علاماته في الامتحانات السبعة إلى 78 .
ما هي علامة الطالب في الامتحان السابع؟
ج . عند حساب العلامات اكتُشف خطأ . من أجل تصحيح الخطأ، أضاف المعلمّ درجتين لكلّ واحدة من علامات الطالب في الامتحانات الخمسة الأولى .
ما هو معدّل علامات الطالب في الامتحانات السبعة بعد تصحيح الخطأ؟
فصّل حساباتك .

حلّ السؤال 6

- أ . مجموع العلامات في الامتحانات الخمسة هو $72 \cdot 5 = 360$
 \Leftarrow معدّل الامتحانات الستّة هو $75 = \frac{360 + 90}{6}$
- ب . نرمز بـ x_7 إلى علامة الامتحان السابع .
حسب معدّل الامتحانات السبعة : $78 = \frac{75 \cdot 6 + x_7}{7} \Leftarrow x_7 = 96$
- ج . أضاف المعلمّ ما مجموعه 10 درجات، لذلك : $\bar{x} = \frac{78 \cdot 7 + 10}{7} \Leftarrow \bar{x} = 79.42$